Атлас
видов флоры и фауны
международного и национального значения в Рамсарском сайте ”Нижний Днестр”, Республика Молдова



Экологическое общество "BIOTICA"
Кишинёв - 2021

УДК 581.9+591.9(478)(084.4)
A 91

Авторы:

Гендов В.С., Держанский В.В., Журминский С.Д., Изверская Т.Д., Ионица О.В., Манторов О.Г., Романович Н.А., Рущук А.Д., Сыродоев Г.Н., Тищенков А.А., Тофан-Дорофеев Е.В., Цуркану В.Ф.

Научное редактирование: Держанский В.В., Изверская Т.Д.

В работе показана ценность Рамсарской территории ”Нижний Днестр” для сохранения биоразнообразия. Особое внимание уделено видам, произрастающим на обследованной территории, охраняемым на международном и региональном уровнях.

Атлас редких видов флоры и фауны международного и национального значения в Рамсарском сайте ”Нижний Днестр”, Республика Молдова /Гендов В.С., Держанский В.В., Журминский С.Д., Изверская Т.Д., Ионица О.В., Манторов О.Г., Романович Н.А., Рущук А.Д., Сыродоев Г.Н., Тищенков А.А., Тофан-Дорофеев Е.В., Цуркану В.Ф. – Кишинёв: Экологическое общество ”BIOTICA”, 2021 (Tipogr. "Arconteh"). – 607 с.

ISBN 978-9975-3404-7-2 (PDF).

© 2021 Экологическое Общество ”BIOTICA”.




Рис. 1. Рамсарский сайт ”Нижний Днестр” в Республике Молдова

Географическое положение

Территория Рамсарского сайта ”Нижний Днестр” находится на юго-восточной окраине Республике Молдова, по обоим берегам Днестра: в правобережной части - в 8 км южнее г. Бендеры, в левобережной – от южной границы с. Слобозия и до границы с Украиной [132].

Общая площадь составляет **50768** га

Сайт включает территорию районов Кэушень, Штефан-Водэ и Слобозия (Рис. 1).

Биогеографическое расположение

Территория находится в зоне контакта **Подольско-Молдавского и Дунайского лесостепных** и **Азово-Черноморского степного** биогеографических регионов [53, 54].

Геоботанические округа - **типчаково-ковыльных степей и пойменной растительности** Южно-Молдавского Приднестровья Евроазиатской степной области, краем захватывая округ **субаридных гырнецовых дубрав** [77].

Правовой статус и история создания охраняемой территории

Рамсарская территория ”Нижний Днестр” выделена на базе исследований, описания и картирования ценных растительных сообществ, редких видов флоры и фауны, выполненным Экологическим обществом ”BIOTICA”. Территория получила официальный международный статус сайта 1316 (3MD003) в Рамсарской конвенции 20 августа 2003 г. [3, 5] на базе документов, подготовленных в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и поданных в Секретариат конвенции. В соответствии с Законом о внесении изменений и дополнений в Закон о фонде природных территорий, охраняемых государством, № 1538-XIII от 25 февраля 1998 г. (№ 354-XVI от **22.12.2006**), Рамсарский сайт ”Нижний Днестр” введен в число территорий, охраняемых государством (ГЛАВА 131. ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ) [132].

Наиболее полные данные о биоразнообразии сайта получены за последние 20 лет, главным образом, в рамках проектов Экологичекого общества ”BIOTICA” по изучению и сохранению бассейна Днестра:

”**Разработка концепции возрождения реки Днестр**” (при поддержке Фонда Мак-Артуров, 1998-1999),

”**Сохранение ветлэндов Нижнего Днестра**” (при поддержке Рамсарской конвенции, 2001-2002),

”**Сохранение биоразнообразия экосистем дельты Нижнего Днестра**” (при поддержке Глобального Экологического Фонда и Всемирного Банка, 2002-2005),

”**Сохранение находящихся под угрозой змей и восстановление степных местообитаний**” (при поддержке Фракфуртского зоологического общества, 2004),

”**Разработка плана управления для Талмазских плавней и сохранение летучих мышей**” (при поддержке Фонда Мишеля Отто, 2005),

”Совместное строительство будущего для международно признанной целостной зоны Нижнего Днестра и выше по течению” (при поддержке Европейского Союза, 2010-2011).

”**Разработка национальной экологической сети Молдовы как части Панъевропейской Экологической Сети, с акцентом на трансграничное сотрудничество**” (при поддержке Правительства Норвегии и выполняемого при координации IUCN Project, 2010-2012).

”**Улучшение водного управления и охрана связанных с водой экосистем в Рамсарском сайте ”Нижний Днестр**” (при поддержке Австрийского агентства по развитию, 2013-2014).

”Формирование национальной экологической сети – вклад на местном и на национальном уровне” (при поддержке программы малых грантов Глобального экологического фонда и внедряемого ПРООН, 2014-2015).

”Меры устойчивости для связанных с водой экосистем в Рамсарском сайте ”Нижний Днестр” (при поддержке Австрийского агентства по развитию, 2015).

”Основанная на экосистемах адаптация, меры по смягчению климата и институциональное развитие ”Нижнего Днестра” (при поддержке Австрийского агентства по развитию, 2018-2019).

На территории Расмарского сайта «Нижний Днестр» выделены 18 природных комплексов [132]: в Правобережном Приднестровье 13 комплексов: ”Копанка-Леунтя” (”Copanca-Leuntea”), ”Грэдина Турчаскэ” (”Grădina Turcească”), ”Туфа-Стынка Талмаза” (”Tufa-Stânca Talmaza”), ”Талмазские плавни” (”Lunca Talmaza”), ”Попяска» (”Popeasca”), ”Заозерное-Нукарь” (”Zaozernoe-Nucari”), ”Чиобурчиу-Рэскэець” (”Cioburciu-Răscăieţi”), „Рэскэец-Олэнешть” (”Răscăieţi-Olăneşti”) – прибрежная водо-охранная полоса, ”Пуркарь” (”Purcari”), ”Долина Олэнешть-Крокмаз” (”Lunca Olăneşti-Crocmaz”), ”Ымпэрэтяса” (”Împărăteasa”), водо-охранная полоса ”Крокмаз-Тудора” (”Crocmaz-Tudora”) и ”Тудора-Паланка” (”Tudora-Palanca”), в Левобережном – 5 комплексов: ”Кицкань” (”Chiţcani”), ”Озеро Лэптура-Старица Днестра” (”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”), ”Дубовый кут” (”Dubovîi cut”), ”Саги-Казачешть” (”Saghi-Kazaceşti”) и ”Дикуль-Куца-Мацаринский” (”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”) (Рис. 2).




Рис. 2. Рамсарский сайт «Нижний Днестр». Природные комплексы

Основные элементы Национальной экологической сети

Территория включает большой фрагмент **Днестровского (эко)биологического коридора международного значения** Панъевропейской экологической сети, создание которой предусмотрено международными документами.

По оценке 2010 года, в пределах сайта находятся **7** территорий-ядер НЭС, из **103** идентифицированных по всей стране [85]:

международного уровня – **1** (”Талмазские плавни”);

национального уровня – **3** (”Чиобурчиу–Рэскэец”, ”Попяска” и” Болото Тогай”);

локального уровня – **3** (”Кицканский лес”, ”Турецкий сад” и ”Копанка-Леунтя-Талмаза”).



Рис. 3. Рамсарский сайт «Нижний Днестр». Экологическая сеть

Биотопическое разнообразие

Сайт поддерживает высокое разнообразие растительных сообществ и экосистем. Выявлено **22** природных водных и наземных биотопов [132].

Водные биотопы (**7** типов):

Река - экосистема фрагмента Днестра
Долинные постоянные и временные озера и мелководья
Старое русло Днестра
Каналы - экосистема стоячих вод, регулярно взаимодействующая с рекой
Пресноводные дренажные системы, пруды и связанные с ними заболоченные водоемы
Солоноватоводные каналы
Экосистемы ручьев

Наземные местообитания включают 15 типов биотопов:

Пойменные леса на территории сайта представлены сообществами ивы белой и тополя белого, а также уникальными в Молдове ясеневыми лесами (местообитание общеевропейского значения).

Включают **4** типичных биотопа:

Периодически затопляемые тополевые леса
Прибрежные заболоченные ивовые леса
Незатопляемые ясеневые леса
Искусственные монодоминантные посадки

Нагорные леса представлены главным образом искусственными посадками или деградированными древостоями из южной ксерофильной формы дуба черешчатого и дуба пушистого.

Они формируют **5** типов биотопов:

Полуаридный дубовый куртинный лес из Quercus pubescens
Полуаридные дубравы из Quercus robur
Естественные древесно-кустарниковые заросли
Сложные по составу лесопосадки
Акациевые посадки противоэрозионного и производственного назначения

Природные луга и степи в стране почти полностью уничтожены, за исключением небольших фрагментов. Травянистые биотопы в значительной степени требуют восстановления.

Сухие природные травянистые территории (степи). На территории сайта распространены луговые и настоящие степи, субтропические степи практически полностью исчезли.

Засоренные сухие травостои и пастбища

Высокотравные пойменные луга

Долинные пастбища

Заболоченные луга и болотца

Травяные болота

Территория сайта поддерживает сохранение типов местообитаний **"NATURA-2000" – Европейские экологические сети – системы специальных охраняемых территорий в Европе** [20].

Европейская программа опирается на два основных документа:

- **Директиву по сохранению естественных сред обитания и дикой фауны и флоры** [14];
- **Директиву по защите диких птиц** [13].

Целью Европейской экологической сети "NATURA-2000" является гарантия долгосрочного сохранения естественной среды обитания и популяций видов, т. е. „поддержка и/или восстановление редких, подверженных опасности или уязвимых естественных сред обитания и видов флоры и фауны" (ст. 3 Директивы 92/43) [20]**. В сеть входят специальные защищенные районы в соответствии с Директивой по местообитаниям и Директивой по защите диких птиц.**

На территории сайта выявлены 11 типов местообитаний **”NATURA-2000”** [20, 191], **включенных в Приложение I ”Типы естественных мест обитания, находящиеся в сфере интересов сообщества, чье сохранение требует определения особо охраняемых районов” ДИРЕКТИВЫ СОВЕТА ЕС N 92/43/ЕЭС ОБ ОХРАНЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МЕСТ ОБИТАНИЯ И ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ**

Код соответствует коду сети «NATURA-2000» с указанием типичных для местообитания видов

1. Береговые и галофитные местообитания

13. Континентальные засоленные болота и засоленные луга

1310. Сообщества *Salicornia* и других однолетников, колонизирующих засоленные мокрые прибрежные участки

1340. Континентальные засоленные луга

Типичные виды – представители родов ***Salicornia, Crypsis, Puccinellia***



Типичные виды – ***Puccinellia distans*** (Jacq.) Parl.**, *P. gigantea*** (Grossh.) Grossh. **, *Juncus gerardii*** Loisel.



15. Засоленные внутренние (континентальные) степи

1530(А). Засоленные (континентальные) степи

Типичные виды – ***Artemisia santonica*** L., ***Sueda prostrata*** Pall., ***Lepidium latifolium*** L., ***Camphorosma annua*** Pall., ***Juncus gerardii*** Loisel., ***Festuca pseudovina*** Hack. ex Wiesb., ***Brachyactis ciliata*** (Ledeb.) Ledeb.




3. Пресноводные местообитания


31. Стоячие воды

3150. Природные эвтрофные озера

Типичные виды – ***Nymphaea alba*** L., ***Nymphoides peltata*** (S.G.Gmel.) O.Kuntze, ***Stratiotes aloides*** L., ***Sagittaria sagittifolia*** L., ***Trapa natans*** L.



Старица Днестра



Озеро Адана

32. Текучие воды
3210. Реки и заболоченные берега

Типичные виды – ***Chenopodium rubrum*** L., ***Persicaria lapathifolia*** (L.) S.F.Gray, ***Persicaria hydropiper*** (L.) Spach, ***Bidens radiata*** Thuill., ***B. tripartita*** L., ***Eleocharis acicularis*** (L.) Roem. et Schult., ***Cyperus fuscus*** L., ***C. glaber*** L., ***Dichostylis micheliana*** (L.) Nees, ***Batrachium trichophyllum*** (Chaix) Bosch **(наземная форма),** ***Potentilla supina*** L.

Река Днестр



6. Натуральные и полуприродные травяные сообщества

62. Полуприродные сухие травяные сообщества и заросли кустарников

6210. Полуприродные сухие луга

6210-ii. Остепненные луга (*Festucetalia valesiacae*)

Типичные виды – ***Festuca valesiaca*** Gaudin, ***Adonis vernalis*** L., ***Euphorbia sequeriana*** Neck., ***Centaurea marschalliana*** Spreng., ***Clematis recta*** L., ***Salvia pratensis*** L., ***Stipa capillata*** L., ***S.pennata*** L., ***S. pulcherrima*** C.Koch, ***Pulsatilla nigricans*** Störk



6240. Причерноморские травянистые степные сообщества
6240(С). Настоящие степи безлесных районов

Типичные виды – ***Festuca valesiaca*** Gaudin, ***Stipa lessingiana*** Trin. et Rupr., ***S. ucrainica*** P.Smirn., ***Koeleria cristata*** (L.) Pers., ***Agropyron pectinatum*** (M.Bieb.) Beauv., ***Stipa capillata*** L.**,** ***Poa angustifolia*** L., ***Salvia nutans*** L., ***Thymus marschallianus*** Willd., ***Adonis vernalis*** L., ***Artemisia austriaca*** Jacq., ***Astragalus onobrychis*** L., ***A. austriacus*** Jacq., ***Centaurea trinervia*** Steph., ***Crocus reticulatus*** Stev. ex Adams, ***Crambe tataria*** Sebeok, ***Goniolimon besserianum*** (Schult.) Kusn., ***Helichrysum arenarium*** (L.) Moench, ***Iris pumila*** L., ***Ornithogalum refracrum*** Schlecht.



6240(E). Типчаково-ковыльно-разнотравные (луговые и настоящие) степи полян пушистодубовой лесостепи

Типичные виды – ***Festuca valesiaca*** Gaudin, ***Stipa lessingiana*** Trin. et Rupr., ***S. ucrainica*** P.Smirn., ***Koeleria cristata*** (L.) Pers., ***Agropyron pectinatum*** (M.Bieb.) Beauv., ***Stipa capillata*** L., ***Poa angustifolia*** L., ***Verbascum phoeniceum*** L., ***Salvia nutans*** L., ***S. pratensis*** L., ***Thymus marschallianus*** Willd., ***Inula hirta*** L., ***I. ensifolia*** L., ***Iris pumila*** L., ***I. variegata*** L., ***Jurinea multiflora*** (L.) B.Fedtsch., ***Adonis vernalis*** L., ***Achillea setacea*** Waldst. et Kit., ***Artemisia austriaca*** Jacq., ***Astragalus onobrychis*** L., ***A. austriacus*** Jacq., ***Centaurea trinervia*** Steph., ***Crocus reticulatus*** Stev. ex Adams, ***Goniolimon besserianum*** (Schult.) Kusn., ***Helichrysum arenarium*** (L.) Moench, ***Nepeta parviflora*** M.Bieb., ***Onobrychis arenaria*** (Kit.) DC., ***Ornithogalum refracrum*** Schlecht.



65. Мезофильные травяные сообщества
6510. Низинные сенокосные луга

Избыточно увлажненные местообитания прирусловых и притеррасных частей пойм

Типичные виды – ***Phragmites australis*** (Cav.) Trin. ex Steud., ***Carex otrubae*** Podp., ***C. hirta*** L., **виды родов *Juncus* и *Agrostis***



Достаточно увлажняемые местообитания

Типичные виды – ***Elytrigia repens*** (L.) Nevski, ***Festuca pratensis*** Huds., ***Poa pratensis*** L., ***P. trivialis*** L., ***Phleum pratense*** L., ***Alopecurus pratensis*** L., ***Lolium perenne*** L.



9. Леса

91. Леса умеренной Европы

91 E0. Аллювиальные леса с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior*

Типичные виды – ***Fraxinus excelsior*** L., ***Populus nigra*** L., ***Salix alba*** *L.*, ***S. fragilis*** L., ***Ulmus glabra*** Huds., ***Rubus caesius*** L., ***Carex acutiformis*** Ehrh., ***C. sylvatica*** Huds., ***Cirsium oleraceum*** (L.) Scop., ***Filipendula ulmaria*** (L.) Maxim., ***Geranium sylvaticum*** L., ***Lycopus europaeus*** L., ***Lysimachia vulgaris*** L., ***Persicaria lapathifolia*** (L.) S.F.Gray, ***Rumex sanguineus*** L., ***Stellaria media*** (L.) Vill., ***Urtica dioica*** L.



91 I0. Евросибирские леса с видами *Quercus* spp.

Типичные виды – ***Quercus robur*** L., ***Acer campestre*** L., ***Crataegus monogyna*** Jacq., ***Euonymus verrucosa*** Scop., ***Ligustrum vulgare*** L., ***Prunus spinosa*** L.



91 AA. Восточноевропейские леса с *Quercus pubescens*

Типичные виды – ***Quercus pubescens*** Willd., ***Fraxinus excelsior*** L., ***Acer tataricum*** L., ***Sorbus domestica*** L., ***Cotinus coggygria*** Scop.



92 АО. Пойменные леса из *Salix alba* и *Populus alba*

Типичные виды – ***Salix alba*** L., ***S. cinerea*** L., ***S. fragilis*** L., ***Populus alba*** L., ***P. nigra*** L., ***Viburnum opulus*** L., ***Swida sanguinea*** (L.) Opiz, ***Sambucus nigra*** L., ***Frangula alnus*** Mill., ***Phragmites australis*** (Cav.) Trin. ex Steud., ***Carex acutiformis*** Ehrh., ***C. riparia*** Curt., ***Rubus caesius*** L., ***Agrostis stolonifera*** L., ***Elytrigia repens*** (L.) Nevski, ***Aegopodium podagraria*** L., ***Poa pratensis*** L., ***Humulus lupulus*** L., ***Vitis sylvestris*** C.C.Gmel.





Царство **Plantae** Haeckel **– Plante – Растения**

Конспект видов сосудистых растений Рамсарского сайта «Нижний Днестр», охраняемых на национальном и международных уровнях, представляет собой аннотированный список таксонов, произрастающих на его территории. В Конспект видов растений включены не охраняемые, но довольно редкие в республике Молдова и в биотопах сайта виды: *Alisma gramineum* Lej., *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult., *Eleocharis uniglumis* (Link) Schult., *Geranium palustre* L., *Gratiola officinalis* L., *Leopoldia tenuiflora* (Tausch) Heldr., *Ornithogalum divergens* Boreau, *Pilosella glaucescens* (Bess.) Sojak, *Potamogeton berchtoldii* Fieb., *Rosa micrantha* Borrer ex Smith, *Rosa tschatyrdagi* Chrshan., *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid., *Tanacetum odessanum* (Klokov) Tzvel. Семейства и виды внутри семейств расположены в алфавитном порядке.

Для каждого вида приводятся следующие характеристики:

- латинское название и синонимика вида [187], румынское и русское названия, ;
- принадлежность к семейству на латинском [187], румынском и русском языках;
- статус (категория редкости);
- охранный статус (включенность в Экологическое законодательство Республики Молдова [199]: I – исчезнувший вид, II – вид, находящийся под угрозой исчезновения, III – вид, численность которого сокращается катастрофически быстро, что может поставить его под угрозу исчезновения, IV – редкий вид, V – неопределенный вид, VI – восстановленный вид, VII – недостаточно изученный вид, VIII – вид, не вызывающий опасений), Операционный список [190], Красную Книгу Республики Молдова [9], Красную книгу Приднестровья [112], Красную книгу Украины [185], Красную книгу Румынии [8], Списки МСОП [21], Европейский Красный список [6], Бернскую Конвенцию [11], Приложения Директивы по местообитаниям [14], Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) [10];
- общий ареал [135-139, 178, 179];
- распространение в Республике Молдова [9, 30, 135-139];
- эндемичность и реликтовость;
- распространение на территории сайта – приуроченность к природным комплексам;
- приуроченность к местообитаниям;
- фото Гендова В.С., Ионица О.В. и Тофан-Дорофеев Е.В. Использованы материалы сайтов www.plantarium.ru и www.wikipedia.org

Флора и редкие виды сосудистых растений

В составе флоры Рамсарского сайта «Нижний Днестр» выявлено около **1000** видов сосудистых растений. Среди них встречается большое количество редких растений, охраняемых на международном и национальном уровнях – **105** видов [1, 9, 15-18, 23, 30-32, 35, 36, 68, 76, 78, 79, 94-105, 113, 129, 135-139, 143, 144, 146, 188, 189, 192, 193]. Они различаются по степени редкости, представлены разными по численности популяциями, распространение некоторых из них ограничивается одним или несколькими пунктами. Некоторые виды нуждаются в специальных мерах по сохранению, особенно виды высоких категорий редкости. Для них надлежит организовать мониторинг состояния их локальных популяций.

Под государственной охраной в Республике Молдова находятся 50 видов [199]: 22 вида находятся под угрозой исчезновения (категория **II**) – *Amygdalus nana* L., *Asparagus officinalis* L., *Asparagus tenuifolius* Lam., *Bellevalia sarmatica* (Georgi) Woronow, *Carex rhizina* Blytt ex Lindb., *Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova, *Chrysopogon gryllus* (L.) Trin., *Colchicum triphyllum* G.Kunze, *Convolvulus lineatus* L., *Crambe tataria* Sebeok, *Crocus reticulatus* Stev. ex Adams, *Helichrysum arenarium* (L.) Moench, *Maianthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt, *Nymphaea alba* L., *Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) O.Kuntze, *Petasites hybridus* (L.) Gaertn., Mey. et Scherb., *Platanthera chlorantha* (Cust.) Reichenb., *Salvinia natans* (L.) All., *Seseli tortuosum* L., *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit., *Trapa natans* L., *Veratrum nigrum* L.; 4 вида, численность которых сокращается катастрофически быстро, что может поставить их под угрозу исчезновения (категория **III**) – *Adonis vernalis* L., *Lunaria annua* L., *Utricularia vulgaris* L., *Vallisneria spiralis* L.; 1 вид (*Vitis sylvestris* C.C.Gmel.) находится под угрозой исчезновения поскольку численность сокращается катастрофически быстро (категории **II-III**); 1 вид (*Pyrus elaeagnifolia* Pall.) редкий, находится по угрозой исчезновения (категории **II-IV**); 1 вид (*Euonymus nanus* M.Bieb.) редкий, численность которого сокращается катастрофически быстро (категории **III-IV**); 9 редких видов (категория **IV**) – *Achillea coarctata* Poir., *Astragalus albidus* Waldst. et Kit., *Astragalus dasyanthus* Pall., *Cerastium glutinosum* Fries, *Goniolimon besserianum* (Schult.) Kusn., *Listera ovata* (L.) R. Br., *Pulsatilla montana* (Hoppe) Reichenb., *Scorzonera mollis* M.Bieb., *Typha laxmannii* Lepech.; состояние 12 видов не вызывает опасений (категория **VIII**) – *Asparagus verticillatus* L., *Hyacinthella leucophaea* (C.Koch) Schur, *Iris pumila* L., *Iris variegata* L., *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Aschers., *Ornithogalum refractum* Schlecht., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz, *Stipa lessingiana* Trin. et Rupr., *Stipa pennata* L., *Stipa pulcherrima* C.Koch, *Stipa ucrainica* P.Smirn., *Viburnum opulus* L.

Наиболее редкие виды высоких категорий редкости включены в Красную книгу Республики Молдова [9]: 9 критически угрожаемых видов (категория **CR**) – *Achillea ochroleuca* Ehrh., *Carex rhizina* Blytt ex Lindb., *Colchicum triphyllum* G.Kunze, *Erodium ciconium* (L.) L`Her., *Maianthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt, *Medicago rigidula* (L.) All., *Pyrus elaeagnifolia* Pall., *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit., *Trapa natans* L.; 8 угрожаемых (категория **EN**) – *Convolvulus lineatus* L., *Crambe tataria* Sebeok, *Nymphaea alba* L., *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Aschers., *Potentilla astracanica* Jacq., *Salvinia natans* (L.) All., *Stipa tirsa* Stev., *Vitis sylvestris* C.C.Gmel.; 6 уязвимых видов (категория **VU**) – *Bellevalia sarmatica* (Georgi) Woronow, *Chrysopogon gryllus* (L.) Trin., *Cyperus glomeratus* L., *Euonymus nanus* M.Bieb., *Scirpus triqueter* L., *Scorzonera mollis* M.Bieb.

В Красную книгу Приднестровья включен 31 вид [112]: 2 критически угрожаемых вида (категория **CR**) – *Listera ovata* (L.) R.Br., *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit.; 4 угрожаемых (категория **EN**) – *Astragalus exscapus* L., *Nymphaea alba* L., *Petasites hybridus* (L.) Gaertn., Mey. et Scherb.; 24 уязвимых (категория **VU**) – *Adonis vernalis* L., *Asparagus tenuifolius* Lam., *Astragalus dasyanthus* Pall., *Bellevalia sarmatica* (Georgi) Woronow, *Campanula persicifolia* L., *Convolvulus lineatus* L., *Crocus reticulatus* Stev. ex Adams, *Helichrysum arenarium* (L.) Moench, *Hyacinthella leucophaea* (C.Koch) Schur, *Inula helenium* L., *Iris hungarica* Waldst. et Kit., *Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) O.Kuntze, *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Aschers., *Ornithogalum kochii* Parl., *Ornithogalum refractum* Schlecht., *Pulsatilla montana* (Hoppe) Reichenb., *Pulsatilla ucrainica* (Ugr.) Wissjul., *Salvinia natans* (L.) All., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz, *Stipa pennata* L., *Stipa pulcherrima* C.Koch, *Stipa tirsa* Stev., *Trapa natans* L., *Veratrum nigrum* L. и 1 вид (*Colchicum triphyllum* G.Kunze) с дефицитом данных (категория DD).

В Операционный список, составленный при разработке Национальной Экологической Сети Республики Молдова, включены 72 вида [190].

На территории сайта встречаются виды, редкие в сопредельных регионах – в Украине и Румынии. В Красную книгу Румынии включены 11 видов [8], в том числе 4 критически угрожаемых вида (*Carex rhizina* Blytt ex Lindb., *Convolvulus lineatus* L., *Elatine hydropiper* L., *Trifolium vesiculosum* Savi), 1 (*Bellevalia sarmatica* (Georgi) Woronow) угрожаемый, 5 (*Achillea coarctata* Poir., *Scorzonera mollis* M.Bieb., *Seseli tortuosum* L., *Stipa ucrainica* P.Smirn., *Symphytum tauricum* Willd.) уязвимых и 1 вид (*Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit.) низкого риска исчезновения.

В Красную книгу Украины включены 25 произрастающих на территории сайта видов [185], из них 12 видов категории ”**Вразливий**” – *Astragalus dasyanthus* Pall., *Astragalus ponticus* Pall., *Chrysopogon gryllus* (L.) Trin., *Colchicum triphyllum* G.Kunze, *Crambe tataria* Sebeok, *Euonymus nanus* M.Bieb., *Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) O.Kuntze, *Ornithogalum refractum* Schlecht., *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit., *Stipa pennata* L., *Stipa pulcherrima* C.Koch, *Stipa tirsa* Stev., 2 вида категории ”**Рідкісний**” – *Arum orientale* M.Bieb., *Chamaecytisus rochelii* (Wierzb.) Rothm. и 11 видов категории ”**Неоцінений**” – *Adonis vernalis* L., *Crocus reticulatus* Stev. ex Adams, *Listera ovata* (L.) R.Br., *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Aschers., *Platanthera chlorantha* (Cust.) Reichenb., *Pulsatilla ucrainica* (Ugr.) Wissjul., *Salvinia natans* (L.) All., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz, *Stipa lessingiana* Trin. et Rupr., *Stipa ucrainica* P.Smirn., *Trapa natans* L.

В Красный Список Европы включены 6 видов (виды категории **LC** не учитывались) [6]. Из них 2 вида близкие к уязвимому положению (категория **NT**) – *Dichostylis micheliana* (L.) Nees и *Trapa natans* L. и 4 вида с дефицитом данных (категория **DD**) – *Iris hungarica* Waldst. et Kit., *Potamogeton compressus* L., *Pyrus elaeagnifolia* Pall., *Veronica euxina* Turrill.

Из списка Конвенции по Сохранению Европейской дикой природы и естественных местообитаний (Бернская Конвенция, 1979) [11] строго охраняемых видов отмечены: *Crambe tataria* Sebeok, *Salvinia natans* (L.) All., *Trapa natans* L., *Veronica euxina* Turrill.

В Приложения II и IV Директивы по местообитаниям (Директива Совета 92/43/EEC от 21 мая 1992 по сохранению природных местообитаний и дикой фауны и флоры) [14] включены 2 вида – *Crambe tataria* Sebeok и *Iris hungarica* Waldst. et Kit.

В Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) [10] включены 3 вида – *Adonis vernalis* L., *Platanthera chlorantha* (Cust.) Reichenb. и *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit.

Семейство **Alismataceae** Vent. **– Alismatacee – Частуховые**

1. ***Alisma gramineum*** Lej. **– Limbariță graminee – Частуха злаковидная**

Alisma gramineum Lej. (=*Alisma loeselii* Gorski) **– Limbariță graminee – Частуха злаковидная**

Семейство **Alismataceae** Vent. **– Alismatacee – Частуховые**




Статус: вид близкий к уязвимому состоянию – **NT.**

Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется. Включен в Красный Список Европы как вид находящийся под наименьшей угрозой (категория **LC**).



Общее распространение: Евразия, Северная Америка, Африка (Эфиопия). ***Распространение в Республике Молдова***: почти по всей территории. ***На территории сайта*** встречалась на берегу старицы Днестра. Приводится на основании сборов В.Н.Андреева в 1947 году.



Семейство **Alliaceae** J.Agardh **– Aliacee – Луковые**

1. ***Allium paniculatum*** L. **– Ceapă paniculată – Лук метельчатый**


Allium paniculatum L. **– Ceapă paniculată – Лук метельчатый**
Семейство **Alliaceae** J.Agardh **– Aliacee – Луковые**



Статус: вид находится под наименьшей угрозой – **LC**.
Состояние охраны: включен в Операционный Список.
Общее распространение*:** Атлантическая, Средняя и Восточная (южная зона) Европа, Крым, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** почти по всей территории. ***На территории сайта встречается только в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець”, где приурочен к остепненным склонам. Растет группами с обилием 1-2.







Семейство **Amaryllidaceae** J.St.-Hil**. – Amarilidacee – Амариллисовые**


1. ***Sternbergia colchiciflora*** Waldst. et Kit. **– Ghiocel-de-toamnă – Штернбергия зимовникоцветная**

Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. (=*Amaryllis colchiciflora* (Waldst. et Kit.) Ker-Gawl.) **–**
Ghiocel-de-toamnă – Штернбергия зимовникоцветная
Семейство **Amaryllidaceae** J.St.-Hil**. – Amarilidacee – Амариллисовые**




Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Операционный Список. Как критически угрожаемый вид (категория **CR**) включен в Красную книгу Республики Молдова и в Красную книгу Приднестровья. Как вид с наименьшей угрозой исчезновения (категория **LR**) включен в Красную книгу Румынии и в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”). Включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
Общее распространение*:** Южная Европа и Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова*:** редко в р-нах Анений Ной, Кэушень, Тараклия, Кахул. В регионе вид находится на северном пределе ареала. Реликт с дизъюнктивным ареалом. ***На территории сайта встречается крайне редко в комплексах ”Копанка-Леунтя” и ”Туфа-Стынка Талмаза” на полянах дубрав из дуба пушистого и степных склонах. Растет одиночно или группами из 3-7 экземпляров с обилием 1.





Семейство **Apiaceae** Juss. **– Apiacee – Зонтичные**

1. ***Seseli tortuosum*** L. **– Zmeoae şerpuitoare – Жабрица извилистая**





Seseli tortuosum L. **– Zmeoae şerpuitoare – Жабрица извилистая**


Семейство **Apiaceae** Juss. **– Apiacee – Зонтичные**

Статус: вид находится под наименьшей угрозой – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**) и включен в Операционный Список; включен в Красную книгу Румынии как уязвимый вид (категория **VU**).

***Общее распространение*:** Балканский п-ов, Восточная Европа, Кавказ, Малая и Средняя Азия, Западная Сибирь. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично по всей территории.

На территории сайта встречается спорадично в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Попяска”, **”**Чиобурчиу-Рэскэець” и ”Пуркарь” па степных склонах, пастбищах, залежах. Растет одиночно или группами из нескольких экземпляров.





Семейство **Araceae** Juss. **– Aracee – Ароидные**


1. ***Arum orientale*** M.Bieb. **– Aron oriental – Аронник восточный**

Arum orientale M.Bieb. **– Aron oriental – Аронник восточный**
Семейство **Araceae** Juss. **– Aracee – Ароидные**



Статус: вид находится под наименьшей угрозой – **LC**. ***Состояние охраны***: включен в Красную книгу Приднестровья как угрожаемый вид (категория **EN)** и в Красную книгу Украины как редкий вид (категория ”**Рідкісний**”).

Общее распространение*:** Средняя и Восточная (Молдова) Европа, Крым, Средиземноморье, Малая Азия, Иран. ***Распространение в Республике Молдова*:** лесные районы. Третичный реликт. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Валя Туркулуй”, ”Валя Штюбей”, ”Копанка-Леунтя”, ”Кицкань” и ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, где растет одиночно или образует пятна при обилии 1-3 под пологом лесов из дуба черешчатого.





Семейство **Asparagaceae** Juss. **– Asparagacee – Спаржевые**


1. ***Asparagus officinalis*** L. **– Sparanghel medicinal – Спаржа лекарственная**
2. ***Asparagus tenuifolius*** Lam. **– Umbra iepurelui – Спаржа тонколистная**
3. ***Asparagus verticillatus*** L. **– Sparanghel verticilat – Спаржа мутовчатая**



Asparagus officinalis L. **– Sparanghel medicinal – Спаржа лекарственная**
Семейство **Asparagaceae** Juss. **– Asparagacee – Спаржевые**



Статус: вид близки к уязвимому состоянию – **NT.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II)** и включен в Операционный Список.



Общее распространение*:** в диком виде произрастает в районах с умеренным климатом по всему миру – в Северной Африке, Европе (кроме северных районов), Малой и Центральной Азии, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Культивируется повсеместно. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично по всей территории. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Попяска” и ”Чиобурчиу-Рэскэець”. Растет одиночно или образует мелкие группы с обилием 1-2 на лесных полянах и опушках, среди кустарников, склонах со степной растительностью.



Asparagus tenuifolius Lam. – **Umbra iepurelui – Спаржа тонколистная**

Семейство **Asparagaceae** Juss. **– Asparagacee – Спаржевые**






Статус: вид близки к уязвимому состоянию – **NT.**



Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Операционный Список и в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**).

Общее распространение: Восточная Европа (запад), Крым, Средиземноморье, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова***: лесные районы. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець” и ”Озеро Лэптура-Старый Днестр” под разреженным пологом лесов из дуба пушистого, на лесных полянах и опушках, среди кустарников. Растет обычно по 2-4(15) экземпляра или одиночно с оценками обилия 1-3.




Asparagus verticillatus L. **– Sparanghel verticilat – Спаржа мутовчатая**
Семейство **Asparagaceae** Juss. **– Asparagacee – Спаржевые**



Статус: specie aproape ameninţată – **NT.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**) и включен в Операционный Список.



Общее распространение: Восточная Европа (Республика Молдова, южные районы Украины), Балканский п-ов, Кавказ, Малая и Средняя Азия, Иран. ***Распространение в Республике Молдова***: бассейн реки Днестр, центральная и южная зоны. ***На территории сайта*** встречается повсеместно вне поймы Днестра. Растет одиночно или группами при обилии 1-2 на степных склонах, опушках лесов из дуба черешчатого и из дуба пушистого, в кустарниках.



Семейство **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**

1. ***Achillea coarctata*** Poir. **– Alunele comprimate – Тысячелистник сжатый**
2. ***Achillea ochroleuca*** Ehrh. **– Alunele palid-galbene – Тысячелистник бледножелтый**
3. ***Helichrysum arenarium*** (L.) Moench **– Siminoc arenicol – Цмин, Бессмертник**
4. ***Inula helenium*** L. **– Iarbă mare – Девясил высокий**
5. ***Petasites hybridus*** (L.) Gaertn., Mey. et Scherb. **– Captalan – Белокопытник гибридный**
6. ***Pilosella glaucescens*** (Bess.) Sojak **– Vulturiţă glaucescentă – Ястребиночка сизоватая**
7. ***Scorzonera mollis*** M.Bieb. **– Lăptiucă moale – Козелец мягкий**
8. ***Tanacetum odessanum*** (Klokov) Tzvel. **– Vetrice-de-Odesa – Пижма одесская**








Achillea coarctata Poir. **– Alunele comprimate – Тысячелистник сжатый**
Семейство **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**

Статус: вид угрожаемый – **EN**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**) и включен в Операционный Список. Включен в Красную книгу Румынии как уязвимый вид (категория **VU**).
Общее распространение**:** Средняя (юго-восток) и Восточная (юго-запад) Европа, Балканский п-ов, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*****:** южные районы. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза” и ”Чиобурчиу-Рэскэець” на остепненных склонах, полянах и опушках сухих дубрав. Растет мелкими группами при обилии 1(2).



Achillea ochroleuca Ehrh. **– Alunele palid-galbene – Тысячелистник бледножелтый**
Семейство **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**




Статус: вид угрожаемый – **EN**.

Состояние охраны: включен в Красную книгу Республики Молдова как критически угрожаемый вид (категория **CR**) и в Операционный Список.

Общее распространение*:** Балканский п-ов, юго-восток Средней Европы, юго-запад Украины. ***Распространение в Республике Молдова*:** центральная зона **(**р-он Анений Ной), юго-восточная (р-он Штефан-Водэ и Левобережное Приднестровье) и южная (р-ны Чимишлия, Тараклия, Кахул, Вулкэнешть, АТО Гагаузия). В регионе вид произрастает на северной границе ареала. ***На территории сайта встречается в единственном локалитете – комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець”, где растет на остепненном склоне. Образует мелкие группы при обилии 1(2).





Helichrysum arenarium (L.) Moench (=*Gnaphalium arenarium* L.) **– Siminoc arenicol – Цмин песчаный, Бессмертник**

Семейство **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**




Статус: вид уязвимый – **VU**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**) и включен в Операционный Список, в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**).

Общее распространение*:** Средиземноморье, Европа, Сибирь, Средняя Азия, Монголия. Типичный вид для степной и лесостепной зон. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично по всей территории страны. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Чиобурчиу-Рэскэець” и ”Попяска” на степных склонах, полянах и опушках лесов из дуба пушистого. Образует мелкие группы при обилии 1-2.






Inula helenium L. **– Iarbă mare – Девясил высокий**
Семейство **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**

Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: включен в Красную книгу Приднестровья в качестве уязвимого вида (категория **VU**).



Общее распространение: Евразия. ***Распространение в Республике Молдова***: спорадично в северной и центральной зонах. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ” и ”Талмазские плавни” на пойменных заболоченных и влажных лугах, берегах рек. Образует мелкие группы





Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey. et Scherb. (=*Tussilago hybrida* L.). **– Captalan – Белокопытник гибридный**

Семейство **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**




Статус: вид угрожаемый – **EN**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Приднестровья как угрожаемый вид (категория **EN**).



Общее распространение*:** Атлантическая, Средняя и Восточная Европа, Крым, Средиземноморье, Кавказ, ***Распространение в Республике Молдова*:** редко в центральной и юго-восточной зонах. ***На территории сайта встречается крайне в комплексе ”Тудора-Паланка” по кромке пойменного леса из тополя белого, ирригационных каналах. Образует пятна из нескольких экземпляров при обилии 1-2.



Pilosella glaucescens (Bess.) Sojak (=*Hieracium glaucescens* Bess.) **– Vulturiţă glaucescentă – Ястребиночка сизоватая**

Семейство **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**




Статус: вид близкий к уязвимому состоянию – **NT**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется.

Общее распространение*:** Средняя и Юго-Восточная Европа, Средиземноморье (восток), Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** редко в центральной и юго-восточной зонах. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя” и ”Чиобурчиу-Рэскэець” на пастбищах, сухих склонах, опушках гырнецов .Образует группы с обилием 1-2.






Scorzonera mollis M.Bieb. (=*Podospermum molle* (M.Bieb.) Fisch. et Mey.) **–**
Lăptiucă moale – Козелец мягкий
Семейство **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee. – Астровые**



Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Румынии как уязвимый вид (категория **VU**).
Общее распространение*:** Восточная Европа (центр и юг), Крым, Балканский п-ов, Малая Азия, Предкавказье. ***Распространение в Республике Молдова*:** бассейн реки Днестр и южная зона. ***На территории сайта встречается крайне редко в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець” на полянах и опушках гырнецов со степной растительностью. Растет одиночно или мелкими группами из нескольких экземпляров с обилием 1.





Tanacetum odessanum (Klokov) Tzvel. (=*Pyrethrum odessanum* Klokov) **– Vetrice-de-Odesa – Пижма одесская**

Семейство **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**




Статус: вид критически угрожаемый – **CR.**

Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется.

Общее распространение*:** Восточная Европа (южная зона). Понтический эндемик. ***Распространение в Республике Молдова*:** редко в центральной и южной зонах. ***На территории сайта встречается редко в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець” на степном склоне. Образует группы с обилием 1-2.





Семейство **Berberidaceae** Juss. **– Berberidacee – Барбарисовые**

1. ***Berberis vulgaris*** L. **– Dracilă comună – Барбарис обыкновенный**


Berberis vulgaris L. **– Dracilă comună – Барбарис обыкновенный**
Семейство **Berberidaceae** Juss. **– Berberidacee – Барбарисовые**



Статус: вид близкий к уязвимому состоянию – **NT.**
Состояние охраны: включен в Операционный Список,
Общее распространение**:** Европа, Кавказ, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*****:** спорадично в северной и южной лесостепи. ***На территории сайта*** встречается редко в комплексах ”Копанка-Леунтя” и ”Туфа-Стынка Талмаза”, где образует группы при обилии 2(3) на опушках гырнецов, посадках лесных культур.







Семейство **Boraginaceae** Juss. **– Boraginacee – Бурачниковые**

1. ***Symphytum tauricum*** Willd. **– Tătăneasă de-Crimeea – Окопник крымский**


Symphytum tauricum Willd. (=*Symphytum orientale* L.) **–**
Tătăneasă de-Crimeea – Окопник крымский
Семейство **Boraginaceae** Juss. **– Boraginacee – Бурачниковые**



Статус: вид находится под наименьшей угрозой – **LC**.
Состояние охраны: В Республике Молдова не охраняется. Включен в Красную книгу Румынии как уязвимый вид (категория **VU**).
***Общее распространение*:** Средняя (Румыния, Болгария) и Восточная (степная и лесостепная зоны), Крым, Кавказ, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично по всей территории, кроме южной зоны.



На территории сайта встречается в комплекса ”Грэдина Турчаскэ” на опушке пойменного леса. Растет мелкими группами с обилием 1.



Семейство **Brassicaceae** Burnett **– Brasicacee – Капустные**

1. ***Crambe tataria*** Sebeok **– Hodolean tătăresc – Катран татарский**
2. ***Lunaria annua*** L. **– Lopăţea anuală – Лунник однолетний**

Crambe tataria Sebeok **– Hodolean tătăresc – Катран татарский**
Семейство **Brassicaceae** Burnett **– Brasicacee – Капустные**




Статус: вид угрожаемый – **EN.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II)**, включен в Красную книгу Республики Молдова как угрожаемый вид (категория **EN**), в Операционный Список, в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”), Списки Бернской Конвенции и в Приложения II и IV Директивы по местообитаниям.

Общее распространение*:** Средняя (Венгрия, Румыния) и Восточная (юг) Европа, Средиземноморье (Болгария), Кавказ, Западная Сибирь. ***Распространение в Республике Молдова*:** редко по всему региону, кроме северо-восточных и юго-западных районов. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя” и ”Чиобурчиу-Рэскэець” на степных склонах, где растет одиночно при обилии1(2).






Lunaria annua L. **– Lopăţea anuală – Лунник однолетний**
Семейство **Brassicaceae** Burnett **– Brasicacee – Капустные**

Статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **III**).





Общее распространение: Южная Европа. ***Распространение в Республике Молдова***: спорадично в лесных районах. ***На территории сайта*** встречается в комплексе ”Грэдина Турчаскэ”. Растет в лесу мелкими группами при обилии 1(2).



Семейство **Campanulaceae** Juss. **– Campanulacee – Колокольчиковые**

1. ***Campanula persicifolia*** L. **– Clopoţel persicifoliu – Колокольчик персиколистный**


Campanula persicifolia L. **– Clopoţel persicifoliu – Колокольчик персиколистный**

Семейство **Campanulaceae** Juss. **– Campanulacee – Колокольчиковые**





Статус: вид находится под наименьшей угрозой – **LC**.
Состояние охраны: включен в Красную книгу Приднестровья в качестве уязвимого вида (категория **VU**).





Общее распространение: Европа (кроме Арктики) и Западная Сибирь. ***Распространение в Республике Молдова***: обычен в лесных районах. ***На территории сайта*** встречается редко в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Чиобурчиу-Рэскэець” под разреженным пологом. Растет одиночно или группами по несколько экземпляров при обилии 1.

Семейство **Caryophyllaceae** Juss. **– Cariofilacee – Гвоздиковые**


1. ***Cerastium glutinosum*** Fries. **– Cănăriţă glutinoasă – Ясколка клейкая**
2. ***Dianthus capitatus*** Balb. ex DC. **– Garofița capitată – Гвоздика головчатая**

Cerastium glutinosum Fries. (=*Cerastium ucrainicum* Pacz. ex Klokov). **–**
Cănăriţă glutinoasă – Ясколка клейкая
Семейство **Caryophyllaceae** Juss. **– Cariofilacee – Гвоздиковые**

Статус: вид находится под наименьшей угрозой – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**).



Общее распространение: Скандинавия, Атлантическая, Средняя и Восточная Европа, Крым, Средиземноморье, Малая Азия; интродуцирован в Северную Америку. ***Распространение в Республике Молдова***: спорадично по всему региону.






На территории сайта встречается спорадично на степных склонах, опушках лесов, рудерализированных местах, сельхозугодьях. Растет мелкими группами при обилии 1-2.

Dianthus capitatus Balb. ex DC. **– Garofița capitată – Гвоздика головчатая**
Семейство **Caryophyllaceae** Juss. **– Cariofilacee – Гвоздиковые**



Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.
Состояние охраны: в Республике Молдова вид не охраняется.
Общее распространение*:** Средняя и восточная (юг) Европа, Крым (юг), Средиземноморье, Малая Азия, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова*:** редко по всей территории. В регионе втречается на северном пределе распространения. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Копанка-Леунтя” на полянах гырнецов.





Семейство **Celastraceae** R.Br. **– Celastracee – Бересклетовые**

1. ***Euonymus nanus*** M.Bieb. **– Vonicer pitic – Бересклет карликовый**

Euonymus nanus M.Bieb. **– Vonicer pitic – Бересклет карликовый**

Семейство **Celastraceae** R.Br. **– Celastracee. – Бересклетовые**




Статус: вид уязвимый – **VU**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **III-IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова как уязвимый вид (категория **VU**), в Операционный Список и в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”).

***Общее распространение*:** Монголия, Китай, Украина, Молдова, Крым, Северный Кавказ, Польша, Румыния. ***Распространение в Республике Молдова*:** центральная зона (р-ны Глодень, Унгень, Кэлэраш, Стрэшень) и бассейн Днестра (р-ны Шолдэнешть, Орхей, Кэушень, Приднестровье). В регионе растет на южной границе ареала. Реликт.

На территории сайта встречается только в комплексе ”Грэдина Турчаскэ” под пологом пойменного леса из тополя белого. Образует группы при обилии 2.





Семейство **Convallariaceae** Horan. **– Convalariacee – Ландышевые**

1. ***Maianthemum bifolium*** (L.) F.W.Schmidt **– Umbrăvioară bifolie. – Майник двулистный**

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt (=*Convallaria bifolia* L.) **–**
Umbrăvioară bifolie – Майник двулистный
Семейство **Convallariaceae** Horan. **– Convalariacee – Ландышевые**




Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**], включен в Красную книгу Республики Молдова как критически угрожаемый вид (категория **CR**) и в Операционный Список.

Общее распространение*:** Европа, Сибирь, Монголия, Китай и Япония. ***Распространение в Республике Молдова*:** бассейн реки Днестр и центральная зона страны. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Грэдина Турчаскэ” в лесу.





Семейство **Convolvulaceae** Juss. **– Convolvulacee – Вьюнковые**

1. ***Convolvulus lineatus*** L. **– Volbură liniată – Вьюнок линейчатый**

Convolvulus lineatus L. – Volbură liniată – Вьюнок линейчатый
Семейство **Convolvulaceae** Juss. – **Convolvulacee – Вьюнковые**






Статус: вид угрожаемый – **EN**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова как угрожаемый вид (категория **EN**), в Операционный Список, в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**) и в Красную книгу Румынии как критически угрожаемый вид (категория **CR**).

Общее распространение*:** Средиземноморье, Восточная Европа, Крым, Западная Сибирь, Малая и Центральная Азия, Кавказ, Иран. ***Распространение в Республике Молдова*:** бассейн Среднего и Нижнего Днестра. В регионе находится на северной границе ареала. ***На территории сайта встречается крайне редко, только в комплексе ”Попяска”. Образует группы при обилии 2(3) на степном оползневом склоне



Семейство **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**

1. ***Carex caryophyllea*** Latourr. **– Rogoz cariofiloid – Осока гвоздиковая**
2. ***Carex pseudocyperus*** L. **– Rogoz pseudociperoid – Осока ложносытевая**
3. ***Carex rhizina*** Blytt ex Lindb. **– Rogoz rizineu – Осока корневищная**
4. ***Cyperus glomeratus*** L. **– Ciufă glomerată – Сыть скученная**
5. ***Dichostylis micheliana*** (L.) Nees **– Dihostil Micheli – Дихостилис Микели**
6. ***Eleocharis acicularis*** (L.) Roem. et Schult. – **Pipiriguţ acicular – Болотница игольчатая**
7. ***Eleocharis uniglumis*** (Link) Schult. **– Pipiriguţ uniglum – Болотница одночешуйная**
8. ***Juncellus serotinus*** (Rottb.) C.B. Clarke **– Juncel tardiv – Ситничек поздний**
9. ***Scirpus triqueter*** L. **– Ţipirig trigonal – Камыш трехгранный**


Carex caryophyllea Latourr. **– Rogoz cariofiloid – Осока гвоздиковая**
Семейство **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**



Статус: вид угрожаемый – **EN**.
Состояние охраны: включен в Операционный Список.



Общее распространение**:** Европа, Западная Азия (Турция, Иран), Северная Африка, Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова*****:** спорадично по всей территории. ***На территории сайта*** встречается редко – в комплексах ”Туфа-Стынка Талмаза” и ”Чиобурчиу-Рэскэець” на полянах аридных лесов из дуба пушистого. Образует группы, изредка пятна при обилии 1-2(3).




Carex pseudocyperus L. **– Rogoz pseudociperoid – Осока ложносытевая**
Семейство **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**



Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.
Состояние охраны: включен в Операционный Список.
Общее распространение**:** Евразия, Северная Африка и Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова*****:** центральная (р-он Орхей) и юго-восточная (р-он Штефан-Водэ) зоны. ***На территории сайта*** встречается только на заболоченном меандре Днестра в комплексе ”Рэскэець-Олэнешть” и в ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Образует группы при обилии 1 на влажных и заболоченных лугах.





Carex rhizina Blytt ex Lindb. (=*C. pediformis* C.A.Mey. subsp. *rhizodes* (Blytt ex Meinsh.) Lindb. fil.) **– Rogoz rizineu – Осока корневищная**


Семейство **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**





Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова и в Красную книгу Румынии как критически угрожаемый вид (категория **CR**).






Общее распространение: Северная, Средняя (восток) и Восточная Европа, Кавказ, Западная Сибирь. ***Распространение в Республике Молдова***: бассейн реки Днестр. ***На территории сайта*** встречается крайне редко – только в комплексе ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Растет мелкими группами при обилии 1 в дубовом лесу, на полане.

Cyperus glomeratus L. – Ciufă glomerată – Сыть скученная
Семейство **Cyperaceae** Juss. – Ciperacee – Осоковые



Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: включен в Красную книгу Республики Молдова как уязвимый вид (категория **VU**) и в Операционный Список.
Общее распространение*:** Евразия. ***Распространение в Республике Молдова*:** долина Нижнего Днестра и Прута в центральной и южной части. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Лунка Талмаза”, ”Озеро Лэптура-Старый Днестр”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский” по берегам озер, заболоченным лугам. Растет одиночно или образует плотные дерновинки при обилии 1.






Dichostylis micheliana (L.) Nees (=*Cyperus michelianus* (L.) Link.) **–**
Dihostil Micheli – Дихостилис Микели
Семейство **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**

Статус: вид уязвимый – **VU**.

Состояние охраны: включен в Операционный Список. Включен в Красный Список Европы как вид близкий к уязвимому состоянию (категория **NT**).

Общее распространение*:** Средняя (Румыния) и Восточная (юг) Европа, Средиземноморье, Средняя Азия, Западная Сибирь. ***Распространение в Республике Молдова*:** бассейны рек Днестр и Прут. В регионе вид находится на южном пределе распространения. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ” и ”Тудора-Паланка” на заболоченных местах в пойме реки. Растет группами при обилии 1-2(3).








Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. (=*Scirpus acicularis* L.) –
Pipiriguţ acicular – Болотница игольчатая
Семейство **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**

Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется.

Общее распространение*:** редко, известна только из комплекса ”Тудора-Паланка”. Образует груЕвразия и Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова: Днестр и Нижний Прут. ***На территории сайта*** встречается крайне ппы, изредка скопления при обилии 1-2 по берегу реки Днестр на переулажненных и заболоченных местах.



Eleocharis uniglumis (Link) Schult. (=*Scirpus uniglumis* Link, *Eleocharis euuniglumis* Zinserl.) **– Pipiriguţ uniglum – Болотница одночешуйная**

Семейство **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**





Статус: вид уязвимый – **VU**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется.

Общее распространение: Евразия.

Распространение в Республике Молдова: спорадично почти по всей территории. ***На территории сайта*** встречается в комплексе ”Долина Олэнешть-Крокмаз” на заболоченных и переувлажненных местах в пойме Днестра. Образует группы при обилии 1-2.






Juncellus serotinus (Rottb.) C.B. Clarke (=*Cyperus serotinus* Rottb.) **–**
Juncel tardiv – Ситничек поздний
Семейство **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**




Статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова включен в Операционный Список.
Общее распространение: Евразия. ***Распространение в Республике Молдова***: юго-восточная зона. ***На территории сайта*** была собрана и указана [143, 144] для левого берега реки Днестр, ниже по течению от ответвления рукава Турунчук. Образует группы на заболоченном лугу.





Scirpus triqueter L. (=*Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla) **– Ţipirig trigonal – Камыш трехгранный**
Семейство **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**

Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: включен в Красную книгу Республики Молдова как уязвимый вид (категория **VU**).
Общее распространение*:** Евразия. ***Распространение в Республике Молдова*:** пойма реки Днестр. ***На территории сайта встречается спорадично в пойме Днестра – в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Тудора-Паланка” и ”Дикуль-Куца-Мацаринский” в переувлажненных и заболоченных местах возле реки. Образует группы при обилии 1-2.






Семейство **Elatinaceae** Dumort. **– Elatinacee – Повойничковые**

1. ***Elatine hydropiper*** L. **– Piperul apei – Повойничек водяной перец**

Elatine hydropiper L. **– Piperul apei – Повойничек водяной перец**
Семейство **Elatinaceae** Dumort. **– Elatinacee – Повойничковые**

Статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова вид не охраняется. Включен в Красную книгу Румынии как критически угрожаемый вид (категория **CR**).
Общее распространение*:** Европа, Средиземноморье, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток. ***Распространение в Республике Молдова*:** юго-восточная зона страны. ***На территории сайта встречается крайне редко в комплексе ”Озеро Лэптура-Старый Днестр”. ***Staţiunea***: в стоячей воде и на сырых берегах, на мелководье. Образует мелкие пятна с оценкой обилия 1.






Семейство **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**

1. ***Astragalus albidus*** Waldst. et Kit. **– Coşaci alburiu – Астрагал беловатый**
2. ***Astragalus dasyanthus*** Pall. **– Zăvăcustă – Астрагал шерстистоцветковый**
3. ***Astragalus exscapus*** L. **– Coşaci acaul – Астрагал бесстебельный**
4. ***Astragalus ponticus*** Pall. **– Coşaci pontic – Астрагал понтийский**
5. ***Chamaecytisus lindemannii*** (V.Krecz.) Klásková **– Drob Lindeman – Ракитник Линдемана**
6. ***Chamaecytisus rochelii*** (Wierzb.) Rothm. **– Drob Roşel – Ракитник Рошеля**
7. ***Chamaecytisus ruthenicus*** (Fisch. ex Woloszcz.) Klásková **– Drob rusesc – Ракитник русский**
8. ***Lathyrus aphaca*** L. **– Măzăroi afil – Чина безлисточковая**
9. ***Medicago rigidula*** (L.) All. **– Lucernă rigidiusculă – Люцерна жестковатая**
10. ***Trifolium vesiculosum*** Savi **– Trfoi veziculos – Клевер пузырчатый**






Astragalus albidus Waldst. et Kit. (=*Astragalus vesicarius* auct., non L.) **– Coşaci alburiu – Астрагал беловатый**

Семейство **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**

Статус: вид уязвимый – **VU**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**) и включен в Операционный Список.

Общее распространение*:** Средняя (юго-восток) и Восточная (юг) Европа, Крым, Средиземноморье. Вид редкий по всему ареалу. ***Распространение в Республике Молдова*:** северо-восточные, центральные и южные районы. ***На территории сайта встречается только в комплексе ”Попяска” на остепненных склонах и среди кустарников. Растет мелкими группами при обилии 1(2) или одиночно.




Astragalus dasyanthus Pall. **– Zăvăcustă – Астрагал шерстистоцветковый**
Семейство **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**





Статус: вид близки к уязвимому состоянию – **NT.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Операционный Список и в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**). Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”).
***Общее распространение*:** Средняя (юго-восток) и Восточная (юг) Европа, Крым (степная зона), Балканский п-ов.
***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично, главным образом в центральных и южных районах. В регионе находится на северной границе ареала.






На территории сайта встречается в комплексе ”Попяска” на степных склонах. Растет мелкими группами из 5-8 особей с обилием 1(2) или одиночно.

Astragalus exscapus L. **– Coşaci acaul – Астрагал бесстебельный**
Семейство **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**



Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: включен в Операционный Список и в Красную книгу Приднестровья как угрожаемый вид (категория **EN**).





Общее распространение: Средняя и Восточная (юго-запад) Европа, Средиземноморье. ***Распространение в Республике Молдова***: спорадично по всей территории. В регионе находится на северном пределе ареала. ***На территории сайта*** встречается в единственном локалитете – комплекс ”Туфа-Стынка Талмаза”, где растет одиночно при обилии 1 на степном склоне.

Astragalus ponticus Pall. **– Coşaci pontic – Астрагал понтийский**

Семейство **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**




Статус: вид уязвимый – **VU**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется. Включен в Красную книгу Украины как уязвимый вид (категория “**Вразливий**”).

***Общее распространение*:** Средняя(Румыния) и Восточная (юг) Европа, Крым, Средиземноморье, Малая Азия, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова*:** бассейны рек Днестр и Прут, центральная и южная зоны. В регионе произрастает на северном пределе ареала.



На территории сайта встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Попяска”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь” на полянах сухих дубрав, остепненных склонах. Образует группы из нескольких экземпляров при обилии 1-2.




Chamaecytisus lindemannii (V.Krecz.) Klásková (=*Cytisus lindemannii* V.Krecz.) **– Drob Lindeman – Ракитник Линдемана**
Семейство **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**



Статус: вид угрожаемый – **EN**.
Состояние охраны: включен в Операционный Список.

Общее распространение*:** Средняя (Румыния) и Восточная (юг) Европа, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично по всей территории региона. ***На территории сайта обнаружен только в одном местонахождении – в комплексе ”Пуркарь” на степном склоне среди кустарников. Образует мелкие группы при обилии 1.






Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm. (=*Cytisus rochelii* Wierzb.) **– Drob Roşel – Ракитник Рошеля**
Семейство **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**





Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.
Состояние охраны: включен в Операционный Список и в Красную книгу Украины (категория “**Рідкісний**”).

Общее распространение*:** Средняя (юго-восток) и Восточная (Республика Молдова) Европа, Средиземноморье (Югославия). ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично по всей территории. В регионе произрастает на восточном пределе ареала. ***На территории сайта встречается редко, только в комплексах ”Чиобурчиу-Рэскэець” и ”Пуркарь”. Растет мелкими группами при обилии 1 на полянах, степных склонах, среди кустарников.



Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klásková (=*Cytisus ruthenicus* Fisch. ex Wołoszcz.) **– Drob rusesc – Ракитник русский**


Семейство **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**

Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**). Включен в Операционный Список.



Общее распространение: Средняя (восток) и Восточная Европа, Крым, Кавказ, Западная Сибирь (юго-запад). ***Распространение в Республике Молдова***: центральная и южная зоны. ***На территории сайта*** встречается редко в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець” на степных склонах и опушке гырнеца. Образует группы из нескольких экземпляров при обилии 1(2).






Lathyrus aphaca L. **– Măzăroi afil – Чина безлисточковая**
Семейство **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**



Статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова вид включен в Операционный Список.
Общее распространение*:** Атлантическая, Средняя и Восточная (юг) Европа, Крым, Малая и Средняя Азия, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова*:** центральная (р-он Стрэшень) и юго-восточная (р-он Кэушень) зоны. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Копанка-Леунтя” в лесах, на опушках. Растет одиночно или образует мелкие группы из нескольких экземпляров при обилии 1.








Medicago rigidula (L.) All. (=*Medicago polymorpha* L. var. *rigidula* L.) **–**
Lucernă rigidiusculă – Люцерна жестковатая
Семейство **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**

Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.

Состояние охраны: включен в Красную книгу Республики Молдова как критически угрожаемый вид (категория **CR**).



Общее распространение**:** юг Восточной Европы, Крым, Средиземноморье, Малая и Средняя Азия, Иран, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова*****:** юго-восток страны. В регионе растет на северном пределе ареала. ***На территории сайта*** встречается в лесном заповеднике ”Копанка” на территории комплекса ”Копанка-Леунтя”. Растет мелкими группами на опушке леса из дуба пушистого со степной растительностью.






Trifolium vesiculosum Savi (=*Trifolium turgidum* M.Bieb., *Amoria vesiculosa* (Savi) Roskov) **– Trfoi veziculos – Клевер пузырчатый**
Семейство **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**



Статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова включен в Операционный Список. Включен в Красную книгу Румынии как критически угрожаемый вид (категория **CR**).
Общее распространение*:** Восточная Европа (Молдова, юго-запад Украины), Крым, Средиземноморье, Малая Азия, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова*:** центральная зона и бассейн Нижнего Днестра. ***На территории сайта встречается в комплексах **”**Чиобурчиу-Рэскэець” и ”Пуркарь” на степных склонах.





Семейство **Geraniaceae** Juss. **– Geraniacee – Гераниевые**

1. ***Erodium ciconium*** (L.) L`Her. **– Pliscul berzei – Аистник аистовый**
2. ***Erodium ruthenicum*** M.Bieb. **– Priboi rusesc – Аистник русский**
3. ***Geranium palustre*** L. **– Geraniu palustru – Герань болотная**

Erodium ciconium (L.) L`Her. (=*Geranium cyconium* L.) **– Pliscul berzei – Аистник аистовый**

Семейство **Geraniaceae** Juss. **– Geraniacee – Гераниевые**


Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.

Состояние охраны: включен в Красную книгу Республики Молдова как критически угрожаемый вид (категория **CR**) и в Операционный Список.



Общее распространение: Атлантическая, Средняя и Восточная (юг) Европа, Крым, Средиземноморье, Малая и Средняя Азия, Иран, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова***: юго-восточная зона. ***На территории сайта*** встречается в единственном местонахождении в комплексе ”Копанка-Леунтя” на опушке леса из дуба пушистого со степной растительностью, в которой доминирует *Festuca valesiaca* и виды из рода *Stipa*. Растет одиночно или мелкими группами с обилием 1-2.






Erodium ruthenicum M.Bieb. (=*Erodium serotinum* Stev.) **–**
Priboi rusesc – Аистник русский
Семейство **Geraniaceae** Juss. **– Geraniacee – Гераниевые**



Статус: вид возможно регионально исчезнувший – **RE.**
Состояние охраны: включен в Операционный Список.
Общее распространение*:** Средняя и Восточная (юг) Европа, (?)Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова*:** редко в юго-восточной зоне. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Кицкань” на степных склонах. Приводится на основании сборов Tr. Săvulescu в 1934 году.






Geranium palustre L. **– Geraniu palustru – Герань болотная**
Семейство **Geraniaceae** Juss. **– Geraniacee – Гераниевые**



Статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется.
Общее распространение*:** Скандинавия, Европа, Средиземноморье, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова*:** редко, кроме южных районов. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Грэдина Турчаскэ”, на влажном лугу на берегу старого русла Днестра.





Семейство **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**

1. ***Bellevalia sarmatica*** (Georgi) Woronow **– Belevalie sarmaţiană – Бельвалия сарматская**
2. ***Hyacinthella leucophaea*** (C.Koch) Schur **– Zambilă albicioasă – Гиацинтик светло-голубой**
3. ***Leopoldia tenuiflora*** (Tausch) Heldr. **– Leopoldie tenuifloră – Леопольдия тонкоцветковая**
4. ***Ornithogalum boucheanum*** (Kunth) Aschers. **– Celnuşă Luşcă – Птицемлечник Буше**
5. ***Ornithogalum divergens*** Boreau **– Celnuşă divergentă – Птицемлечник расходящийся**
6. ***Ornithogalum kochii*** Parl. **– Celnuşă Koch – Птицемлечник Коха**
7. ***Ornithogalum refractum*** Schlecht. **– Celnuşă răsfrântă – Птицемлечник преломленный**


Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow (=*Hyacinthus sarmatica* Pall. ex Georgi) **– Belevalie sarmaţiană – Бельвалия сарматская**

Семейство **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**

Статус: вид уязвимый – **VU**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова и в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**), в Операционный Список. Как угрожаемый вид (категория **EN**) включен в Красную книгу Румынии.

Общее распространение*:** Восточно-европейская равнина. Крым, Предкавказье, Румыния, Болгария. ***Распространение в Республике Молдова*:** районы Фэлешть, Сынжерей, Теленешть, Кэушень, Чимишлия, Тараклия, Анений Ной, мун. Кишинэу, АТО Гагаузия, Приднестровье. ***На территории сайта встречается только в комплексе ”Попяска”. Растет одиночно или мелкими группами при обилии 1 на опушках со степной растительностью.










Hyacinthella leucophaea (C.Koch) Schur (=*Muscari leucophaea* C.Koch) **–**
Zambilă albicioasă – Гиацинтик светло-голубой
Семейство **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**




Статус: вид близки к уязвимому состоянию – **NT.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**). Включен в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**).
Общее распространение**:** Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Малая Азия. Понтическо-балканский эндемик. ***Распространение в Республике Молдова*****:** спорадично почти по всей стране. В регионе вид находится на северном пределе распространения. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Попяска”, ”Чиобурчиу-Рэскэець” на степных склонах, полянах лесов с *Quercus pubescens*. Растет рассеянными группами при обилии 1-2.






Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr. (=*Muscari tenuiflorum* Tausch) **–**
Leopoldie tenuifloră – Леопольдия тонкоцветковая
Семейство **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**

Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется.



Общее распространение**:** Европа, Кавказ, Средиземноморье, Малая Азия, Иран. ***Распространение в Республике Молдова*****:** спорадично по всей территории. ***На территории сайта*** встречается в комплексе ”Копанка-Леунтя”. Растут единичные экземпляры или мелкие группы при обилии 1 на опушках леса из дуба пушистого.




Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. (=*Myogalum boucheanum* Kunth) **– Celnuşă Luşcă – Птицемлечник Буше**
Семейство **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**



Статус: вид угрожаемый – **EN**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Республики Молдова как угрожаемый вид (категория **EN**), в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория ”**Неоцінений”**).
Общее распространение*:** Атлантическая и Средняя Европа, Украина, Молдова, Балканский п-ов, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** бассейн реки Днестр, центральная и южная зоны. ***На территории сайта встречается крайне редко, только в комплексе ”Кицкань” в пойменном лесу с дубом черешчатым. Образует мелкие группы при обилии 1-2(3).






Ornithogalum divergens Boreau **–**
Celnuşă divergentă – Птицемлечник расходящийся
Семейство **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**



Статус: вид с дефицитом данных – **DD**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется.
Общее распространение**:** Средняя и Южная Европа. ***Распространение в Республике Молдова*****:** юго-восточная зона (р-он Кэушень). ***На территории сайта*** встречается крайне редко, только в комплексе ”Копанка-Леунтя” на полянах субаридных лесов из дуба пушистого со степной растительностью. Приводится на основании сборов Л.П.Николаевой и К.Р.Витко в 1977 году.





Ornithogalum kochii Parl. (=*Ornithogalum tenuifolium* Guss.) **– Celnuşă Koch – Птицемлечник Коха**

Семейство **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**




Статус: вид уязвимый – **VU.**

Состояние охраны: в Республике Молдова включен в Операционный Список и в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**).

Общее распространение*:** Средняя и Восточная (юго-запад) Европа, Кавказ, Средиземноморье, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** бассейны Днестра и Прута, южная зона. ***На территории сайта встречается редко в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець” на полянах субаридных лесов со степной растительностью. Образует рассеянные группы с обилием 1-2.






Ornithogalum refractum Schlecht. **– Celnuşă răsfrântă – Птицемлечник преломленный**
Семейство **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**





Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий”**).
Общее распространение*:** Средняя и Восточная (юго-запад) Европа, Балканский п-ов, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** центральная и южная зоны. ***На территории сайта встречается спорадично в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза” и ”Чиобурчиу-Рэскэець” на полянах и опушках лесов из дуба пушистого, степных склонах. Образует группы и пятна с обилием 1-2 или 2-3.



Семейство **Hydrocharitaceae** Juss. **– Hidrocaritacee – Водокрасовые**

1. ***Hydrocharis morsus-ranae*** L. **– Iarba broaştelor – Водокрас обыкновенный**
2. ***Vallisneria spiralis*** L. **– Sârmuliţă spiralată – Валлиснерия спиральная**






Hydrocharis morsus-ranae L. **– larba broaştelor – Водокрас обыкновенный**

Семейство **Hydrocharitaceae** Juss. **– Hidrocaritacee – Водокрасовые**

Статус: вид уязвимый – **VU**.


Состояние охраны: включен в Операционный Список.

Общее распространение*:** Евразия и северо-запад Африки. ***Распространение в Республике Молдова*:** Нижний Днестр, Рэут и Прут: Приднестровье, р-ны Кахул, Штефан-Водэ, Теленешть, Глодень. В регионе вид находится на южном пределе ареала. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старый Днестр”. Образует мелкие группы в стоячей и медленно текущей воде.




Vallisneria spiralis L. **– Sârmuliţă spiralată – Валлиснерия спиральная**
Семейство **Hydrocharitaceae** Juss. **– Hidrocaritacee – Водокрасовые**





Статус: вид угрожаемый – **EN**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **III**) и включен в Операционный Список.
Общее распространение*:** Евразия и Северо-западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова*:** главным образом в Днестре (р-ны Дубэсарь, Штефан-Водэ) и Пруте (р-ны Глодень, Кахул). ***На территории сайта встречается редко в комплексах ”Грэдина Турчаскэ” и ”Талмазские плавни” в стоячей и медленно текущей воде. Образует пятна с обилием 1-2.



Семейство **Iridaceae** Juss. **– Iridacee – Ирисовые**

1. ***Crocus reticulatus*** Stev. ex Adams **– Şofrănel reticulat – Шафран сетчатый**
2. ***Iris hungarica*** Waldst. et Kit. **– Stânjenel unguresc – Касатик венгерский**
3. ***Iris pumila*** L. **– Stânjenel scund – Касатик карликовый**
4. ***Iris variegata*** L. **– Stânjenel vărgat – Касатик пестрый**

Crocus reticulatus Stev. ex Adams (=*Crocus variegatus* Hoppe et Hornsch.) **– Şofrănel – Шафран сетчатый**

Семейство **Iridaceae** Juss. **– Iridacee – Ирисовые**




Статус: вид близки к уязвимому состоянию – **NT.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**) и включен в Операционный Список, в Красную книгу Приднестровья в качестве уязвимого вида (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория ”**Неоцінений**”).

Общее распространение*:** Средняя и Восточная Европа, Средиземноморье, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова*:** центральные, южные и восточные районы. В регионе вид произрастает на северном пределе ареала. ***На территории сайта встречается повсеместно вне долины Днестра на открытых склонах со степной растительностью, остепненных пастбищах, полянах и опушках дубрав из дуба пушистого. Растет рассеянными группами или более крупными пятнами при обилии 2-3.






Iris hungarica Waldst. et Kit. **– Stânjenel unguresc – Касатик венгерский**
Семейство **Iridaceae** Juss. **– Iridacee – Ирисовые**



Статус: вид критически угрожаемый – **CR**
Состояние охраны: включен в Красную книгу Приднестровья в качестве уязвимого вида (категория **VU**) .
Общее распространение*:** Юго-Восточная Европа, Средиземноморье, Кавказ, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** центральные районы страны. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Туфа-Стынка Талмаза” и ”Чиобурчиу-Рэскэець” открытых склонах со степной растительностью, поляны и опушки леса из дуба пушистого. Растет рассеянными группами или образует пятна при обилии 1-2.






Iris pumila L. (=*Iris aequiloba* Ledeb.) **– Stânjenel scund – Касатик карликовый**
Семейство **Iridaceae** Juss. **– Iridacee – Ирисовые**



Статус: вид близки к уязвимому состоянию – **NT.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**).
Общее распространение*:** Юго-восточная Европа, Средиземноморье, Кавказ, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** центральные, восточные и южные районы. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Туфа-Стынка Талмаза” и ”Чиобурчиу-Рэскэець” на открытых склонах со степной растительностью, степных пастбищах, полянах и опушках лесов из дуба пушистого. Растет рассеянными группами или пятнами с обилием 1-2.








Iris variegata L. **– Stânjenel vărgat – Касатик пестрый**
Семейство **Iridaceae** Juss. **– Iridacee – Ирисовые**

Статус: вид угрожаемый – **EN**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**) и включен в Операционный Список.
Общее распространение*:** юго-восточная Европа, Балканский п-ов. ***Распространение в Республике Молдова*:** центральные, восточные и южные районы. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя” и ”Попяска” на открытых склонах со степной растительностью, полянах и опушках лесов из дуба пушистого. Растет мелкими рассеянными группами при обилии 1.




Семейство **Lemnaceae** S.F.Gray **– Lemnacee – Рясковые**

1. ***Spirodela polyrhiza*** (L.) Schleid. **– Lintiţă poliriză – Многокоренник обыкновенный**

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. (=*Lemna polyrrhiza* L.) **– Lintiţă poliriză – Многокоренник обыкновенный**
Семейство **Lemnaceae** S.F.Gray **– Lemnacee – Рясковые**



Статус: вид находится под наименьшей угрозой – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется.
Общее распространение*:** Евразия, Северная и Южная Америка, Австралия. ***Распространение в Республике Молдова*:** пойма рек Днестр и Прут. ***На территории сайта встречается повсеместно в водоемах в пойме Днестра. Образует мелкие группы и скопления вместе с видами рода *Lemna* в стоячей и слабо проточной воде ирригационных каналов, старицах, озере Адана.





Семейство **Lentibulariaceae** Rich **– Lentibulariacee – Пузырчатковые**


1. ***Utricularia vulgaris*** L. **– Burdujă comună – Пузырчатка обыкновенная**

Utricularia vulgaris L. **– Burdujă comună – Пузырчатка обыкновенная**
Семейство **Lentibulariaceae** Rich **– Lentibulariacee – Пузырчатковые**




Статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **III**).





Общее распространение*:** Евразия, Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова*:** редко на Нижнем Пруте, Среднем и Нижнем Днестре. ***На территории сайта встречается в старом русле Днестра (комплекс ”Грэдина Турчаскэ”) и озере Адана (комплекс ”Талмазские плавни”). Образует мелкие пятна.



Семейство **Linaceae** DC. ex S.F.Gray **– Linacee – Льновые**

1. ***Linum nervosum*** Waldst. et Kit. **– In multinervat – Лен жилковатый**

Linum nervosum Waldst. et Kit. **– In multinervat – Лен жилковатый**

Семейство **Linaceae** DC. ex S.F.Gray **– Linacee – Льновые**




Статус: вид находится под наименьшей угрозой – **LC**.

Состояние охраны: вид включен в Операционный Список.



***Общее распространение*:** Средняя (Румыния) и Восточная (юг) Европа, Крым, Средиземноморье (восток), Малая Азия (запад), Иран, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично по всей территории.

На территории сайта встречается только в комплексе ”Попяска”. Образует группы при обилии 1-2 на степных склонах.



Семейство **Melanthiaceae** Batsch **– Melantiacee – Мелантиевые**

1. ***Colchicum triphyllum*** G.Kunze **– Brănduşă trifilă – Безвременник трехлистный**
2. ***Veratrum nigrum*** L. **– Strigoaie neagră – Чемерица черная**


Colchicum triphyllum G.Kunze (=*Colchicum ancyrense* B.L.Burtt, *C. biebersteinii* Rouy) **–**
Brănduşă trifilă – Безвременник трехлистный
Семейство **Melanthiaceae** Batsch **– Melantiacee – Мелантиевые**

Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Республики Молдова как критически угрожаемый вид (категория **CR**), в Красную книгу Приднестровья как вид с дефицитом данных (категория **DD**) и в Красную книгу Украины (категория ”**Неоцінений**”).

Общее распространение*:** Балканский п-ов, Средняя (юго-восток) и Восточная (Украина (юг), Молдова) Европа, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** центральная и юго-восточная зона в бассейне реки Днестр и южные районы страны. В регионе находится на северном пределе ареала. ***На территории сайта в комплексе ”Копанка-Леунтя” одиночно или мелкими группами растет на поляне дубравы из дуба пушистого.






Veratrum nigrum L. **– Strigoaie neagră – Чемерица черная**
Семейство **Melanthiaceae** Batsch **– Melantiacee – Мелантиевые**

Статус: вид близки к уязвимому состоянию – **NT.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Операционный Список и в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**).



Общее распространение*:** юг Румынии, Республика Молдова и юго-запад Украины. Добружско-понтический эндемик. ***Распространение в Республике Молдова*:** лесные районы на севере страны и р-ны Анений Ной, Кэушень. ***На территории сайта встречается крайне редко в комплексе ”Грэдина Турчаскэ” на полянах в лесных фитоценозах. Растет одиночно или мелкими группами при обилии 1.



Семейство **Menyanthaceae** Dumort. **– Meniantacee – Вахтовые**

1. ***Nymphoides peltata*** (S.G.Gmel.) O.Kuntze **– Plutică peltată – Болотноцветник щитолистный**

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) O.Kuntze (=*Limnanthemum peltatum* S.G.Gmel., *Menyanthes nymphoides* L.)
– Plutică peltată – Болотноцветник щитолистный
Семейство **Menyanthaceae** Dumort. **– Meniantacee – Вахтовые**


Статус: вид близкий к уязвимому состоянию – **NT.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория "**Вразливий**").

Общее распространение*:** Евразия. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично в бассейне Нижнего Днестра и Нижнего Прута. Третичный реликт. ***На территории сайта встречается в комплексах "Грэдина Турчаскэ", "Талмазские плавни" şi "Долина Олэнешть-Крокмаз" в стоячей и слабо проточной воде в старом русле Днестра и ирригационных каналах. Образует пятна и скопления при обилии 1-2 или 3-4.







Семейство **Najadaceae** Juss. **– Naiadacee – Наядовые**


1. ***Caulinia minor*** (All.) Coss. et Germ. **– Caulinie minoră – Каулиния малая**

Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. (=*Najas minor* All.) **– Caulinie minoră – Каулиния малая**
Семейство **Najadaceae** Juss. **– Naiadacee – Наядовые**

Статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: включен в Операционный Список.
Общее распространение*:** Евразия и Африка. ***Распространение в Республике Молдова*:** редко в юго-восточной и южной зонах. ***На территории сайта встречается редко – только в комплексе ”Грэдина Турчаскэ” в Старице Днестра. Приводится на основании сборов Н.В.Смирновой-Гараевой в 1962 году.







Семейство **Nymphaeaceae** Salisb. **– Nimfeacee – Кувшинковые**


1. ***Nymphaea alba*** L. **– Nimfă albă – Кувшинка белая**


Nymphaea alba L. (=*Nymphaea minoriflora* (Simonk.) Wissjul., *Castalia minoriflora* Simonk.) **–**
Nimfă albă – Кувшинка белая
Семейство **Nymphaeaceae** Salisb. **– Nimfeacee – Кувшинковые**

Статус: вид угрожаемый – **EN**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), как угрожаемый вид (категория **EN**) включен в Красную книгу Республики Молдова и в Красную книгу Приднестровья, в Операционный Список

Общее распространение*:** Европа, Малая Азия, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова*:** бассейн Нижнего Днестра и Нижнего Прута. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Грэдина Турчаскэ” [143, 144] и ”Лунка Талмаза” в старом русле Днестра и ирригационных каналах. Растет одиночно при обилии 1.





Семейство **Orchidaceae** Juss. **– Orhidacee – Орхидные**

1. ***Listera ovata*** (L.) R. Br. **– Buhăiaş ovat – Тайник яйцевидный**
2. ***Platanthera chlorantha*** (Cust.) Reichenb. **– Stupiniţă verzuie – Любка зеленоцветковая**

Listera ovata (L.) R. Br. (=*Ophrys ovata* L.) **– Buhăiaş ovat – Тайник яйцевидный**


Семейство **Orchidaceae** Juss. **– Orchidaceae – Орхидные**

Статус: вид уязвимый – **VU**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Приднестровья как критически угрожаемый вид (категория **CR**) и в Красную книгу Украины (категория ”**Неоцінений**”).



Общее распространение: Европа, Кавказ, Средиземноморье, Малая и Средняя Азия. ***Распространение в Республике Молдова***: бассейн реки Днестр, северная и центральная зоны. ***На территории сайта*** указана для комплекса ”Грэдина Турчаскэ” [143, 144]. Растут единичные экземпляры или мелкие группы при обилии 1 в пойменном лесу из тополя белого.






Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. (=*Orchis chlorantha* Cust.) **–**
Stupiniţă verzuie – Любка зеленоцветковая
Семейство **Orchidaceae** Juss. **– Orchidaceae – Орхидные**

Статус: вид угрожаемый – **EN**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Украины (категория ”**Неоцінений”**). Включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).



Общее распространение: Европа, Кавказ, Средиземноморье, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова***: северная, центральная и юго-восточная зоны. ***На территории сайта*** встречалась в прошлом в лесах в комплексе ”Грэдина Турчаскэ” [143, 144].




Семейство **Plumbaginaceae** Juss. **– Plumbaginacee – Свинчатковые**

1. ***Goniolimon besserianum*** (Schult.) Kusn. **– Apărătoare Beser – Углостебельник Бессера**
2. ***Limonium hypanicum*** Klokov **– Sică hipanică – Кермек южнобугский**

Goniolimon besserianum (Schult.) Kusn. (=*Statice besseriana* Schult.) **– Apărătoare Beser – Углостебельник Бессера**
Семейство **Plumbaginaceae** Juss. **– Plumbaginacee – Свинчатковые**



Статус: вид находится под наименьшей угрозой – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**).
Общее распространение**:** Средняя, южная и юго-восточная Европа (Румыния, Болгария, Молдова, Украина). Понтический эндемик. ***Распространение в Республике Молдова*****:** спорадично по всей стране. ***На территории сайта*** встречается спорадично в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Попяска”, ”Чиобурчиу-Рэскэець” на степных склонах, полянах гырнецов. Растет одиночно или образует группы при обилии 1(2).






Limonium hypanicum Klokov (=*Limonium gmelinii* (Willd.) O.Kuntze, *Statice gmelinii* Willd.) **–**
Sică hipanică – Кермек южнобугский
Семейство **Plumbaginaceae** Juss. **– Plumbaginacee – Свинчатковые**

Статус: вид находится под наименьшей угрозой – **LC**.
Состояние охраны: включен в Операционный Список.



Общее распространение**:** Средняя и Юго-восточная Европа, юг Сибири, Средняя Азия. ***Распространение в Республике Молдова*****:** спорадично почти по всей территории. ***На территории сайта*** встречается в комплексе ”Талмазские плавни” солонцеватых лугах, травяных откосах дамбы. Растет одиночно или группами из нескольких экземпляров с обилием 1.





Семейство **Poaceae** Barnhart **– Poacee – Злаки**

1. ***Chrysopogon gryllus*** (L.) Trin. **– Sadină – Золотобородник цикадовый**
2. ***Stipa lessingiana*** Trin. et Rupr. **– Negară Lesing – Ковыль Лессинга**
3. ***Stipa pennata*** L. **– Negară penată – Ковыль перистый**
4. ***Stipa pulcherrima*** C.Koch **– Negară frumoasă – Ковыль красивейший**
5. ***Stipa tirsa*** Stev. **– Negară piramidală – Ковыль узколистный**
6. ***Stipa ucrainica*** P.Smirn. **– Negară ucraineană – Ковыль украинский**


Chrysopogon gryllus (L.) Trin. (=*Andropogon gryllus* L.) **– Sadină – Золотобородник цикадовый**
Семейство **Poaceae** Barnhart **– Poacee – Злаки**



Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: включен в Красную книгу Республики Молдова как уязвимый вид (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”), в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**) и включен в Операционный Список.



***Общее распространение*:** Средняя (юго-восток) и Восточная (Украина, Молдова) Европа, Кавказ, Средиземноморье, Малая Азия, Иран.




Распространение в Республике Молдова*:** центральная и южная зоны. В регионе вид находится на северном пределе ареала. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя” и ”Чиобурчиу-Рэскэець” на полянах и опушках лесов из дуба пушистого. Образует группы при обилии 1.

Stipa lessingiana Trin. et Rupr. **– Negară Lesing – Ковыль Лессинга**
Семейство **Poaceae** Barnhart **– Poacee – Злаки**





Статус: вид находится под наименьшей угрозой – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**) и включен в Операционный Список. Включен в Красную книгу Украины как неоцененный вид (категория ”**Неоцінений**”).
Общее распространение*:** степная зона на юго-востоке Средней и юге Восточной Европы, юг Западной Сибири, в Малой Азии, Иране, Китае. ***Распространение в Республике Молдова*:** степные и лесостепные районы. ***На территории сайта встречается спорадично в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Попяска”, ”Чиобурчиу-Рэскэець” и ”Пуркарь”. Растет мелкими группами с обилием 1-2 на степных склонах, полянах и опушках гырнецов.



Stipa pennata L. – Negară penată – Ковыль перистый
Семейство **Poaceae** Barnhart – **Poacee – Злаки**




Статус: вид угрожаемый – **EN**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория "**Вразливий**").

***Общее распространение*:** Средиземноморье, степная и лесостепная зоны Восточной Европы и Западной Сибири, Малая и Средняя Азия.



Распространение в Республике Молдова*:** спорадично по всей территории. ***На территории сайта встречается спорадично в комплексах "Попяска" и "Чиобурчиу-Рэскэець" на степных склонах, полянах и опушках гырнецов. Растет мелкими группами при обилии 1-2.




Stipa pulcherrima C.Koch **– Negară frumoasă – Ковыль красивейший**
Семейство **Poaceae** Barnhart **– Poacee – Злаки**



Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”).
Общее распространение*:** Средняя и Восточная Европа, Средиземноморье, Иран, Кавказ, Западная Сибирь (юг), Малая и Средняя Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** степные и лесостепные районы. ***На территории сайта встречается редко в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Попяска” и ”Чиобурчиу-Рэскэець” на полянах гырнецов, степных склонах. Растет одиночно или группами с обилием 1-2.





Stipa tirsa Stev. (=*Stipa stenophylla* (Czern. ex Lindem.) Trautv., *S. longifolia* Borb.) **– Negară piramidală – Ковыль узколистный**


Семейство **Poaceae** Barnhart **– Poacee – Злаки**

Статус: вид угрожаемый – **EN**.

Состояние охраны: включен в Красную книгу Республики Молдова как угрожаемый вид (категория **EN**), в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**), в Операционный Список. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”).

Общее распространение*:** Скандинавия, Средняя и Восточная (юг) Европа, Средиземноморье, Кавказ, Малая и Средняя Азия (северо-запад), Западная Сибирь (юг). ***Распространение в Республике Молдова*:** редко в центральной зоне и бассейне реки Днестр. ***На территории сайта встречается редко в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Чиобурчиу-Рэскэець” и ”Пуркарь” на степных склонах, полянах и опушках гырнецов. Растет одиночно или группами с обилием 1-2.






Stipa ucrainica P.Smirn. **– Negară ucraineană – Ковыль украинский**
Семейство **Poaceae** Barnhart **– Poacee – Злаки**

Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**) и включен в Операционный Список. Включен в Красную книгу Румынии как уязвимый вид (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория ”**Неоцінений**”).



Общее распространение*:** Средняя (Румыния) и Восточная (южная часть) Европа, Крым, Предкавказье. ***Распространение в Республике Молдова*:** почти по всей территории. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза” и ”Чиобурчиу-Рэскэець” на степных склонах, полянах и опушках гырнецов. Растет одиночно или группами с обилием 1-2.






Семейство **Potamogetonaceae** Dumort. **– Potamogetonacee – Рдестовые**

1. ***Potamogeton berchtoldii*** Fieb. **– Broscăriţă Berhtold – Рдест Берхтольда**
2. ***Potamogeton compressus*** L. **– Broscăriţă turtită – Рдест сплюснутый**
3. ***Potamogeton gramineus*** L. **– Broscăriţă graminee – Рдест злаковый**
4. ***Potamogeton lucens*** L. **– Broscăriţă lucioasă – Рдест блестящий**
5. ***Potamogeton natans*** L. **– Broscăriţă natantă – Рдест узловатый**

Potamogeton berchtoldii Fieb. (=*Potamogeton pusillus* auct., non L.) **–**
Broscăriţă Berhtold – Рдест Берхтольда
Семейство **Potamogetonaceae** Dumort. **– Potamogetonacee – Рдестовые**

Статус: вид с дефицитом данных – **DD**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется.
Общее распространение*:** Евразия и Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова*:** бассейны рек Днестр и Прут. ***На территории сайта встречается редко в комплексе ”Грэдина Турчаскэ” в Старице Днестра. Образует пятна при обилии 1-2.






Potamogeton compressus L. (=*Potamogeton zosterifolius* Schumacher) **–**
Broscăriţă turtită – Рдест сплюснутый
Семейство **Potamogetonaceae** Dumort. **– Potamogetonacee – Рдестовые**

Статус: вид с дефицитом данных – **DD**.
Состояние охраны: включен в Операционный Список.



Общее распространение**:** Евразия и Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова*****:** юго-восточная зона. ***На территории сайта*** встречается редко в комплексе ”Грэдина Турчаскэ” в Старице Днестра. Образует группы с обилием 1-2.

.






Potamogeton gramineus L. (=*Potamogeton heterophyllus* Schreb.) **–**
Broscăriţă graminee – Рдест злаковый
Семейство **Potamogetonaceae** Dumort. **– Potamogetonacee – Рдестовые**



Статус: вид с дефицитом данных – **DD**.
Состояние охраны: включен в Операционный Список.



Общее распространение*:** Евразия и Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова*:** юго-восточная зона. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра” и ”Дикуль-Куца_Мацаринский” в стоячей и медленно текущей воде. Образует пятна.




Potamogeton lucens L. **– Broscăriţă lucioasă – Рдест блестящий**
Семейство **Potamogetonaceae** Dumort. **– Potamogetonacee – Рдестовые**



Статус: вид находится под наименьшей угрозой – **LC**.
Состояние охраны: включен в Операционный Список.
Общее распространение*:** Europa, Азия, Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова*:** центральная и южная зоны. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни” и ”Тудора-Паланка” в стоячей и медленно текущей виде ирригационных каналов и Старицы Днестра. Образует группы при обилии 1-2(3).







Potamogeton natans L. **– Broscăriţă natantă – Рдест плавающий**
Семейство **Potamogetonaceae** Dumort. **– Potamogetonacee – Рдестовые**

Статус: вид с дефицитом данных – **DD**.
Состояние охраны: включен в Операционный Список.





Общее распространение**:** Евразия и Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова*****:** юго-восточная (р-он Штефан-Водэ) и южная (р-он Кахул) зоны. ***На территории сайта*** в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Образует группы в стоячей и медленно текущей воде.



Семейство **Ranunculaceae** Juss. **– Ranunculacee – Лютиковые**

1. ***Adonis vernalis*** L. **– Ruşcuţă vernală – Адонис весенний**
2. ***Pulsatilla montana*** (Hoppe) Reichenb. **– Dediţel montan – Прострел горный**
3. ***Pulsatilla ucrainica*** (Ugr.) Wissjul. **– Dediţel ucrainean – Прострел украинский**

Adonis vernalis L. **– Ruşcuţă vernală – Адонис весенний**

Семейство **Ranunculaceae** Juss. **– Ranunculacee – Лютиковые**






Статус: вид близкий к уязвимому состоянию – **NT.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **III)** и включен в Операционный Список, в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория ”**Неоцінений**”). Включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Общее распространение*:** лесостепная зона Средней и Восточной Европы, Предкавказье, Западная Сибирь. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично по всей территории. ***На территории сайта встречается спорадично, обнаружен во всех комплексах вне поймы реки Днестр. Растет на остепненных склонах, полянах и опушках сухих и субаридных дубрав, среди кустарников, изредка на пастбищах. Образует мелкие группы при обилии 1-2(3).





Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb. (=*Anemone montana* Hoppe) **– Dediţel montan – Прострел горный**
Семейство **Ranunculaceae** Juss. **– Ranunculacee – Лютиковые**




Статус: вид с дефицитом данных – **DD.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Операционный Список и в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**).

***Общее распространение*:** Средняя (юго-восток) и Восточная (юг) Европа. В регионе растет на восточном пределе ареала. ***Распространение в Республике Молдова*:** редко, пости по всей территории, кроме юга страны.

На территории сайта встречается редко в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець” на степном склоне, среди кустарников. Растет мелкими группами при обилии1-2(3).





Pulsatilla ucrainica (Ugr.) Wissjul. (=*Anemone pulsatilla* L. var. *ucrainica* Ugr., *Pulsatilla nigricans* Störk) **– Dediţel ucrainean – Прострел украинский**

Семейство **Ranunculaceae** Juss. **– Ranunculacee – Лютиковые**




Статус: вид с дефицитом данных – **DD.**

Состояние охраны: в Республике Молдова включен в Операционный Список, в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория ”**Неоцінений**”).

Общее распространение*:** южная часть Восточной Европы. Понтический эндемик. ***Распространение в Республике Молдова*:** центральная и юго-восточная зоны. ***На территории сайта встречается редко, только в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець” на степном склоне, полянах и опушках гырнецов. Растет группами при обилии 1-2(3).





Семейство **Resedaceae** S.F.Gray **– Resedacee – Резедовые**

1. ***Reseda inodora*** Reichenb. **– Rechie nemirositoare – Резеда непахучая**


Reseda inodora Reichenb. **– Rechie nemirositoare – Резеда непахучая**
Семейство **Resedaceae** S.F.Gray **– Resedacee – Резедовые**



Статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова включен в Операционный Список.



Общее распространение: Восточная Европа, Средиземноморье. ***Распространение в Республике Молдова***: спорадично в центральной и южной зонах. ***На территории сайта*** встречается крайне редко в комплексе ”Туфа-Стынка Талмаза” на степном склоне. Растет группами при обилии 1(2).



Семейство **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**

1. ***Amygdalus nana*** L. **– Migdal pitic – Миндаль низкий**
2. ***Potentilla astracanica*** Jacq. **– Scrântitoare astrachanică – Лапчатка астраханская**
3. ***Pyrus elaeagnifolia*** Pall. **– Păr eleagnifoliu – Груша лохолистная**
4. ***Rosa micrantha*** Borrer ex Smith **– Măceş micrant – Роза мелкоцветковая**
5. ***Rosa tschatyrdagi*** Chrshan. **– Măceş-de-Ciatârdag – Роза чатырдагская**
6. ***Sorbus torminalis*** (L.) Crantz **– Sorb – Рябина глоговина**



Amygdalus nana L. (=*Prunus tenella* Batsch) **– Migdal pitic – Миндаль низкий**

Семейство **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**




Статус: вид уязвимый – **VU.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **III)** и включен в Операционный Список.

Общее распространение*:** Балканский п-ов, Средняя и Восточная Европа, Крым, Малая Азия и Западная Сибирь. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично по всей территории. ***На территории сайта обычное растение, встречается во всех комплексах вне долины Днестра, где произрастает на степных склонах, полянах и опушках гырнецов. Образует группы из нескольких экземпляров с обилием 1-2 или заросли с обилием 3-4.





Potentilla astracanica Jacq. **– Scrântitoare astrachanică – Лапчатка астраханская**

Семейство **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**




Статус: вид угрожаемый – **EN**.

Состояние охраны: включен в Красную книгу Республики Молдова как угрожаемый вид (категория **EN**) и в Операционный Список.



Общее распространение: Средняя и Восточная Европа, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова***: южная (р-он Кахул) и юго-восточная (р-он Штефан-Водэ) зоны. ***На территории сайта*** встречается крайне редко, только в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець”. Растет одиночно и мелкими группами при обилии 1-2 на степном склоне и опушке гырнеца.



Pyrus elaeagnifolia Pall. **– Păr eleagnifoliu – Груша лохолистная**

Семейство **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**

Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.


Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II-IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова как критически угрожаемый вид (категория **CR**) и в Операционный Список. Включен в Красный Список Европы как вид с дефицитом данных (категория **DD**).

Общее распространение*:** Средняя (Румыния) и Восточная (Республика Молдова, Крым) Европа, Средиземноморье (восток), Малая Азия, Иран. ***Распространение в Республике Молдова*:** бассейн Нижнего Днестра (р-ны Анений Ной, Кэушень). В регионе растет на северном пределе ареала. ***На территории сайта встречается крайне редко, только в комплексе ”Копанка-Леунтя” по краю гырнеца.










Rosa micrantha Borrer ex Smith **– Măceş micrant – Роза мелкоцветковая**
Семейство **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**

Статус: вид угрожаемый – **EN**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется.
Общее распространение**:** Средняя и Восточная Европа, Средиземноморье. ***Распространение в Республике Молдова*****:** редко в бассейне Днестра и в южной зоне. В регионе растет на юго-восточной пределе ареала. ***На территории сайта*** встречается крайне редко в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець” на степном склоне**.** Растет одиночно или образует мелкие группы с обилием 1.










Rosa tschatyrdagi Chrshan. (=*Rosa pimpinellifolia* auct. non L.) **– Măceş-de-Ciatârdag – Роза чатырдагская**
Семейство **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**

Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется.
Общее распространение*:** Юго-Восточная Европа, Кавказ, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** очень редко в округе субаридных лесов из дуба пушистого. ***На территории сайта встречается крайне редко в лесном урочище ”Стынка” (комплекс ”Чиобурчиу-Рэскэець”) на открытых склонах, полянах субаридных лесов из дуба пушистого. Растет одиночно или образует мелкие группы из 5-10 экземпляров с обилием 1-2.



Sorbus torminalis (L.) Crantz (=*Crataegus torminalis* L.) **– Sorb – Рябина глоговина**
Семейство **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**


Статус: вид уязвимый – **VU**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**), в Красную книгу Украины (категория ”**Неоцінений**”).





Общее распространение: Атлантическая, Средняя и Восточная (юг) Европа, Крым, Средиземноморье, Малая Азия, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова***: спорадично по всей территории страны, кроме южной зоны. ***На территории сайта*** встречается крайне редко в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець”. Растет одиночно в лесу.




Семейство **Rutaceae** Juss. **– Rutacee – Рутовые**

1. ***Haplophyllum suaveolens*** (DC.) G. Don fil. **– Gălbinele – Цельнолистник душистый**

Haplophyllum suaveolens (DC.) G. Don fil. (=*Ruta suaveolens* DC.) **– Gălbinele – Цельнолистник душистый**
Семейство **Rutaceae** Juss. **– Rutacee – Рутовые**

Статус: вид уязвимый – **VU.**
Состояние охраны: включен в Операционный Список.
Общее распространение*:** Балканский п-ов, Восточная Европа, Закавказье, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично в центральной и южной зонах. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя” и ”Чиобурчиу-Рэскэець” на полянах и опушках лесов из дуба пушистого, степных склонах. Образует группы при обилии 1-2.







Семейство **Salviniaceae** Dumort. **– Salviniacee – Сальвиниевые**

1. ***Salvinia natans*** (L.) All. **– Peştişoară natantă – Сальвиния плавающая**

Salvinia natans (L.) All. (=*Marsilea natans* L.) **– Peştişoară natantă – Сальвиния плавающая**

Семейство **Salviniaceae** Dumort. **– Salviniacee – Сальвиниевые**


Статус: вид критически угрожаемый – **CR.**



Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Республики Молдова как угрожаемый вид (категория **EN**), в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**) в Красную книгу Украины (категория ”**Неоцінений**”). Охраняется Бернской Конвенцией.

Общее распространение*:** голакрктический плюризональный вид, встречающийся преимущественно в степной, пустынной и субтропической зонах Северного полушария. ***Распространение в Республике Молдова*:** южные районы. Третичный реликт. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Иацапинский”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра” в стоячей или медленно текущей воде озера Адана, Старице Днестра, ирригационных каналах. Образует группы с обилием 1-2 или 5.





Семейство **Scrophulariaceae** Juss. **– Scrofulariacee – Норичниковые**


1. ***Gratiola officinalis*** L. **– Veninariţă medicinală – Авран лекарственный**
2. ***Veronica euxina*** Turrill **– Veronică euxină – Вероника Гриня**

Gratiola officinalis L. **– Veninariţă medicinală – Авран лекарственный**
Семейство **Scrophulariaceae** Juss. **– Scrofulariacee – Норичниковые**

Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не охраняется.



Общее распространение: Европа, Иран, Джунгария, Кавказ, Средняя Азия, Западная Сибирь, Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова***: редко в центральной и южной зонах. ***На территории сайта*** встречается в комплексе ”Грэдина Турчаскэ” в пойме Днестра на влажном лугу. Растет одиночно или мелкими группами с обилием 1.




Veronica euxina Turrill (=*Pseudolysimachion euxinum* (Turrill) Holub, *Veronica gryniana* Klokov) **– Veronică euxină – Вероника Гриня**

Семейство **Scrophulariaceae** Juss. **– Scrofulariacee – Норичниковые**

Статус: вид близки к уязвимому состоянию – **NT.**

Состояние охраны: Включен в Красный Список Европы как вид с дефицитом данных (категория **DD**). Охраняется Бернской Конвенцией.

Общее распространение*:** Восточная Европа (Молдова, Украина), Средиземноморье (Болгария). Понтический эндемик. В регионе встречается на южном пределе ареала. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично повсеместно. ***На территории сайта встречается редко в комплексах ”Копанка-Леунтя” и ”Чиобурчиу-Рэскэець” на степных склонах, полянах и опушках аридных лесов. Растет одиночно или мелкими группами при обилии 1.





Семейство **Tamaricaceae** Link **– Tamaricacee – Гребенщиковые**


1. ***Tamarix ramosissima*** Ledeb. **– Tamariscă rămuroasă – Гребенщик многоветвистый**

Tamarix ramosissima Ledeb. – Tamariscă rămuroasă – Гребенщик многоветвистый
Семейство **Tamaricaceae** Link – **Tamaricacee – Гребенщиковые**

Статус: вид близкий к уязвимому состоянию – **NT.**
Состояние охраны: включен в Операционный Список.
Общее распространение*:** Восточная Европа (южная зона), Малая и Средняя Азия, Кавказ, Иран, Джунгария, Западная Сибирь (южная часть). ***Распространение в Республике Молдова*:** центральная зона, бассейны Нижнего Днестра и Нижнего Прута. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Саги-Казачешть” и ”Дикуль-Куца-Мацаринский” на слабо засоленных участках. Образует мелкие группы с обилием 1.







Семейство **Trapaceae** Dumort. **– Trapacee – Рогульниковые**

1. ***Trapa natans*** L. **– Cornaci natant – Рогульник плавающий, Чилим, Водяной орех**

Trapa natans L. **– Cornaci natant – Рогульник плавающий, Чилим, Водяной орех**

Семейство **Trapaceae** Dumort. **– Trapacee – Рогульниковые**






Статус: вид уязвимый – **VU.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова как критически угрожаемый вид (категория **CR**), в Операционный Список, в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория ”**Неоцінений**”). Включен в Красный Список Европы как вид близкий к уязвимому состоянию (категория **NT)**. Охраняется Бернской Конвенцией.

Общее распространение*:** широкое, но разорванное. Встречается в Средиземноморье, Европе, Кавказе, Центральной Азии, Казахстане, Индокитае, Северной Африке; занесен в Северную Америку и Австралию. Третичный реликт. ***Распространение в Республике Молдова*:** бассейны Нижнего Днестра и Нижнего Прута. ***На территории сайта встречается спорадично в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз” и ”Тудора-Паланка” в стоячей и слабо проточной воде ирригационных каналов, старые русла Днестра. Образует пятна и скопления с обилием 1 или 2-3.





Семейство **Typhaceae** Juss. **– Tifacee – Рогозовые**

1. ***Typha laxmannii*** Lepech. **– Papură Laxman – Рогоз Лаксмана**


Typha laxmannii Lepech. **– Papură Laxman – Рогоз Лаксмана**
Семейство **Typhaceae** Juss. **– Tifacee – Рогозовые**



Статус: вид находится под наименьшей угрозой – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**) и включен в Операционный Список.
***Общее распространение*:** Европа, Средиземноморье, Малая и Средняя Азия, Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Япония и Китай.



Распространение в Республике Молдова*:** спорадично в центральной и юго-восточной зонах. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть” и ”Дикуль-Куца-Мацаринский” в старицах, озере Адана, ирригационных каналах, на заболоченных лугах.



Семейство **Valerianaceae** Batsch **– Valerianacee – Валериановые**


1. ***Valerianella coronata*** (L.) DC. **– Fetică coronată – Валерианелла увенчанная**

Valerianella coronata (L.) DC. (=*Valeriana locusta* L. γ. *coronata* L.) **–**
Fetică coronată – Валерианелла увенчанная
Семейство **Valerianaceae** Batsch **– Valerianacee – Валериановые**



Статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: включен в Операционный Список.
Общее распространение*:** Атлантическая, Средняя и Восточная (юг) Европа, Крым, Средиземноморье, Малая Азия, Иран; интродуцирован в Северную Америку. ***Распространение в Республике Молдова*:** редко в центральной и южной зонах. ***На территории сайта встречается крайне редко в комплексе ”Туфа-Стынка Талмаза” на степном склоне. Образует группы или скопления с обилием 1-2.





Семейство **Viburnaceae** Juss. **– Viburnacee – Калиновые**


1. ***Viburnum opulus*** L. **– Călin comun – Калина обыкновенная**

Viburnum opulus L. – Călin comun – Калина обыкновенная
Семейство **Viburnaceae** Juss. – **Viburnacee – Калиновые**

Статус: вид близкий к уязвимому состоянию – **NT.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**).
Общее распространение*:** Европа, Кавказ, Малая и Средняя Азия, Сибирь, Африка (северная часть). ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично в лесных районах. ***На территории сайта встречается редко в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Тудора-Паланка” в пойменных лесах, полянах и опушках. Растет одиночно или группами по 2-3 особи с обилием 1.







Семейство **Vitaceae** Juss. **– Vitacee – Виноградовые**


1. ***Vitis sylvestris*** C.C.Gmel. **– Viţă sălbatică – Виноград лесной**

Vitis sylvestris C.C.Gmel. **– Viţă sălbatică – Виноград лесной**
Семейство **Vitaceae** Juss. **– Vitacee – Виноградовые**



Статус: вид угрожаемый – **EN**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II-III**), включен в Операционный Список и в Красную книгу Республики Молдова как угрожаемый вид (категория **EN**).
Общее распространение*:** Атлантическая, Средняя и Восточная (юг) Европа, Средиземноморье, Кавказ, Малая и Средняя (Туркменистан) Азия, Иран. ***Распространение в Республике Молдова*:** поймы рек Днестр и Прут. Третичный реликт. В регионе находится на сневерном пределе ареала. ***На территории сайта встречается спорадично в комплексах ”Талмазские плавни” и ”Долина Олэнешть-Крокмаз” в пойменных лесах. Образует группы из нескольких экземпляров с обилием 1-2(3).





Царство **Animalia** Linnaeus, 1758 **– Animale – Животные**

Класс **Clitellata** Michaelsen, 1919 **– Lipitori – Водные беспозвоночные (зообентос)**

На территории сайта выявлены **119** видов зообентоса. Самыми представительными являются моллюски (**36** вида), личинки и имаго водных жуков (**34**), личинки стрекоз (**17**), водные клопы (**8**), поденки (**8**) и ручейники (**4**), пиявки (**7**). Из них только 1 вид *Hirudo medicinalis* (L.) занесен в Красный список МСОП [21].

Для вида приводятся следующие характеристики:

- латинское, румынское и русское названия вида;
- принадлежность к семейству на латинском, румынском и русском языках;
- статус (категория редкости);
- охранный статус (включенность Операционный список, в Красную книгу Приднестровья [112], в Красную книгу Украины [186], Списки МСОП [40]);
- общий ареал [33, 118, 120, 130, 177];
- распространение в Республике Молдова [198];
- распространение на территории сайта – приуроченность к природным комплексам;
- приуроченность к местообитаниям;
- фото – использованы материалы сайта www.wikipedia.org


Семейство **Hirudinidae** Whitman **– Hirudinidee – Пиявки**

1. ***Hirudo medicinalis*** (Linnaeus, 1758) **– Lipitoarea medicinală – Пиявка медицинская**

Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758) **– Lipitoarea medicinală – Пиявка медицинская**
Семейство **Hirudunidae** Whitman **– Hirudinidae – Пиявки**



Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: в Республике Молдова включен в Операционный Список и в Красную книгу Приднестровья как уязвимый вид (категория **VU**). Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”) Охраняется на международном уровне – включен в Красный список МСОП.
Общее распространение*:** Европа (кроме севера Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** встречается крайне редко во всех зонах страны. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Талмазские плавни” в озере Адана и ”Тудора-Паланка” в ирригационных каналах,.



Класс **Insecta** (Linnaeus, 1758) **– Insecte – Насекомые**

Информация о редких видах насекомых Рамсарского сайта «Нижний Днестр», охраняемых на национальном и международных уровнях, представляет собой аннотированный список таксонов, встречающихся на данной территории. Также в список видов насекомых включены не охраняемые, но довольно редкие в Республике Молдова и на территории сайта виды: *Aglais urticae* L., *Argynnis aglaja* L., *Catocala sponsa* L., *Bombus schrencki* F.Mor., *Jalla dumosa* L., *Melitaea diamina* Lang., *Neozephyrus quercus* L., *Polyommatus amandus* Schn.

Для каждого вида приводятся следующие характеристики:

- латинское, румынское и русское названия;
- принадлежность к семейству на латинском, румынском и русском языках;
- статус (категория редкости);
- охранный статус (включенность в Экологическое законодательство Республики Молдова (категории редкости охраняемых видов: II – вид, находящийся под угрозой исчезновения, III – вид, численность которого сокращается катастрофически быстро, что может поставить его под угрозу исчезновения, IV – редкий вид) [199], Операционный список [46], Красная книга Республики Молдова [9], Красная книга Приднестровья [112], Красная книга Украины [186], Списки МСОП [21], Европейский Красный список [34], Бернскую Конвенцию [11], Приложения Директивы по местообитаниям [14]);
- общий ареал [9, 28];
- распространение в Республике Молдова [50, 51];
- распространение на территории сайта – приуроченность к природным комплексам;
- приуроченность к местообитаниям;
- фото Держанского В.В. Использованы материалы сайта www.wikipedia.org

Редкие виды насекомых

Фауна насекомых на территории Рамсарского сайта «Нижний Днестр» богата и представлена очень большим числом видов, относящихся к различным отрядам: Dictyoptera, Orthoptera, Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera и др. Среди них встречается большое количество редких насекомых (**50 видов**) [1, 2, 48-52, 65, 108-111, 121, 122, 133, 194, 195], охраняемых на международном и национальном уровнях. Отмеченные виды насекомых различаются по степени редкости, представлены разными по численности популяциями, некоторые из них были зарегистрированы в одном или двух комплексах. Некоторые виды нуждаются в специальных мерах по сохранению, особенно виды высоких категорий редкости. Для них можно предложить организовать микрозаповедники для сохранения и мониторинга состояния их локальных популяций.

Под государственной охраной в Республике Молдова находятся 15 видов насекомых [199]: 3 вида находятся под угрозой исчезновения (**категория II**) – *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758), *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758), *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775); 11 видов, численность которых сокращается катастрофически быстро, что может поставить их под угрозу исчезновения (**категория III**) – *Carabus clathratus* Linnaeus, 1761, *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758), *Elater ferrugineus* (Linnaeus, 1758), *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), *Morimus asper funereus* (Mulsant, 1862), *Oryctes nasicornis* (Linnaeus, 1758), *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761), *Iphiclides podalirius* Linnaeus, 1758, *Saturnia pyri* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Megascolia maculata* (Drury, 1773), *Xylocopa valga* Gerstäcker, 1872; 1 редкий вид (**категория IV**) – *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758).

Наиболее редкие виды, с более высокой категорией редкости включены в Красную книгу Республики Молдова [9]: 9 критически угрожаемых видов (**категория CR**) – *Onconotus servillei* (Fischer von Waldheim, 1846), *Erythromma lindenii* (Sélys, 1840), *Leucorrhinia pectoralis* Charpentier, 1825, *Carabus variolosus* (Fabricius, 1787), *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758), *Hamearis lucina* Linnaeus, 1758, *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758), *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772); 5 угрожаемых видов (**категория EN**) – *Carabus clathratus* Linnaeus, 1761, *Elater ferrugineus* (Linnaeus, 1758), *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), *Morimus asper funereus* (Mulsant, 1862), *Xylocopa violacea* (Linnaeus, 1758); 21 уязвимых видов (**категория VU**) – *Ameles decolor* (Charpentier, 1825), *Anax imperator* (Leach, 1815), *Carabus ullrichii* Germar, 1824, *Oryctes nasicornis* (Linnaeus, 1758), *Protaetia aeruginosa* (Linnaeus, 1767), *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758), *Apatura iris* (Linnaeus, 1758), *A. metis* (Freyer, 1829), *Colias chrysotheme* (Esper, 1781), *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761), *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758), *Neptis sappho* (Pallas, 1771), *Plebejus argyrognomon* (Bergsträsser, 1779), *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758), *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758), *Saturnia pyri* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763), *B. ruderatus* (Fabricius, 1775), *Megascolia maculata* (Drury, 1773), *Scolia hirta* (Schrank, 1781).

Из Красной книги Приднестровья отмечены 23 вида насекомых [112], встречающихся и в биоценозах сайта «Нижний Днестр»: 1 критически угрожаемый вид (**категория CR**) – *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758); 2 угрожаемых (категория EN) – *Morimus funereus* (Mulsant, 1862) и *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758); 15 уязвимых (**категория VU**) – *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), *Protaetia aeruginosa* (Linnaeus, 1767), *Oryctes nasicornis* (Linnaeus, 1758), *Morimus funereus* (Mulsant, 1862), *Megascolia maculata* (Drury, 1773), *S. hirta* (Schrank, 1781), *Xylocopa valga* Gerstäcker, 1872, *X. violaceae* (Linnaeus, 1758), *Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763), *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758), *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Neozephyrus quercus* (Linnaeus, 1758), *Saturnia pyri* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761), *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758), *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767) и 5 видов (*Erythromma lindenii* (Sélys, 1840), *Carabus clathratus* Linnaeus, 1761, *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758), *Apatura iris* (Linnaeus, 1758), *Hamearis lucina* Linnaeus, 1758) с дефицитом данных (**категория DD**).

Из Операционного списка, составленного при разработке Национальной Экологической Сети Республики Молдова, на территории Рамсарского сайта «Нижний Днестр» были отмечены 24 вида насекомых [46] – *Ameles decolor* (Charpentier, 1825), *Anax imperator* (Leach, 1815), *Erythromma lindenii* (Sélys, 1840), *Carabus ullrichii* (Germar, 1824), *C. variolosus* (Fabricius, 1787), *Protaetia aeruginosa* (Linnaeus, 1767), *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758), *Apatura iris* (Linnaeus, 1758), *A. metis* (Freyer, 1829), *Argynnis aglaja* Linnaeus, 1758, *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767), *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758), *Colias chrysotheme* (Esper, 1781), *Hamearis lucina* Linnaeus, 1758, *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758), *Neptis sappho* (Pallas, 1771), *Neozephyrus quercus* (Linnaeus, 1758), *Plebejus argyrognomon* (Bergsträsser, 1779), *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772), *Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763), *B. ruderatus* (Fabricius, 1775), *Formica rufa* Linnaeus, 1761, *Scolia hirta* (Schrank, 1781), *Xylocopa violacea* (Linnaeus, 1758).

На территории сайта встречаются виды насекомых, являющиеся редкими и в сопредельных регионах. Так, из них в Красную книгу Украины включены 23 вида [186], встречающихся на территории сайта, из них 12 видов категории "**Вразливий**" – *Anax imperator* (Leach, 1815), *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758), *Morimus asper funereus* (Mulsant, 1862), *Apatura iris* (Linnaeus, 1758), *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758), *Hamearis lucina* Linnaeus, 1758, *Iphiclides podalirius* Linnaeus, 1758, *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758), *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758), *Saturnia pyri* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763), 8 видов категории "**Рідкісний**" – *Erythromma lindenii* (Sélys, 1840), *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758), *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772), *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767), *Bombus ruderatus* (Fabricius, 1775), *Xylocopa valga* Gerstäcker, 1872, *X. violacea* (Linnaeus, 1758) и 1 вид (*Megascolia maculata* (Drury, 1773) категории "**Неоцінений**".

Из отмеченных на территории сайта видов насекомых в мировом Списке МСОП (IUCN) [21] были зарегистрированы 3 уязвимых вида (**VU**) – *Onconotus servillei* (Fischer von Waldheim, 1846), *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758), *Morimus asper funereus* (Mulsant, 1862), а также 2 вида близкие к уязвимому положению (категория **NT**) – *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758) и *Formica rufa* Linnaeus, 1761.

В Красный Список Европы включены 6 видов [34]: из них 1 угрожаемый (категория **EN**) – *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758), 1 уязвимый вид (**VU**) – *Colias chrysotheme* (Esper, 1781) и 4 вида низкого риска (**категория LR**) – *Apatura metis* (Freyer, 1829), *Neptis sappho* (Pallas, 1771), *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758), *Plebejus argyrognomon* (Bergsträsser, 1779).

Из списка Конвенции по Сохранению Европейской дикой природы и естественных местообитаний (Бернская Конвенция, 1979) [11] из строго охраняемых видов отмечены: *Leucorrhinia pectoralis* Charpentier, 1825, *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758), *Apatura metis* (Freyer, 1829), *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758), *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758), *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772), *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775).

В Приложения II и IV Директивы по местообитаниям (Директива Совета 92/43/EEC от 21 мая 1992 по сохранению природных местообитаний и дикой фауны и флоры) включены 8 видов [14] – *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) – Приложение **II**, *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758) – Приложения **II, IV**, *Morimus asper funereus* (Mulsant, 1862) – Приложение **II**, *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) – Приложение **II**, *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758) – Приложение **IV**, *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775) – Приложение **IV**, *Apatura metis* (Freyer, 1829) – Приложение **IV**, *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758) – Приложение **IV**.

Семейство **Apidae** Latreille, 1802 **– Apide – Пчёлы настоящие**


1. ***Bombus argillaceus*** (Scopoli, 1763) **– Bondar de-argilă – Шмель глинистый**
2. ***Bombus ruderatus*** (Fabricius, 1775) **– Bondar roșiatic – Шмель красноватый**
3. ***Xylocopa valga*** Gerstäcker, 1872 **– Albină violetă – Пчела-плотник**
4. ***Xylocopa violacea*** (Linnaeus, 1758) **– Albină violetă – Пчела-плотник фиолетовая**



Bombus argillaceus (Scopoli, 1763) **– Bondar de-argilă – Шмель глинистый**
Семейство **Apidae** Latreille, 1802 **– Apide – Пчёлы настоящие**

***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU** .
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова, как уязвимый (категория **VU**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**) и в Операционный список. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”).
Общий ареал*:** Европа (за исключением севера), Малая Азия, север Ирака и Ирана, юг Сибири, восток Северной Америки. ***Распространение в Республике Молдова*:** Центральная и Северная зоны страны. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь” и ”Рэскэець-Олэнешть”.










Bombus ruderatus (Fabricius, 1775) **– Bondar roșiatic – Шмель красноватый**
Семейство **Apidae** Latreille, 1802 **– Apide – Пчёлы настоящие**

***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU** .
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова как уязвимый вид (категория **VU**) и в Операционный список. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний**”).
Общий ареал*:** Европа, Кавказ, Малая Азия, Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова*:** южная зона. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Талмазские плавни” и ”Рэскэець-Олэнешть”.




Xylocopa valga Gerstäcker, 1872 **– Albină valgă – Пчела-плотник**
Семейство **Apidae** Latreille, 1802 **– Apide – Пчёлы настоящие**



***Охранный статус*:** угрожаемый вид – **EN**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III)**.
Общий ареал*:** в областях с умеренным климатом Евразии. ***Распространение в Республике Молдова*:** распространен в центральной зоне страны. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса” и ”Валя Туркулуй” .






Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) **– Albină violetă – Пчела-плотник фиолетовый**
Семейство **Apidae** Latreille, 1802 **– Apide – Пчёлы настоящие**

***Охранный статус*:** угрожаемый вид – **EN**.
***Состояние охраны*:** включен в Красную Книгу Республики Молдова, как угрожаемый вид (категория **EN**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**) и в Операционный список. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний**”).
Общий ареал*:** Центральная и Южная Европа, Кавказ, Малая Азия, Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова*:** на всей территории страны. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Заозерное-Нукарь”, ”Рэскэець-Олэнешть” и ”Долина Олэнешть-Крокмаз”.









Семейство **Carabidae** Latreille, 1802 **– Carabide – Жужелицы**

1. ***Carabus clathratus*** Linnaeus, 1761 **– Carabidă clatratus – Жужелица золотоямчатая**
2. ***Carabus ullrichii*** (Germar, 1824) **– Carabida-lui-Ulrih – Жужелица Ульриха**
3. ***Carabus variolosus*** (Fabricius, 1787) **– Carabidă vario – Жужелица изменчивая**


Carabus clathratus Linnaeus, 1761 **– Carabidă clatratus – Жужелица золотоямчатая**
Семейство **Carabidae** Latreille, 1802 **– Carabide – Жужелицы**

***Охранный статус*:** угрожаемый вид – **EN**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III),** включен в Красную книгу Республики Молдова, как угрожаемый вид (категория **EN)** и Красную книгу Приднестровья (категория **DD**).

Общий ареал*:** Европа и Азия (до Северной Кореи). ***Распространение в Республике Молдова*:** на всей территории страны. ***На территории сайта встречается во многих комплексах в долине Днестра.








Carabus ullrichii (Germar, 1824) **– Carabida-lui-Ulrih – Жужелица Ульриха**
Семейство **Carabidae** Latreille, 1802 **– Carabide – Жужелицы**



***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Красную книгу, как уязвимый вид (категория **VU**) и в Операционный список.
Общий ареал*:** европейский вид, отмечен в Австрии, Германии, Польше, Словакии, Словении, Венгрии, Чехии, Швейцарии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Хорватии, Черногории, Македонии, Болгарии, Румынии, Украине. ***Распространение в Республике Молдова*:** в северной и центральной части страны. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Талмазские плавни”.






Carabus variolosus (Fabricius, 1787) **– Carabidă vario – Жужелица изменчивая**
Семейство **Carabidae** Latreille, 1802 **– Carabide – Жужелицы**

***Охранный статус*:** критически угрожаемый вид – **CR.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством, включен в Красную книгу Республики Молдова как критически угрожаемый вид (категория **CR**) и в Операционный список.
***Общий ареал*:** европейский вид, отмечен в Словении, Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Болгарии, Чехии, Румынии, Польше, Словакии, Украине.
***Распространение в Республике Молдова*:** центральная зона страны.
На территории сайта встречается в комплексе ”Валя Штюбей”.







Семейство **Cerambycidae** Latreille, 1802 **– Cerambicide – Усачи**

1. ***Cerambyx cerdo*** (Linnaeus, 1758) **– Croitor-mare-al-stejarului – Большой дубовый усач**
2. ***Morimus asper funereus*** (Mulsant, 1862) **– Croitor cenușiu – Моримус темный**


Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) **– Croitor-mare-al-stejarului –**
Большой дубовый усач
Семейство **Cerambycidae** Latreille, 1802 **– Cerambicide – Усачи**



***Охранный статус*:** критически угрожаемый вид – **CR .**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III)**, включен в Красную книгу, как критически угрожаемый вид (категория **CR)** и Красную книгу Приднестровья (категория **DD**). Включен в Красный Список МСОП (категория **VU**), Приложение II Бернской Конвенции, Приложения II и IV Директивы по местообитаниям.

Общий ареал*:** Западная, Центральная и Восточная Европа (до Латвии и Украины). ***Распространение в Республике Молдова*:** лесные биотопы северной и центральной зон страны. ***На территории сайта встречается в дубняке, в комплексе ”Туфа-Стынка Талмаза”.






Morimus asper funereus (Mulsant, 1862) **– Croitor cenușiu – Моримус темный**
Семейство **Cerambycidae** Latreille, 1802 **– Cerambicide – Усачи**



***Охранный статус*:** угрожаемый вид – **EN**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III),** включен в Красную книгу, как угрожаемый вид (категория **EN**). Включен в Красный Список МСОП (категория **VU**), Приложение II Директивы по местообитаниям и в Красную Книгу Украины (категория ”**Вразливий**”).
Общий ареал*:** Юго-Восточная Европа (Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Венгрия и Словакия). ***Распространение в Республике Молдова*:** на всей территории страны. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Туфа-Стынка Талмаза”.





Семейство **Cetoniidae** Leach, 1815 **– Cetoniide – Бронзовки**


1. ***Protaetia aeruginosa*** (Linnaeus, 1767) **– Cetonischemă aeruginosa – Бронзовка гладкая**

Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767) **– Cetonischemă aeruginosa – Бронзовка гладкая**
Семейство **Cetoniidae** Leach, 1815 **– Cetoniide – Бронзовки**



***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Красную книгу (категория **VU**), Операционный список и Красную Книгу Приднестровья (категория **VU**).





Общий ареал*:** средиземноморская часть Центральной и Южной Европы. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадически, на всей территории страны. ***На территории сайта встречается в единственном комплексе – ”Валя Туркулуй”.

Семейство **Coenagrionidae** Kirby, 1890 **– Coenagrionide – Стрелки**


1. ***Erythromma lindenii*** (Sélys, 1840) **– Libelula-lui-Linden – Стрелка Линдена**

Erythromma lindenii (Sélys, 1840) **– Libelula-lui-Linden – Стрелка Линдена**
Семейство **Coenagrionidae** Kirby, 1890 **– Coenagrionide – Стрелки**



***Охранный статус*:** критически угрожаемый вид – **CR.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Красную книгу, как критически угрожаемый вид (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **DD**) и в Операционный список. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний**”),
Общий ареал*:** средиземноморское побережье Западной Европы, Закавказье, северо-запад Африки. ***Распространение в Республике Молдова*:** юго-запад и юго-восток южной зоны. ***На территории сайта встречается в единственном комплексе – ”Долина Олэнешть-Крокмаз”.





Семейство **Elateridae** Leach, 1815 **– Elateride – Щелкуны**


1. ***Elater ferrugineus*** (Linnaeus, 1758) **– Pocnitor roșcat – Щелкун краснокрылый**

Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758) **– Pocnitor roșcat – Щелкун краснокрылый**
Семейство **Elateridae** Leach, 1815 **– Elateride – Щелкуны**



***Охранный статус*:** угрожаемый вид – **EN**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III),** включен в Красную книгу Республики Молдова как угрожаемый вид (категория **EN).**
Общий ареал*:** Центральная и Южная Европа, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова*:** в зоне Кодр и в долине Днестра ***На территории сайта встречается в комплексе ”Грэдина Турчаскэ”.





Семейство **Erebidae** Leach, 1815 **– Erebide – Эребиды**


1. ***Callimorpha dominula*** (Linnaeus, 1758) **– Calimorfă dominula – Медведица-госпожа**
2. ***Catocala sponsa*** (Linnaeus, 1767) **– Catocala zmeurului – Ленточница малиновая**
3. ***Euplagia quadripunctaria*** (Poda, 1761) **– Arctiidă-Hera – Медведица Гера**

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) **– Calimorfă dominula – Медведица-госпожа**
Семейство **Erebidae** Leach, 1815 **– Erebide – Эребиды**



***Охранный статус*:** критически угрожаемый вид – **CR**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Красную книгу, как критически угрожаемый вид (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**) и в Операционный список. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”).
Общий ареал*:** Центральная и Восточная Европа, Кавказ, Северный Иран, Южный Туркменистан. ***Распространение в Республике Молдова*:** Центральная и Северная зоны. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Талмазские плавни” и ”Валя Штюбей”.






Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) **– Catocala zmeurului – Ленточница малиновая**
Семейство **Erebidae** Leach, 1815 **– Erebide – Эребиды**







***Охранный статус*:** вид без статуса.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Красную книгу Приднестровья, как уязвимый вид (категория **VU**) и в Операционный список. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний**”).



Общий ареал*:** Европа (за исключением севера), Северная Африка, Малая Азия, Закавказье, Северный Иран, Западный Казахстан. ***Распространение в Республике Молдова*:** в поймах Днестра и Прута. ***На территории сайта встречается в комплексах ” Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни” и ”Ымпэрэтяса”.

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) **– Arctiidă-Hera – Медведица Гера**
Семейство **Erebidae** Leach, 1815 **– Erebide – Эребиды**




***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III)**, включен в Красную книгу, как критически угрожаемый вид (категория **VU**) и Красную книгу Приднестровья (категория **VU**). Включен в Приложение II Директивы по местообитаниям.



Общий ареал*:** Центральная и Юго-Восточная Европа, Кавказ, Северный Иран, Туркменистан. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадически, на всей территории страны. ***На территории сайта встречается во многих комплексах, на полянах и опушках лесов.





Семейство **Formicidae** Latreille, 1802 **– Formicide – Муравьи**


1. ***Formica rufa*** Linnaeus, 1761 **– Furnica roșie – Рыжий лесной муравей**

Formica rufa Linnaeus, 1761 **– Furnica roșie – Рыжий лесной муравей**
Семейство **Formicidae** Latreille, 1802 **– Formicide – Муравьи**



***Охранный статус*:** вид без статуса.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством, включен в Операционный список. Включен в Красный Список МСОП (категория **NT**).
Общий ареал*:** ареал вида сопряжен с лесами умеренного пояса Северной Евразии. ***Распространение в Республике Молдова*:** Центральная и Северная зоны. ***На территории сайта встречается редко в комплексах ”Копанка-Леунтя” и ”Валя Туркулуй”.





Семейство **Libellulidae** Rambur, 1842 **– Libelulide – Настоящие стрекозы**


1. ***Anax imperator*** (Leach, 1815) **– Libelulă imperială – Дозорщик-император**
2. ***Leurorrhinia pectoralis*** Charpentier, 1825 **– Libelulă de-baltă – Стрекоза болотная**

Anax imperator (Leach, 1815) **– Libelulă imperială – Дозорщик-император**
Семейство **Libellulidae** Rambur, 1842 **– Libelulide –**
Настоящие стрекозы





***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU** .
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Красную книгу, как уязвимый (категория **VU**) и в Операционный список. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”),
Общий ареал*:** Европа, Центральная и Западная Азия, Северная и Центральная Африка. ***Распространение в Республике Молдова*:** на всей территории страны. ***На территории сайта встречается в комплексах ” Грэдина Турчаскэ”, ”Ымпэрэтяса” и ”Тудора-Паланка”, возле водоемов со стоячей водой.




Leucorrhinia pectoralis Charpentier, 1825 **– Libelulă de-baltă – Стрекоза болотная**
Семейство **Libellulidae** Rambur, 1842 **– Libelulide – Настоящие стрекозы**

***Охранный статус*:** критически угрожаемый вид – **CR .**
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**) и в Приложение II Бернской Конвенции.

Общий ареал*:** в Европе и Сибири, но не обнаружен на территории европейского Северо-Востока. ***Распространение в Республике Молдова*:** юго-восточная часть страны. ***На территории сайта встречается спорадически в двух комплексах: ” Грэдина Турчаскэ” и ”Долина Олэнешть-Крокмаз”.





Семейство **Lycaenidae** Leach, 1815 **– Licenide – Голубянки**


1. ***Lycaena virgaureae*** (Linnaeus, 1758) **– Albăstrița măcrișului – Червонец огненный**
2. ***Maculinea arion*** (Linnaeus, 1758) **– Albăstrița cimbrișorului – Голубянка арион**
3. ***Neozephyrus quercus*** (Linnaeus, 1758) **– Codița albastră de-stejar – Зефир дубовый**
4. ***Plebejus argyrognomon*** (Bergsträsser, 1779) **– Albăstrița argintie – Голубянка аргирогномон**

Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) **– Albăstrița măcrișului – Червонец огненный**
Семейство **Lycaenidae** Leach, 1815 **– Licenide – Голубянки**



***Охранный статус*:** критически угрожаемый вид – **CR**.
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова, как критически угрожаемый вид (категория **CR**) и в Красный Список редких бабочек Европы (категория **LR**).
Общий ареал*:** Европа, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадически в центральной и северной зонах. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Коанка-Леунтя”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз” и ”Валя Туркулуй”.





Maculinea arion (Linnaeus, 1758) **– Albăstrița cimbrișorului – Голубянка арион**

Семейство **Lycaenidae** Leach, 1815 **– Licaenide – Голубянки**




***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**

***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Красную книгу, как уязвимый вид (категория **VU**), Операционный список и в Красную книгу Приднестровья (категория **DD**). Включен в Красный Список МСОП (категория **NT**), включен в Красный Список редких бабочек Европы (категория **EN**), Приложение II Бернской Конвенции, Приложение IV Директивы по местообитаниям.

Общий ареал*:** Европа. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадически, на всей территории страны. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Заозерное-Нукарь ”.






Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) **– Codița albastră de-stejar – Зефир дубовый**
Семейство **Lycaenidae** Leach, 1815 **– Licaenide – Голубянки**





***Охранный статус*:** вид без статуса.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Операционный список и Красную книгу Приднестровья, как уязвимый вид (категория **VU**).






Общий ареал*:** Европа (за исключением севера), Северная Африка, Малая Азия, Закавказье, Северный Иран, Западный Кахзахстан. ***Распространение в Республике Молдова*:** на всей территории страны. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Валя Туркулуй”.

Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) **– Albăstrița argintie – Голубянка аргирогномон**
Семейство **Lycaenidae** Leach, 1815 **– Licaenide – Голубянки**



***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Красную книгу, как уязвимый (категория **VU**) и Операционный список. Включен в Красный Список редких бабочек Европы (категория **LR**),
Общий ареал*:** Европа, юг Сибири, Забайкалье, Приморский край, Монголия, Китай, Кореа и Япония. ***Распространение в Республике Молдова*:** на всей территориии. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Рэскэець-Олэнешть” и ”Долина Олэнешть-Крокмаз”.





Семейство **Lucanidae** Latreille, 1804 **– Lucanide – Рогачи**

1. ***Lucanus cervus*** (Linnaeus, 1758) **– Rădașcă – Жук-олень**

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) **– Rădașcă – Жук-олень**
Семейство **Lucanidae** Latreille, 1804 **– Lucanidee – Рогачи**




Статус: вид уязвимый – **VU.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **III**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**) и Красную книгу Приднестровья (категория **VU**). Занесен в Приложение III Бернской Конвенции и Приложение II Директивы по местообитаниям и в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний**”).

Общее распространение*:** Европа и Азия (до Ирана и Казахстана). ***Распространение в Республике Молдова*:** лесные районы. ***На территории сайта встречается во всех комплексах с присутствием лесных биотопов.







Семейство **Mantidae** Burmeister, 1838 **– Mantide – Настоящие богомолы**


1. ***Ameles descolor*** (Charpentier, 1825) **– Călugărița incoloră – Богомол бесцветный**


Ameles descolor (Charpentier, 1825) **– Călugărița incoloră –**
Богомол бесцветный
Семейство **Mantidae** Burmeister, 1838 **– Mantide – Настоящие богомолы**



***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова Включен в Операционный список и в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**).

Общий ареал*:** Южная Европа и северо-западная часть Африки. ***Распространение в Республике Молдова*:** южная зона. ***На территории сайта обычен, приурочен к сухим склонам с травянистой растительностью.





Семейство **Nymphalidae** Rafinesque, 1815 **– Nimfalide – Нимфалиды**

1. ***Aglais urticae*** (Linnaeus, 1758) **– Urzicar – Крапивница**
2. ***Apatura iris*** (Linnaeus, 1758) **– Fluture-cu-irizații – Переливница ивовая**
3. ***Apatura metis*** (Freyer, 1829) **– Fluture metis – Переливница метида**
4. ***Argynnis aglaja*** Linnaeus, 1758 **– Fluture Aglaia – Перламутровка Аглая**
5. ***Neptis sappho*** (Pallas, 1771) **– Fluture pestriț sapfo – Пеструшка темнокрылая**

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) **– Urzicar – Крапивница**
Семейство **Nymphalidae** Rafinesque, 1815 **– Nimfalide – Нимфалиды**



***Охранный статус*:** критически угрожаемый – **CR**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Операционный список и в Красную книгу Приднестровья как критически угрожаемый вид (категория **CR)**.
Общий ареал*:** вся Палеарктическая область. ***Распространение в Республике Молдова*:** по всей территории. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Заозерное-Нукарь ”.






Apatura iris (Linnaeus, 1758) **– Fluture-cu-irizații – Переливница ивовая**
Семейство **Nymphalidae** Rafinesque, 1815 **– Nimfalide – Нимфалиды**



***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова Включен в Операционный список, в Красную книгу Республики Молдова как уязвимый вид (категория **VU**) и Красная книга Приднестровья (категория **DD**). Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”).
Общий ареал*:** дизъюнктивный – Центральная и Восточная Европа, Кавказ, Малая Азия и далее – Забайкалье, Приморье Россия, Китай, Корея и Япония. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично в долинах рек Днестр и Прут. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Туфа-Стынка Талмаза”.






Apatura metis (Freyer, 1829)**– Fluture metis – Переливница метида**
Семейство **Nymphalidae** Rafinesque, 1815 **– Nimfalide – Нимфалиды**



***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Операционный список и в Красную книгу Республики Молдова как угрожаемый вид (категория **VU**). Включен в Красный Список редких бабочек Европы (категория **LR**), Приложение II Бернской Конвенции, Приложение IV Директивы по местообитаниям.

Общий ареал*:** Восточная и юго-восточная Европа, Кавказ, Казахстан, Западная Сибирь, Забайкалье, Приморье, Китай, Корея и Япония. ***Распространение в Республике Молдова*:** долины рек Днестр и Прут. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Талмазские плавни”.






Argynnis aglaja Linnaeus, 1758 **– Fluture Aglaia – Перламутровка Аглая**
Семейство **Nymphalidae** Rafinesque, 1815 **– Nimfalide – Нимфалиды**



***Охранный статус*:** вид без статуса.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Операционный список.
Общий ареал*:** от Западной Европы и Северо-Западной Африки по всей Евразии до Японии. ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадично по всей территории страны. ***На территории сайта встречается редко – только в комплексе ”Валя Штюбей”.






Neptis sappho (Pallas, 1771) **– Fluture pestriț sapfo – Пеструшка темнокрылая**
Семейство **Nymphalidae** Rafinesque, 1815 **– Nimfalide – Нимфалиды**



***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова Включен в Операционный список и в Красную книгу Республики Молдова как уязвимый вид (категория **VU**). Включен в Красный Список редких бабочек Европы (категория **LR**).
Общий ареал*: Восточная и юго-восточная** Европа, Кавказ, Казахстан, Южная Сибирь, Китай, Корея и Япония. ***Распространение в Республике Молдова*:** в северной и центральной части. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Валя Штюбей” и ”Валя Туркулуй”.





Семейство **Papilionidae** Latreille, 1802 **– Papilionide – Парусники**


1. ***Iphiclides podalirius*** Linnaeus, 1758 **– Fluture podalir – Подалирий**
2. ***Papilio machaon*** (Linnaeus, 1758) **– Fluture Mahaon – Махаон**
3. ***Parnassius mnemosyne*** (Linnaeus, 1758) **– Fluture-Apolon-negru – Мнемозина**
4. ***Zerynthia polyxena*** (Denis et Schiffermüller, 1775) **– Fluture polixena – Поликсена**

Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758 **– Fluture podalir – Подалирий**
Семейство **Papilionidae** Latreille, 1802 **– Papilionide – Парусники**



***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III)**.
Общий ареал*:** Европа, Кавказ, Казахстан, Алтай, Малая Азия, Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова*:** встречается на всей территории. ***На территории сайта отмечен во многих комплексах.






Papilio machaon (Linnaeus, 1758) **– Fluture Mahaon – Махаон**
Семейство **Papilionidae** Latreille, 1802 **– Papilionide – Парусники**

***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **II)**, Включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**). Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”).
Общий ареал*:** Европа (кроме северных районов и Англии), Северная Африка, Азия, Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова*:** повсеместно. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса” и ”Валя Туркулуй”.








Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) **– Fluture-Apolon-negru – Мнемозина**
Семейство **Papilionidae** Latreille, 1802 **– Papilionide – Парусники**



***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **II)**. Включен в Красную книгу Республики Молдова как уязвимый вид (категория **VU**) и в Красную книгу Приднестровья (категория **EN**). Включен в Красную книгу Украины(категория ”**Вразливий**”), Приложение II Бернской Конвенции, Приложение IV Директивы по местообитаниям.
Общий ареал*:** Европа, Северная Африка, Центральная Азия, Восточный Казахстан. ***Распространение в Республике Молдова*:** повсеместно. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Валя Штюбей” и ”Валя Туркулуй”.





Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermüller, 1775) **– Fluture polixena – Поликсена**

Семейство **Papilionidae** Latreille, 1802 **– Papilionide – Парусники**




***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**

***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**). Включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**) и в Красную книгу Приднестровья (категория **VU**). Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”), Приложение II Бернской Конвенции, Приложение IV Директивы по местообитаниям.

Общий ареал*:** Центральная, Южная и Юго-Восточная Европа, Западный Кавказ, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** на всей территории страны. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Рэскэць-Олэнешть”, ”Долина Олэнешть- Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса” и ”Валя Штюбей”.





Семейство **Pieridae** Duponchel, 1835 **– Pieride – Белянки**

1. ***Colias chrysotheme*** (Esper, 1781) **– Gălbioară aurie – Желтушка золотистая**

Colias chrysotheme (Esper, 1781) **– Gălbioară aurie – Желтушка золотистая**

Семейство **Pieridae** Duponchel, 1835 **– Pieridee – Белянки**




***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**

***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**) и в Операционный список. Включен в Красный Список редких бабочек Европы (категория **VU**).

Общий ареал*:** степная и юг лесостепной зоны Восточной Европы, Северо-Восточный Китай, Забайкалье. ***Распространение в Республике Молдова*:** редко в юго-восточных и южных районах. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Рэскэець-Олэнешть”.





Семейство **Riodinidae** Grote, 1895 **– Riodinide – Риодиниды**


1. ***Hamearis lucina*** (L.) **– Fluture pestriț de-pădure – Пеструшка лесная**

Hamearis lucina (L.) **– Fluture pestriț de-pădure – Пеструшка лесная**
Семейство **Riodinidae** Grote, 1895 **– Riodinide – Риодиниды**



***Охранный статус*:** критически угрожаемый вид – **CR**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Красную книгу, как критически угрожаемый вид (категория **CR**), в Красную книгу Приднестровья (категория **DD**) и в Операционный список. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”).

Общий ареал*:** Центральная и Юго-Восточная Европа, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** Центральная и Северная зоны. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Валя Туркулуй” и ”Валя Штюбей”.





Семейство **Scarabaeidae** Latreille, 1802 **– Scarabeide – Пластинчатоусые**


1. ***Oryctes nasicornis*** (Linnaeus, 1758) **– Gândac-rinocer – Жук-носорог**

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) **– Gândac-rinocer – Жук-носорог**
Семейство **Scarabaeidae** Latreille, 1802 **– Scarabeide – Пластинчатоусые**



***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III)**, включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**) и в Красную книгу Приднестровья (категория **VU**).
Общий ареал*:** Европа (за исключением северных регионов и Англии), Северная Африка, Малая и Средняя Азия, Кавказ и юг Западной Сибири. ***Распространение в Республике Молдова*:** на всей территории. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Валя Туркулуй” и ”Валя Штюбей”.






Семейство **Scoliidae** Latreille, 1802 **– Scoliide – Сколии**


1. ***Megascolia maculata*** (Drury, 1773) **– Viespe gigant – Сколия-гигант**
2. ***Scolia hirta*** (Schrank, 1781) **– Viespe stepică – Сколия волосатая**

Megascolia maculata (Drury, 1773) **– Viespe gigant – Сколия-гигант**
Семейство **Scoliidae** Latreille, 1802 **– Scoliide – Сколии**



***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III)**, включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**) и Красную книгу Приднестровья (категория **VU**). Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Неоцінений**”).
Общий ареал*:** Европа (за исключением севера), Кавказ, Центральная Азия, Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова*:** на всей территории страны. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь ”, ”Рэскэець-Олэнешть” и ”Валя Штюбей”.






Scolia hirta (Schrank, 1781) **– Viespe stepică – Сколия волосатая**
Семейство **Scoliidae** Latreille, 1802 **– Scoliide – Сколии**



***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Красную книгу (категория **VU**), в Красную книгу Приднестровья (категория **VU**) и в Операционный список.
Общий ареал*:** Южная Европа, Казахстан, юг Западной Сибири, Центральная Азия, Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова*:** вся территория страны. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Рэскэець-Олэнешть”.






Семейство **Sphingidae** Latreille, 1802 **– Sfingide – Бражники**


1. ***Acherontia atropos*** (Linnaeus, 1758) **– Fluture-cap-de-mort – Бражник мертвая голова**
2. ***Proserpinus proserpina*** (Pallas, 1772) **– Porumbac proserpin – Бражник прозерпина**
3. ***Saturnia pyri*** (Denis et Schiffermüller, 1775) **– Ochi-de-păun-mare – Большой ночной павлиний глаз**

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) **– Fluture-cap-de-mort – Бражник мертвая голова**
Семейство **Sphingidae** Latreille, 1802 **– Sfingide – Бражники**

***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV)**, включен в Красную книгу (категория **VU**). Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний**”).
Общий ареал*:** тропическая Африка, Мадагаскар, Сирия, Ирак, Кувейт, северо-восточный Иран, западные районы Саудовской Аравии. В западной части Палеарктики является залетным видом. В отдельные годы вид может совершать перелеты до Средней и Северной Европы, включая Исландию. ***Распространение в Республике Молдова*:** на всей территории страны. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Талмазские плавни”.








Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) **– Porumbac proserpin – Бражник прозерпина**
Семейство **Sphingidae** Latreille, 1802 **– Sfingide – Бражники**



***Охранный статус*:** критически угрожаемый вид – **CR**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова включен в Красную книгу как критически угрожаемый вид (категория **CR**) и в Операционный список. Включен в Приложение II Бернской Конвенции и в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний**”).
Общий ареал*:** Центральная и Восточная Европа, Кавказ, юг Западной Сибири, Иран, Восточный Афганистан, Северо-Восточный Китай, Северо-Восточная Африка. ***Распространение в Республике Молдова*:** Центральная и Северная зоны. ***На территории сайта встречается в комплексе ”Валя Штюбей”.






Saturnia pyri (Denis et Schiffermüller, 1775) **– Ochi-de-păun-mare– Большой ночной павлиний глаз**
Семейство **Sphingidae** Latreille, 1802 **– Sfingide – Бражники**



***Охранный статус*:** уязвимый вид – **VU.**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III)**, включен в Красную книгу (категория **VU**) и Красную книгу Приднестровья (категория **VU**). Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний**”).
Общий ареал*:** Центральная и Восточная Европа, Кавказ, Малая Азия, Иран. ***Распространение в Республике Молдова*:** на всей территории страны. ***На территории сайта встречается в комплексах ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Рэскэець-Олэнештть” и ”Валя Туркулуй”.





Семейство **Tettigoniidae** Krauss, 1902 **– Tettigoniide – Настоящие кузнечики**

1. ***Onconotus servillei*** (Fischer von Waldheim, 1846) **– Cosașul-lui-Servillei – Шевчук Сервиля**
2. ***Saga pedo*** (Pallas, 1771) **– Cal de-stepă – Дыбка степная**

Onconotus servillei (Fischer von Waldheim, 1846) **– Cosașul-lui-Servillei – Шевчук Сервиля**

Семейство **Tettigoniidae** Krauss, 1902 **– Tettigoniide – Настоящие кузнечики**




***Охранный статус*:** критически угрожаемый вид – **CR .**

***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова, как критически угрожаемый вид (категория **CR**) и в Красный Список МСОП (категория **VU**).

Общий ареал: зона степей Евразии (до Западной Сибири). ***Распространение в Республике Молдова*:** южная зона. ***На территории сайта*** встречается в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець”.






Saga pedo (Pallas, 1771) **– Cal de-stepă – Дыбка степная**
Семейство **Tettioniidae** Krauss, 1902 **– Tettigoniide – Настоящие кузнечики**



***Охранный статус*:** критически угрожаемый вид – **CR .**
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **II)**, включен в Красную книгу как критически угрожаемый вид (категория **CR**). Включен в Красный Список МСОП (категория **VU**), Приложение II Бернской Конвенции, Приложение IV Директивы по местообитаниям и в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний**”).
Общий ареал*:** степные и травянисто-кустарниковые аридные биотопы Южной Европы, Южный Урал, Казахстан, юг Сибири (до Киргизии). ***Распространение в Республике Молдова*:** спорадически в южной и центральной зонах страны. ***На территории сайта был отмечен только в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець”, на остепненных склонах.





Класс **Amphibia** Linnaeus, 1758 **– Amfibieni – Земноводные**

Конспект видов земноводных Рамсарского сайта «Нижний Днестр», охраняемых на национальном и международных уровнях, представляет собой аннотированный список таксонов, произрастающих на его территории. Семейства и виды внутри семейств расположены в алфавитном порядке.

Для каждого вида приводятся следующие характеристики:

- латинское, румынское и русское названия;
- принадлежность к семейству на латинском, румынском и русском языках;
- статус (категория редкости);
- охранный статус (включенность в Экологическое законодательство Республики Молдова (категории редкости охраняемых видов: I – исчезнувший вид, II – вид, находящийся под угрозой исчезновения, III – вид, численность которого сокращается катастрофически быстро, что может поставить его под угрозу исчезновения, IV – редкий вид, V – неопределенный вид, VI – восстановленный вид, VII – недостаточно изученный вид, VIII – вид, не вызывающий опасений) [199], Операционный список [181], Красную книгу Республики Молдова [9], Красную книгу Приднестровья [112], Красную книгу Украины [186], Бернскую Конвенцию [11], Приложения Директивы по местообитаниям [14]);
- общий ареал [60];
- распространение в Республике Молдова [4, 9, 25];
- распространение на территории сайта – приуроченность к природным комплексам;
- приуроченность к местообитаниям;
- фото Цуркану В.Ф.. Использованы материалы сайта www.wikipedia.org

Редкие виды земноводных

В составе фауны земноводных Рамсарского сайта «Нижний Днестр» **13** видов амфибий, охраняемых на международном и национальном уровнях [1, 2, 9, 25, 62, 63, 66, 67, 84, 134, 172-176]. Они различаются по степени редкости, представлены разными по численности популяциями, распространение некоторых из них ограничивается одним или несколькими пунктами. Некоторые виды нуждаются в специальных мерах по сохранению, особенно виды высоких категорий редкости. Для них надлежит организовать мониторинг состояния их локальных популяций.

Под государственной охраной в Республике Молдова [199] находятся 2 редких вида (категория **IV**) – *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761) и *Triturus cristatus* (Laurenti, 1786).

Наиболее редкие виды высоких категорий редкости (7 видов) включены в 3-е издание Красной книги Республики Молдова [9]: 1 критически угрожаемый вид (категория **CR**) – *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768) и 6 уязвимых видов (категория **VU**) – *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761), *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758), *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758), *Rana dalmatina* (Bonaparte, 1840), *Triturus cristatus* (Laurenti, 1786), *Triturus, vulgaris* (Laurenti, 1786).

В Красную книгу Приднестровья включены 4 вида [112]: 1 угрожаемый (категория **EN**) – *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758), 1 уязвимый (категория **VU**) – *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768) и 2 вида (*Rana dalmatina* (Bonaparte, 1840), *Triturus, vulgaris* (Laurenti, 1786) с дефицитом данных (категория **DD**).

В Операционный список, составленный при разработке Национальной Экологической Сети Республики Молдова, включены 7 видов [180].

В Красную книгу Украины включены 2 произрастающих на территории сайта видов [186], из них 1 видов категории ”**Вразливий**” – *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761) и 1 вид категории ”**Зникаючий**” – *Rana dalmatina* (Bonaparte, 1840).


В Списки Конвенции по Сохранению Европейской дикой природы и естественных местообитаний (Бернская Конвенция, 1979) [11] включены виды: *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761), *Bufo viridis* (Laurenti, 1786), *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758), *Rana dalmatina* (Bonaparte, 1840), *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768), *Triturus cristatus* (Laurenti, 1786).

В Приложения Директивы по местообитаниям (Директива Совета 92/43/EEC от 21 мая 1992 по сохранению природных местообитаний и дикой фауны и флоры) [14] включены 2 вида – *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761), *Bufo viridis* (Laurenti, 1786), *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768), *Triturus cristatus* (Laurenti, 1786), *Triturus, vulgaris* (Laurenti, 1786). *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758), *Rana dalmatina* (Bonaparte, 1840),


Семейство **Bufonidae** J.E.Gray, 1825 **– Bufonide – Жабы**

1. ***Bufo bufo*** Linnaeus, 1758 – **Broască râioasă sură** – **Жаба обыкновенная**
2. ***Bufo viridis*** Laurenti, 1786 – **Broască râioasă verde** – **Жаба зеленая**

Bufo bufo Linnaeus, 1758 – **Broască râioasă sură** – **Жаба обыкновенная**
Семейство **Bufonidae** J.E.Gray, 1825 **– Bufonide – Жабы**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**) и Красную книгу Приднестровья (категория **EN**).
Общий ареал: северо-запад Африки, большая часть Европы и умеренной зоны Азии, до Байкала. ***Распространение в Республике Молдова:*** преимущественно в лесных местообитаниях с повышенной влажностью, отсутствует в зоне степей. ***На территории сайта*** встречается во всех комплексах с участками леса.






Bufo viridis Laurenti, 1786 – **Broască râioasă verde** – **Жаба зеленая**
Семейство **Bufonidae** J.E.Gray, 1825 **– Bufonide – Жабы**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: Центральная и Южная Европа, Западная и Центральная Азия, до Казахстана. ***Распространение в Республике Молдова:*** обычный вид на всей территории страны, исключая лесные участки. ***На территории сайта*** встречается в большинстве комплексов, однако избегает участки с густым лесом.







Семейство **Discoglossidae** Fitzinger, 1843 **– Discogloside – Круглоязычные**


1. ***Bombina bombina*** Linnaeus, 1761 **– Izvoraş-cu-abdomen-roşu – Жерлянка краснобрюхая**

Bombina bombina Linnaeus, 1761 **– Izvoraş-cu-abdomen-roşu – Жерлянка краснобрюхая**
Семейство **Discoglossidae** Fitzinger, 1843 **– Discogloside – Круглоязычные**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”), Приложения Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: юго-восток и центр Европы, до Уральских гор. ***Распространение в Республике Молдова:*** обычный вид в водоемах на территории всей страны, включая и лесные биотопы. ***На территории сайта*** распространен во всех комплексах, где есть заболоченные местообитания.





Семейство **Hylidae** Rafinesque, 1815 **– Hilide – Квакши**


1. ***Hyla arborea*** Linnaeus, 1758 – **Brotăcel (Buratic)** – **Квакша обыкновенная**

Hyla arborea Linnaeus, 1758 – **Brotăcel (Buratic)** – **Квакша обыкновенная**
Семейство **Hylidae** Rafinesque, 1815 **– Hilide – Квакши**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: ареал вида охватывает всю Европу, достигая на восток Уральских гор и Кавказа, Малой Азии, северо-западной Африки. ***Распространение в Республике Молдова:*** обычный вид, встречающийся на всей территории страны. ***На территории сайта*** распространен во всех комплексах. Предпочитает облесенные участки, с кустарником и зарослями камыша.





Семейство **Pelobatidae** Bonoparte, 1850 **– Pelobatide – Чесночницы**


1. ***Pelobates fuscus*** Laurenti, 1768 **– Broasca brună de-câmp – Чесночница обыкновенная**

Pelobates fuscus Laurenti, 1768 **– Broasca brună de-câmp – Чесночница обыкновенная**
Семейство **Pelobatidae** Bonoparte, 1850 **– Pelobatide – Чесночницы**

Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR**.
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), в Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), в Операционный список, Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.

Общий ареал: от Центральной Европы до западных районов Азии. ***Распространение в Республике Молдова:*** на всей территории, но в спорадичных малочисленных популяциях. ***На территории сайта*** встречается в комплексах “Туфа-Стынка Талмаза”, “Копанка-Леунтя”, “Талмазские плавни”, “Рэскэець-Олэнешть”, “Долина Олэнешть-Крокмаз”, “Крокмаз-Тудора”, “Тудора-Паланка”. Предпочитает участки с супесчаными, или суглинистыми почвами, в которые легче зарываться.







Семейство **Ranidae** Rafinesque, 1814 **– Ranide – Лягушки настоящие**

1. ***Rana dalmatina*** Bonaparte, 1840 – **Broască roşie de-pădure** – **Лягушка прыткая**

Rana dalmatina Bonaparte, 1840 – **Broască roşie de-pădure** – **Лягушка прыткая**
Семейство **Ranidae** Rafinesque, 1814 **– Ranide – Лягушки настоящие**




Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.

***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), Красную книгу Приднестровья (категория **DD**), Красную книгу Украины (категория ”**Зникаючий**”), Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.

Общий ареал: от центра и юга Европы до северо-западной части азиатской Турции. Северная граница ареала проходит через Бельгию, Германию и запад Украины. На юг ареал охватывает Италию и Балканский полуостров. Изолированные популяции отмечены в Дании, Швеции и Польше. ***Распространение в Республике Молдова:*** из-за фрагментации местообитаний имеет ограниченное распространение. Заселяет, преимущественно, лесные биотопы с повышенной влажностью на севере и в центре страны. ***На территории сайта*** встречается в комплексах “Туфа-Стынка Талмаза” и “Грэдина Турчаскэ”.





Семейство **Salamandridae** Goldfuss, 1820 **– Salamandride – Саламандровые**


1. ***Triturus cristatus*** Laurenti, 1786 **– Triton crestat – Тритон гребенчатый**
2. ***Triturus vulgaris*** Laurenti, 1786 **– Triton comun – Тритон обыкновенный**

Triturus cristatus Laurenti, 1786 **– Triton crestat – Тритон гребенчатый**
Семейство **Salamandridae** Goldfuss, 1820 **– Salamandride – Саламандровые**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), в Операционный список, Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: ареал вида охватывает большую часть Европы, северо-западные области Российской Федерации, до Уральских гор. Южная граница проходит через Альпы, Румынию, Республику Молдова, побережье Черного моря. На севере ареал вида граничит с южными областями Швеции и Финляндии. ***Распространение в Республике Молдова:*** на всей территории страны, но (за исключением некоторых мест) в небольшой численности. ***На территории сайта*** встречается во всех комплексах, где есть заболоченные местообитания.






Triturus vulgaris Laurenti, 1786 **– Triton comun – Тритон обыкновенный**
Семейство **Salamandridae** Goldfuss, 1820 **– Salamandride – Саламандровые**

Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), в Красную книгу Приднестровья (категория **DD**) и Приложения Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: охватывает большую часть Европы (за исключением Пиренейского полуострова, юга Италии, Франции и севера Скандинавии). На восток тянется до Алтайских гор, на юг – до центра Италии, юга Балкан и северо-запада Турции. ***Распространение в Республике Молдова:*** почти на всей территории страны, но (за исключением некоторых степных районов) немногочислен. ***На территории сайта*** встречается во всех комплексах с водоемами.







Класс **Reptilia** Laurenti, 1768 **– Reptile – Пресмыкающиеся**

Конспект видов рептилий Рамсарского сайта «Нижний Днестр», охраняемых на национальном и международных уровнях, представляет собой аннотированный список таксонов, произрастающих на его территории. Семейства и виды внутри семейств расположены в алфавитном порядке.

Для каждого вида приводятся следующие характеристики:

- латинское, румынское и русское названия;
- принадлежность к семейству на латинском, румынском и русском языках;
- статус (категория редкости);
- охранный статус (включенность в Экологическое законодательство Республики Молдова (категории редкости охраняемых видов: I – исчезнувший вид, II – вид, находящийся под угрозой исчезновения, III – вид, численность которого сокращается катастрофически быстро, что может поставить его под угрозу исчезновения, IV – редкий вид, V – неопределенный вид, VI – восстановленный вид, VII – недостаточно изученный вид, VIII – вид, не вызывающий опасений) [199], Операционный список [181], Красную книгу Республики Молдова [9], Красную книгу Приднестровья [112], Красную книгу Украины [186], Списки МСОП [21], Европейский Красный список [22], Бернскую Конвенцию [11], Приложения Директивы по местообитаниям [14]);
- общий ареал [60];
- распространение в Республике Молдова [4, 9, 25];
- распространение на территории сайта – приуроченность к природным комплексам;
- приуроченность к местообитаниям;
- фото Цуркану В.Ф. Использованы материалы сайта www.wikipedia.org

Редкие виды рептилий

В составе фауны рептилий Рамсарского сайта «Нижний Днестр» выявлено **10** видов [1, 2, 9, 24, 29, 37-39, 52, 61, 63, 66, 67, 83, 134, 172, 173, 175, 180, 182-184], охраняемых на международном и национальном уровнях. Они различаются по степени редкости, представлены разными по численности популяциями, распространение некоторых из них ограничивается одним или несколькими пунктами. Некоторые виды нуждаются в специальных мерах по сохранению, особенно виды высоких категорий редкости.

Под государственной охраной в Республике Молдова находятся 7 видов [199]: 4 вида, численность которых сокращается катастрофически быстро, что может поставить их под угрозу исчезновения (категория **III**) – *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758), *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758), *Natrix tessellata* (Laurenti, 1768), *Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768); 3 редких видов (категория **IV**) – *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768), *Elaphe quatuorlineata* (Lacepede, 1789), *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758).

Наиболее редкие виды высоких категорий редкости включены в Красную книгу Республики Молдова [9]: 1 критически угрожаемый вид (категория **CR**) – *Elaphe quatuorlineata* (Lacepede, 1789); 4 угрожаемых (категория **EN**) – *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758), *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768), *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758), *Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768).

В Красную книгу Приднестровья включены 4 вида: 2 угрожаемых (категория **EN**) – *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758), *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768); 1 уязвимый (категория **VU**) – *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) и 1 вид (*Elaphe quatuorlineata* (Lacepede, 1789)) с дефицитом данных (категория DD).

В Операционный список, составленный при разработке Национальной Экологической Сети Республики Молдова, включены 5 видов [181].

На территории сайта встречаются виды, редкие в сопредельной территории – в Украине. В Красную книгу Украины включены 4 вида [186], из них 3 вида категории ”**Вразливий**” – *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758), *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768), *Lacerta agilis* (Linnaeus, 1758) и 1 вид (*Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768) категории ”**Зникаючий**”.

В Красный Список МСОП включены 3 вида [21]: *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768) категории ”**VU**” и 2 вида – *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758) и *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) категории ”**NT**”.

В Красный Список Европы включены 3 вида [22]: *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768) категории ”**VU**” и 2 вида – *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758) и *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) категории ”**NT**”.

Из списка Конвенции по Сохранению Европейской дикой природы и естественных местообитаний (Бернская Конвенция, 1979) [11] отмечены 8 строго охраняемых видов: *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758), *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768), *Elaphe quatuorlineata* (Lacepede, 1789), *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758), *Lacerta agilis* (Linnaeus, 1758), *Lacerta viridis* (Laurenti, 1768), *Natrix tessellata* (Laurenti, 1768), *Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768).

В Приложения II и IV Директивы по местообитаниям (Директива Совета 92/43/EEC от 21 мая 1992 по сохранению природных местообитаний и дикой фауны и флоры) [14] включены те же 8 видов, которые охраняются Бернской Конвенцией.

Familia **Colubridae** Oppel, 1811 **– Colubride – Ужеобразные**

1. ***Coluber caspius*** Linnaeus, 1758 **– Şarpe-cu-abdomen-galben – Полоз желтобрюхий**
2. ***Coronella austriaca*** Laurenti, 1768 **– Şarpe-de-alun – Медянка**
3. ***Elaphe quatuorlineata*** Lacepede, 1789 **– Şarpe-cu-patru-dungi – Полоз четырехполосый**
4. ***Natrix tessellata*** Laurenti, 1768 **– Şarpe-de-apă – Уж водяной**
5. ***Zamenis longissimus*** Laurenti, 1768 **– Şarpele-lui-Esculap – Полоз Эскулапов**

Coluber caspius Linnaeus, 1758 **– Şarpe-cu-abdomen-galben – Полоз желтобрюхий**
Семейство **Colubridae** Oppel, 1811 **– Colubride – Ужеобразные**


Охранный статус: угрожаемый вид – **EN**.

***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **EN**), в Красную книгу Приднестровья (категория **EN**), Красную книгу Украины (категория ”**Зникаючий**”), в Операционный список, Красный список Европы и МСОП (категория **NT**), Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.



Общий ареал: северо-восток Балканского полуострова, к северу до Венгрии, южных районов Румынии, Республики Молдова, Украины, европейской части России, востока Казахстана, Закавказья, Северной Турции и Иордании. Изолированные популяции были зарегистрированы на севере Туркменистана и Ирана. ***Распространение в Республике Молдова:*** южные районы, долина реки Днестр, на участке Каменка – Паланка, Нижний Рэут. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя” и ”Туфа-Стынка Талмаза”. Предпочитает облесенные овраги.





Coronella austriaca Laurenti, 1768 **– Şarpe-de-alun – Медянка**
Семейство **Colubridae** Oppel, 1811 **– Colubride – Ужеобразные**




Охранный статус: угрожаемый вид – **EN**.

***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **EN**), в Красную книгу Приднестровья (категория **EN**), Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”), в Операционный список, Красный список Европы и МСОП (категория **VU**), Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.

Общий ареал: ареал вида охватывает почти всю территорию Европы (за исключением Ирландии, большей части Великобритании, центра и юга Пиренейского полуострова) и тянется до запада Казахстана и Кавказа. ***Распространение в Республике Молдова:*** на всей территории, но имеет неоднородное распространение. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Кырнэцень”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”. Проявляет предпочтение лесным экотонам и степным участкам, поросших кустарниками.






Elaphe quatuorlineata (Lacepede, 1789) **– Şarpe-cu-patru-dungi – Полоз четырехполосый**
Семейство **Colubridae** Oppel, 1811 **– Colubride – Ужеобразные**



Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), в Операционный список, Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.

Общий ареал: юго-восток Европы, Малая Азия, Кавказ, юго-запад Казахстана, северо-запад Туркменистана и запад Ирана. ***Распространение в Республике Молдова:*** степная зона, но в настоящее время является под угрозой исчезновения, образуя несколько изолированных популяций. ***На территории сайта*** встречается в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець” на остепненных склонах.






Natrix tessellata Laurenti, 1768 **– Şarpe-de-apă – Уж водяной**
Семейство **Colubridae** Oppel, 1811 **– Colubride – Ужеобразные**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III**), включен в Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: Южная и Центральная Европа, Балканский полуостров, Малая и Центральная Азия, до Персидского залива и озера Балхаш. ***Распространение в Республике Молдова:*** обычный вид, чаще встречающийся в долинах Прута, Днестра и их притоков. Локально может быть многочисленным видом (особенно вблизи рыбоводных хозяйств). ***На территории сайта*** встречается во всех комплексах с водоемами.






Zamenis longissimus Laurenti, 1768 **– Şarpele-lui-Esculap – Полоз Эскулапов**
Семейство **Colubridae** Oppel, 1811 **– Colubride – Ужеобразные**

Охранный статус: угрожаемый вид – **EN**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **EN**), Красную книгу Украины (категория ”**Зникаючий**”), в Операционный список, Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: центр и юг Европы (включая Румынию и Республику Молдова), побережье Каспийского моря, Турция, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова:*** долина Днестра, частично вдоль Прута и Нижнего Рэута. ***На территории сайта*** был зарегистрирован в лесных комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Заозерное-Нукарь”, где образует локальные популяции.







Семейство **Emydidae** Rafinesque, 1815 **– Emidide –**
Американские пресноводные черепахи

1. ***Emys orbicularis*** Linnaeus, 1758 **– Broasca ţestoasă de-apă – Черепаха болотная**

Emys orbicularis Linnaeus, 1758 **– Broasca țestoasă de-apă – Черепаха болотная**
Семейство **Emydidae** Rafinesque, 1815 **– Emidide – Американские пресноводные черепахи**


Охранный статус: угрожаемый вид – **EN**.

***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **EN**), в Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), в Операционный список, Красный список Европы и МСОП (категория **NT**), Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.

Общий ареал: Центральная и Южная Европа, Малая Азия, северо-запад Африки. ***Распространение в Республике Молдова:*** спорадически на всей территории, более часто в долинах Днестра и Прута, в некоторых рыбоводческих хозяйствах. ***На территории сайта*** встречается во всех комплексах с водоемами, преимущественно в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Тудора-Паланка”.







Семейство **Lacertidae** Bonoparte, 1831 **– Lacertide – Ящерицы настоящие**

1. ***Lacerta agilis*** Linnaeus, 1758 **– Şopârla ageră (Şopârla cenuşie) – Ящерица прыткая**
2. ***Lacerta viridis*** Linnaeus, 1758 **– Şopârla verde – Ящерица зеленая**


Lacerta agilis Linnaeus, 1758 **– Şopârla ageră (Şopârla cenuşie) – Ящерица прыткая**
Семейство **Lacertidae** Bonoparte, 1831 **– Lacertide – Ящерицы настоящие**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”), Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.

Общий ареал: большая часть Евразии – от юга Англии и центра Франции до запада Китая. ***Распространение в Республике Молдова:*** на всей территории страны (за исключением Центральных Кодр). Вид с повышенной экологической пластичностью в условиях агроландшафта. ***На территории сайта*** встречается во всех комплексах, предпочитая открытые участки.






Lacerta viridis Linnaeus, 1758 **– Şopârla verde – Ящерица зеленая**
Familia **Lacertidae** Bonoparte, 1831 **– Lacertide – Ящерицы настоящие**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”), Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: простирается от центра и юга Европы до восточного побережья Черного моря. ***Распространение в Республике Молдова:*** вид обычен по всей территории (кроме степных районов). ***На территории сайта*** встречается в всех комплексах, преимущественно на лесных территориях – ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь” и ”Ымпэрэтясэ”.





Класс **Aves** Linnaeus, 1758 **– Păsări – Птицы**

Конспект Каталог «редких» видов птиц Рамсарского сайта «Нижний Днестр», включенных в различные охранные документы национального и международного уровней, представляет собой аннотированный список таксонов, встречающихся на его территории. Помимо действительно редких видов, в атласе представлены также многие обычные или даже очень многочисленные птицы, которые, тем ни менее, оказались включенными в списки Бернской или других конвенций (например, *Corvus frugilegus* (Linnaeus, 1758), *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758, *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758), *Turdus merula* (Linnaeus, 1758), *Turdus philomelos* (Brehm, 1831), *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758), *Parus major* (Linnaeus, 1758), *Corvus cornix* (Linnaeus, 1758), *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758), *Merops apiaster* Linnaeus, 1758 и др.).

Семейства и виды внутри семейств расположены в алфавитном порядке.

Для каждого вида приводятся следующие характеристики:

- латинское [145 и др.], румынское и русское названия;
- принадлежность к семейству на латинском [145 и др.], румынском и русском языках;
- статус (категория редкости);
- охранный статус (включенность в Экологическое законодательство Республики Молдова (категории редкости охраняемых видов: I – исчезнувший вид, II – вид, находящийся под угрозой исчезновения, III – вид, численность которого сокращается катастрофически быстро, что может поставить его под угрозу исчезновения, IV – редкий вид, V – неопределенный вид, VI – восстановленный вид, VII – недостаточно изученный вид, VIII – вид, не вызывающий опасений) [199], Операционный список [88], Красную книгу Республики Молдова [9], Красную книгу Приднестровья [112], Красную книгу Украины [186], Списки МСОП [21], Бернскую Конвенцию [11], Боннскую конвенцию [12], Европейскую Директиву по птицам [13]);
- общий ареал [42, 44, 145 и др.];
- распространение в Республике Молдова [27, 43-45 и др.];
- распространение на территории сайта – приуроченность к природным комплексам;
- приуроченность к местообитаниям.
- информация об экологии, питании видов [43-45 и др.];
- фото Тищенкова А.А. и Романовича Н.А. Использованы материалы сайта www.wikipedia.org

Орнитофауна и редкие виды птиц

Орнитофауна Рамсарского сайта «Нижний Днестр» включает около **200** видов [1, 2, 26, 27, 43-45, 52, 55-59, 64, 69-75, 80-82, 86, 87, 89-93, 112-117, 123-128, 131, 140, 141, 147-171, 196, 197]. В атлас вошли **183** вида птиц, фигурирующих в природоохранных списках международного и национального уровней. Часть из этих видов гнездится на территориях сайта, другие встречаются здесь лишь во время миграций или зимой. Причем репродуктивное распространение видов может быть указано лишь для одного или нескольких пунктов, а в периоды миграций они наблюдаются повсеместно. Некоторые виды являются действительно редкими и нуждающимися в особых охранных мерах. Для них желательно проведение мониторинга состояния популяций.

В Красный список МСОП [21] включены 14 видов птиц (виды категории **LC** не учитывались). Из них 1 птица отнесена к категории угрожаемых видов (**EN**) - *Falco cherrug* (I.E. Gray, 1834); 5 уязвимых видов (**VU**) - *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758), *Aquila clanga* (Pallas, 1811), *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758), *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769), *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758); 8 видов близких к уязвимому положению (категория **NT**) – *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758), *Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770), *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763), *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766), *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758), *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758), *Turdus iliacus* (Linnaeus, 1766), *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758).

Под государственной охраной в Республике Молдова [199] находятся 56 видов: 13 видов находятся под угрозой исчезновения (категория **II**) – *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758), *Aquila clanga* (Pallas, 1811), *Aquila pomarina* (Ch.L. Brehm, 1831), *Ardea alba* (Linnaeus, 1758), *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758), *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788), *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758), *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758), *Hieraaetus pennatus* (Gmelin, 1788), *Falco cherrug* (I.E. Gray, 1834), *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758), *Platalea leucorodia* (Linnaeus, 1758), *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766); 3 вида, численность которых сокращается катастрофически быстро, что может поставить их под угрозу исчезновения (категория **III**) – *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763), *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766), *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758); 12 редких видов (категория **IV**) – *Ardea purpurea* (Linnaeus, 1766), *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769), *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758), *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758), *Columba oenas* (Linnaeus, 1758), *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758), *Cygnus olor* (Gmelin, 1789), *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766), *Otus scops* (Linnaeus, 1758), *Pelecanus onocrotalus* (Linnaeus, 1758), *Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773), *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764); статус 7 видов не был определен (категория **V**) - *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758), *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758), *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758), *Falco peregrinus* (Tunstal, 1771), *Milvus migrans* (Boddaert, 1783), *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769), *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758); 9 таксонов охарактеризованы как недостаточно изученные виды (категория **VII**) – *Accipiter brevipes* (Severtzov, 1850), *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758), *Asio otus* (Linnaeus, 1758), *Caprimulgus europaeus* (Linnaeus, 1758), *Corvus corax* (Linnaeus, 1758), *Crex crex* (Linnaeus, 1758), *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758), *Panurus biarmicus* (Linnaeus, 1758), *Podiceps ruficollis* (Pallas, 1764); состояние 12 видов ранее не вызывало опасений (категория **VIII**) – *Athene noctua* (Scopoli, 1769), *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758), *Columba palumbus* (Linnaeus, 1758), *Coracias*

garrulus (Linnaeus, 1758), *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758), *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763), *Falco tinnunculus* (Linnaeus, 1758), *Phasianus colchicus* (Linnaeus, 1758), *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758), *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758), *Strix aluco* (Linnaeus, 1758), *Upupa epops* Linnaeus, 1758.

В Красную книгу Молдовы [9] включены 42 вида птиц: 20 критически угрожаемых видов (категория **CR**) – *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758), *Aquila clanga* (Pallas, 1811), *Aquila pomarina* (Ch.L. Brehm, 1831), *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763), *Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770), *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758), *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788), *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766), *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758), *Columba oenas* (Linnaeus, 1758), *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758), *Hieraaetus pennatus* (Gmelin, 1788), *Falco cherrug* (I.E. Gray, 1834), *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764), *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758), *Pelecanus onocrotalus* (Linnaeus, 1758), *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758), *Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773), *Platalea leucorodia* (Linnaeus, 1758), *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766); 5 угрожаемых видов (категория **EN**) – *Ardea alba* (Linnaeus, 1758), *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769), *Crex crex* (Linnaeus, 1758), *Falco peregrinus* (Tunstal, 1771), *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758); 17 уязвимых видов (категория **VU**) – *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758), *Ardea purpurea* (Linnaeus, 1766), *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758), *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758), *Coracias garrulus* (Linnaeus, 1758), *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758), *Cygnus olor* (Gmelin, 1789), *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758), *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758), *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766), *Milvus migrans* (Boddaert, 1783), *Porzana parva* (Scopoli, 1769), *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766), *Porzana pusilla* (Pallas, 1776), *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769), *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764), *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758).

В Красную книгу Приднестровья [112] включен 38 видов: 6 угрожаемых вида (категория **EN**) – *Aquila clanga* (Pallas, 1811), *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763), *Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770), *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788), *Columba oenas* (Linnaeus, 1758), *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758); 30 уязвимых (категория **VU**) – *Anas strepera* (Linnaeus, 1758), *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758), *Aquila pomarina* (Ch.L. Brehm, 1831), *Ardea alba* (Linnaeus, 1758), *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769), *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758), *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758), *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827), *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758), *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758), *Crex crex* (Linnaeus, 1758), *Coracias garrulus* (Linnaeus, 1758), *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758), *Cygnus olor* (Gmelin, 1789), *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758), *Hieraaetus pennatus* (Gmelin, 1788), *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758), *Falco cherrug* (I.E. Gray, 1834), *Falco peregrinus* (Tunstal, 1771), *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758), *Milvus migrans* (Boddaert, 1783), *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758), *Otus scops* (Linnaeus, 1758), *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758), *Pelecanus onocrotalus* (Linnaeus, 1758), *Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773), *Platalea leucorodia* (Linnaeus, 1758), *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766), *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769), *Strix aluco* (Linnaeus, 1758); 1 вид с неопределенным статусом (категория **NE**) - *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766) и один вид с дефицитом данных (категория DD) - *Accipiter brevipes* (Severtzov, 1850).

В Операционный список, составленный при разработке Национальной Экологической Сети Республики Молдова [88], включены 30 видов.

На территории сайта встречаются 34 вида, включенных в Красную книгу Украины [186], из них 7 видов категории ”**Зникаючий**” – *Accipiter brevipes* (Severtzov, 1850), *Coracias garrulus* (Linnaeus, 1758), *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758), *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758), *Pelecanus onocrotalus* (Linnaeus, 1758), *Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773), *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803); 12 видов категории ”**Вразливий**” – *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758), *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758), *Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770), *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758), *Columba oenas* (Linnaeus, 1758), *Falco cherrug* (I.E. Gray, 1834), *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758), *Milvus migrans* (Boddaert, 1783), *Platalea leucorodia* (Linnaeus, 1758), *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766), *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769), *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764); 15 видов категории ”**Рідкісний**” – *Anas strepera* (Linnaeus, 1758), *Aquila clanga* (Pallas, 1811), *Aquila pomarina* (Ch.L. Brehm, 1831), *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769), *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763), *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758), *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788), *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766), *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758), *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827), *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758), *Hieraaetus pennatus* (Gmelin, 1788), *Falco peregrinus* (Tunstal, 1771), *Lanius excubitor* (Linnaeus, 1758), *Otus scops* (Linnaeus, 1758);

Список Бернской конвенции [11] наиболее богат птицами, зарегистрированными в пределах сайта – 132 вида. Мигрирующие птицы обозначены в списке Боннской конвенции [12] – 65 видов.

Перечень Европейской Директивы по птицам [13] включает 108 видов птиц, встречающихся в пределах Рамсарского сайта «Нижний Днестр».

Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**


1. ***Accipiter brevipes*** (Severtzov, 1850) **– Uliu-cu-picioare-scurte – Тювик европейский**
2. ***Accipiter gentilis*** (Linnaeus, 1758) **– Uliu porumbar – Ястреб-тетеревятник**
3. ***Accipiter nisus*** (Linnaeus, 1758) **– Uliu păsărar – Ястреб-перепелятник**
4. ***Aquila chrysaetos*** (Linnaeus, 1758) **– Acvilă de-munte – Беркут**
5. ***Aquila clanga*** (Pallas, 1811) – **Acvilă ţipătoare mare – Подорлик большой**
6. ***Aquila pomarina*** (Ch.L. Brehm, 1831) **– Acvilă ţipătoare mică – Подорлик малый**
7. ***Buteo buteo*** (Linnaeus, 1758) **– Șorecar comun – Канюк**
8. ***Buteo lagopus*** (Pontoppidan, 1763) **– Șorecar încălțat – Зимняк**
9. ***Buteo rufinus*** (Cretzschmar, 1827) **– Șorecar roșu – Курганник**
10. ***Circaetus gallicus*** (Gmelin, 1788) – **Şerpar** – **Змееяд**
11. ***Circus aeruginosus*** (Linnaeus, 1758) **– Erete de-stuf – Лунь болотный**
12. ***Circus cyaneus*** (Linnaeus, 1766) **– Erete vânăt – Лунь полевой**
13. ***Circus pygargus*** (Linnaeus, 1758) – **Erete-sur** – **Лунь луговой**
14. ***Haliaeetus albicilla*** (Linnaeus, 1758) **– Codalb – Орлан-белохвост**
15. ***Hieraaetus pennatus*** (Gmelin, 1788) **– Acvilă pitică – Орел-карлик**
16. ***Milvus migrans*** (Boddaert, 1783) **– Gaie neagră – Коршун черный**
17. ***Pernis apivorus*** (Linnaeus, 1758) **– Viespar – Осоед**

Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) **– Uliu-cu-picioare-scurte – Тювик европейский**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**

Статус: вид, находящийся в критическом состоянии – **CR.**
Состояние охраны: включен в Красные книги: Приднестровья (категория **DD**), Украины (”**Зникаючий**”); списки Бернской и Боннской Конвенций, Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: Балканы, Малая Азия, юг Восточной Европы, западный Казахстан, Закавказье, Иран. ***Распространение в Республике Молдова:*** пойменные леса Нижнего Днестра. ***На территории сайта*** указывается гнездование в комплексе ”Рэскэець-Олэнешть”. Упоминается о встречах вида зимой в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”. Охотится по опушкам лесов, на степных и луговых участках. Питается ящерицами, крупными насекомыми, мелкими птицами и грызунами.








Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) **– Uliu porumbar – Ястреб-тетеревятник**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**

Статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **V**) и включен в Операционный Список; включен в списки Бернской и Боннской Конвенций.
Общий ареал: лесные и горные территории Евразии и Северной Америки. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** с различной регулярностью гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Кицкань”. Во время миграций и зимой может быть встречен в пределах всех участков. Охотится в различных биотопах. Питается в основном птицами.








Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) **– Uliu păsărar – Ястреб-перепелятник**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**

Статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **V**) şi включен в Операционный Список; включен в списки Бернской и Боннской Конвенций.
Общий ареал: умеренная и субтропическая зоны Евразии. ***Рспространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** указывается гнездование в комлексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”. Во время миграций и зимой встречается в пределах всех участков. Охотится в различных биотопах. Питается в основном мелкими птицами.








Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) – **Acvilă de-munte** – **Беркут**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**

Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), в Красную книгу Приднестровья, как уязвимый вид (категория **VU**), Операционный список, в списки Бернской и Боннской конвенций.
Общий ареал: Евразия, Америка и Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** политопный вид. Встречается редко и нерегулярно во время миграции. ***На территории сайта*** встречается только во время миграции в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.







Aquila clanga (Pallas, 1811) – **Acvilă ţipătoare mare** – **Подорлик большой**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**


Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), в Красную книгу Приднестровья как угрожаемый вид (категория **EN**), Операционный Список, в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний**”), в списки Бернской и Боннской конвенций, Красный список МСОП (категория **VU**).



Общий ареал: лесостепная зона Восточной Европы, достигая Северного Китая. ***Распространение в Республике Молдова:*** очень редко во время миграции. ***На территории сайта*** встречается очень редко в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Чиобурчиу-Рэскэець” и ”Дикуль-Куца-Мацаринский” – только во время миграции.






Aquila pomarina (C.L. Brehm, 1831) – **Acvilă ţipătoare mică** – **Подорлик малый**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**



Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), Операционный Список, Боннскую и Бернскую Конвенции, Приложение I Директивы об охране птиц.
Общий ареал: Восточная Европа, Кавказ, Малая и Центральная Азия, частично в Индии. ***Распространение в Республике Молдова:*** обитает в лесах Центральной зоны, в пойменных лесах, очень редок. ***На территории сайта*** встречается не часто (в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”) и только во время миграции.





Buteo buteo (Linnaeus, 1758) **– Șorecar comun – Канюк**

Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**




Статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**) и включен в Операционный Список и в списки Бернской и Боннской Конвенций.

Общий ареал: Север Евразии и Северной Америки. ***Распространение в Республике Молдова:*** с ноября по март - все районы. ***На территории сайта*** гнездится в комлексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”. Во время миграций и зимой встречается в пределах всех участков. Охотится на полях, залежах, лугах и степных участках, по опушкам лесов. Питается в основном мышевидными грызунами.






Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) **– Șorecar încălțat – Зимняк**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**

Статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**) и включен в Операционный Список и в списки Бернской и Боннской Конвенций.
Общий ареал*:** север Евразии и Северной Америки. ***Распространение в Республике Молдова: с ноября по март – все районы. ***На территории сайта*** зимой и во время миграций встречается в пределах всех комплексов. Охотится на полях, залежах, лугах и степных участках, по опушкам лесов. Питается в основном мышевидными грызунами и птицами.







Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) **– Șorecar roșu – Курганник**

Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**


Статус: уязвимый вид – **VU.**

Состояние охраны: включен в Красные книги: Приднестровья (категория **VU**), Украины (”**Рідкісний”**); списки Бернской и Боннской Конвенций, Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Общий ареал*:** Европа и Северная Азия, кроме зоны тундры, Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова*:** гнездится в Резинском районе; во время миграций и зимой южные районы. ***На территории сайта во время миграций и зимой наблюдался в комплексе ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Охотится на лугах, залежах, полях, по опушкам лесов и среди кустарников. Питается в основном мышевидными грызунами, птицами и др.










Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) – **Şerpar** – **Змееяд**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**

Статус: вид критически угрожаемый – **CR**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **EN**), Операционный Список, в списки Боннской и Бернской Конвенций.
Общий ареал: юг Западной Европы, Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** встречается в долинах Днестра и Прута во время миграции. ***На территории сайта*** встречается очень редко, только в комплексе ”Чиобурчиу-Рэскэець”.







Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) **– Erete de-stuf – Лунь болотный**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**


Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Операционный Список, в списки Бернской и Боннской конвенций, Европейской директивы по охране птиц.



Общий ареал: умеренная полоса Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций и кормовых перемещений дополнительно регистрировался в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”. Охотится на водоемах, лугах, залежах и полях. Питается в основном околоводными позвоночными животными: птицами, мелкими млекопитающими (мышевидные грызуны, ондатра и др.), лягушками и др.





Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) **– Erete vânăt – Лунь полевой**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**




Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **III**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **NE**), в Красную книгу Украины (категория **Рідкісний**), в списки Бернской и Боннской конвенций, Европейской директивы по охране птиц.

Общий ареал: Европа и Северная Азия, кроме зоны тундры, Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций все районы, зимой – южные районы. ***На территории сайта*** во время миграций и зимой может быть встречен в пределах всех комплексов. Охотится на лугах, залежах, полях, вдоль опушек лесов. Питается в основном мышевидными грызунами, мелкими птицами и др.






Circus pygargus (Linnaeus, 1758) **– Erete sur – Лунь луговой**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**

Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Операционный Список, Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), Красную книгу Украины (категория "**Вразливий**"), списки Бернской и Боннской конвенций.
Общий ареал: Центральная и Южная Европа, северо-запад Африки, юг Сибири, достигая до Енисея, Малая и Средняя Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** обнаружен в пойме Днестра и на юге страны. ***На территории сайта*** встречается спорадически во время миграции, в комплексах "Талмазские плавни", "Рэскэець-Олэнешть", "Пуркарь", "Долина Олэнешть-Крокмаз", "Крокмаз-Тудора", "Тудора-Паланка", "Дикуль-Куца-Мацаринский".








Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) **– Codalb – Орлан-белохвост**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Операционный Список, Красную книгу Республики Молдова, Красную книгу Приднестровья и в Красную книгу Украины, в списки Боннской конвенции.
Общий ареал: обитает по всей северной и умеренной зоне Евразии, от южных тундр до Турции, Ирана, Восточного Китая, а также на юге Гренландии. ***Распространение в Республике Молдова:*** встречается по всей территории у крупных богатых рыбой водоемов во все время года. ***На территории сайта*** во время миграции и на охоте встречается в комплексах ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут” и ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.






Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) **– Acvilă pitică – Орел-карлик**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**



Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), Операционный Список, в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний**”), в списки Бернской и Боннской конвенций. Директива об охране птиц.
Общий ареал: юг Европы, северо-запад Африки, Центральная Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** в лесах, преимущественно вдоль крутых берегов рек, в частности Днестра. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Кицкань”, стабильно гнездился в лесах комплекса ”Чиобурчиу-Рэскэець”.





Milvus migrans (Boddaert, 1783) **– Gaie neagră – Коршун черный**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**

Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**


Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **V**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), Красную книгу Украины (категория **Вразливий**), в списки Бернской и Боннской конвенций, Европейской директивы по охране птиц.



Общий ареал: Европа, Азия, кроме северных частей тайги и тундры, Африка, острова Индо-Австралийского архипелага, Австралия. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесная и лесостепная зоны, пойменные леса степной зоны. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-СтынкакТалмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.

Во время миграций и кормовых перемещений встречается в пределах всех комплексов. Охотится вдоль водоемов, на влажных лугах и заболоченных участках, среди полей. Питается амфибиями и рептилиями, рыбой, падалью, мелкими млекопитающими, птицами, крупными насекомыми.






Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) **– Viespar – Осоед**
Семейство **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**



Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **III**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **EN**), в списки Бернской и Боннской конвенций, Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: Европа, Кавказ и Закавказье, Малая Азия, Иран, Западная Сибирь. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные районы. ***На территории сайта*** гнездится в комплексе ”Кицкань”. Во время миграций встречается в пределах всех комплексов. Осоеды могут совершать перелеты как в одиночку, так и стаями до нескольких десятков особей. Охотится в лесах, среди кустарников, вдоль дамб и в др. местах. Питается в основном перепончатокрылыми насекомыми: осами, шершнями, шмелями, их сотами с личинками и медом; иногда поедает жуков, бабочек, кузнечиков, ящериц, лягушек, мышей и др.





Семейство **Aegithalidae** Reichenbach, 1850 **– Aegitalid*e* –**
Длиннохвостые синицы

1. ***Aegithalos caudatus*** (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi codat – Синица длиннохвостая**


Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi codat – Синица длиннохвостая**
Семейство **Aegithalidae** Reichenbach, 1850 **– Aegitalide – Длиннохвостые синицы**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VII**), включен в Операционный Список.

Общий ареал: ареал разобщен – Евразия от Атлантики до Тихоокеанского побережья. ***Распространение в Республике Молдова:*** пойменные леса вдоль Днестра и Прута, лесные биотопы преимущественно центральных и северных районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций и зимой встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными.





Семейство **Alaudidae** Vigors, 1825 **– Alaudide – Жаворонковые**

1. ***Alauda arvensis*** (Linnaeus, 1758) **– Ciocârlie de-câmp – Жаворонок полевой**
2. ***Lullula arborea*** (Linnaeus, 1758) **– Ciocârlie de-pădure – Жаворонок лесной**

Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) **– Ciocârlie de-câmp – Жаворонок полевой**

Семейство **Alaudidae** Vigors, 1825 **– Alaudide – Жаворонковые**


Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова меры не предприняты. Включен в список Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Общий ареал: Евразия и Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Попяска”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными и семенами растений.








Lullula arborea (Linnaeus, 1758) **– Ciocârlie de pădure – Жаворонок лесной**
Семейство **Alaudidae** Vigors, 1825 **– Alaudidee – Жаворонковые**

Статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC.**
Состояние охраны: в Республике Молдова вид не охраняется. Включен в список Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: Европа и Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** древесно-кустарниковые местообитания всех районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Кицкань”. Во время миграций встречается в пределах всех комплексов. Питается беспозвоночными и семенами растений.







Семейство **Alcedinidae** Rafinesque, 1815 **– Alcedinide – Зимородковые**


1**. *Alcedo atthis*** (Linnaeus, 1758) **– Pescăraș albastru – Зимородок**

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) **– Pescăraș albastru – Зимородок**
Семейство **Alcedinidae** Rafinesque, 1815 **– Alcedinide – Зимородковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **V**), включен в Операционный Список, списки Бернской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: южные и умеренные широты Евразии, Северная Африка, Новая Гвинея, Индонезия, Новая Зеландия. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в обрывистых берегах Днестра, Турунчука и других водоемов, в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается мелкой рыбой.







Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**

1. ***Anas acuta*** (Linnaeus, 1758) **– Rață sulițar – Шилохвость**
2. ***Anas clypeata*** (Linnaeus, 1758) **– Rață lingurar – Широконоска**
3. ***Anas crecca*** (Linnaeus, 1758) **– Rață mică – Чирок-свистунок**
4. ***Anas penelope*** (Linnaeus, 1758) **– Rață fluierătoare – Свиязь**
5. ***Anas plathyrhynchos*** (Linnaeus, 1758) **– Rață mare – Кряква**
6. ***Anas querquedula*** (Linnaeus, 1758) **– Rață cârâitoare – Чирок-трескунок**
7. ***Anas strepera*** (Linnaeus, 1758) **– Rață pestriță – Утка серая**
8. ***Anser albifrons*** (Scopoli, 1769) **– Gârliță mare – Казарка белолобая**
9. ***Anser anser*** (Linnaeus, 1758) **– Gâscă de-vară – Гусь серый**
10. ***Anser erythropus*** (Linnaeus, 1758) **– Gârliţă mică – Пискулька**
11. ***Anser fabalis*** (Lath, 1787) **– Gâscă de-semănătură – Гуменник**
12. ***Aythya ferina*** (Linnaeus, 1758) **– Rață-cu-cap-castaniu – Нырок красноголовый**
13. ***Aythya fuligula*** (Linnaeus, 1758) **– Rață moțată – Чернеть хохлатая**
14. ***Aythya marila*** (Linnaeus, 1761) **– Rață-cu-cap-negru – Чернеть морская**
15. ***Aythya nyroca*** (Guldenstadt, 1770) **– Rață roșie – Нырок белоглазый**
16. ***Bucephala clangula*** (Linnaeus, 1758) **– Rață sunătoare – Гоголь**
17. ***Cygnus cygnus*** (Linnaeus, 1758) **– Lebădă de-iarnă – Лебедь-кликун**
18. ***Cygnus olor*** (Gmelin, 1789) **– Lebădă de-vară – Лебедь-шипун**
19. ***Rufibrenta ruficollis*** (Pallas, 1769) **– Gâscă-cu-gât-roșu – Казарка краснозобая**
20. ***Tadorna ferruginea*** (Pallas, 1764) **– Călifar roșu – Огарь**
21. ***Tadorna tadorna*** (Linnaeus, 1758) **– Călifar alb – Пеганка**

Anas acuta (Linnaeus, 1758) **– Rață sulițar – Шилохвость**
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Общий ареал: гнездится на разнообразных внутренних водоемах Евразии и Северной Америки. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций и зимой встречается на различных крупных водоемах. ***На территории сайта*** встречается в комплексе ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций может наблюдаться во многих комплексах, имеющих крупные озера или примыкающих к Днестру и Турунчуку. Питается водными беспозвоночными, а также зелеными частями и семенами различных растений.






Anas clypeata (Linnaeus, 1758) **– Rață lingurar – Широконоска**
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: широко распространен в умеренном поясе Евразии и на западе Северной Америки от южных тундр и лесотундр до лесостепи и степной зоны. ***Распространение в Республике Молдова:*** встречается в небольшом числе в плавнях низовий Прута и Днестра. ***На территории сайта*** наблюдался во всех комплексах в период кочевок и миграций, за исключением ”Попяска” и ”Заозерное-Нукарь”. Питается почти исключительно животным кормом – водными членистоногими и их личинками, брюхоногими моллюсками.







Anas crecca (Linnaeus, 1758) **– Rață mică – Чирок-свистунок**

Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC.**

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц.


Общий ареал: гнездовой ареал охватывает умеренный пояс Евразии от южных тундр до лесостепи. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций встречается по мелководьям многих естественных и искусственных водоемов. ***На территории сайта*** во время миграции встречается в комплексах ”Талмазские плавни” и ”Тудора-Паланка”.








Anas penelope Linnaeus, 1758 **– Rață fluierătoare – Свиязь**
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: на гнездовании широко распространен в Евразии, большая часть птиц гнездится в тундре, лесотундре и северной тайге ***Распространение в Республике Молдова:*** немногочисленный, но регулярно мигрирующий вид. На отдых и кормежку останавливается на мелководных, заболоченных водоемах. ***На территории сайта*** во время миграций и зимой встречается в комплексах ”Талмазские плавни” и ”Грэдина Турчаскэ”.






Anas plathyrhynchos (Linnaeus, 1758) – Rață mare – Кряква
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 – **Anatide – Утиные**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц.

Общий ареал: широко распространен в северном полушарии. Гнездится как в арктических широтах к северу до 70° северной широты, так и в теплом субтропическом климате, к югу до 35° северной широты в Северной Африке и до 20° северной широты на Ближнем Востоке. ***Распространение в Республике Молдова:*** один из наиболее распространенных видов, на гнездовании обычный вид, на пролете – многочисленный. Обитает на всех водоемах с участками высшей надводной растительности, предпочитая стоячие и малопроточные озера и пруды. ***На территории сайта*** во время миграций, кормежек и на гнездовании наблюдается во всех комплексах.






Anas querquedula Linnaeus, 1758 **– Rață cârâitoare – Чирок-трескунок**
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: гнездится в лесной и степной зонах Евразии, на севере - до лесотундры. Наиболее многочислен в южной части ареала. ***Распространение в Республике Молдова:*** на гнездовании и в период миграции обычный вид. Встречается на крупных мелководных водоёмах с открытыми луговыми берегами. ***На территории сайта*** во время миграций, кормежек и на гнездовании наблюдается во всех комплексах с подходящими водоемами, кроме ”Попяска” и ”Заозерное-Нукарь”.





Anas strepera (Linnaeus, 1758) **– Rață pestriță – Утка серая**
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**

Состояние охраны: включен в Красные книги: Приднестровья (категория **VU**) и Украины (категория **Рідкісний**), списки Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Общий ареал: Северные и умеренные широты Евразии и Северной Америки. ***Распространение в Республике Молдова:*** различные водоемы вблизи Прута и Днестра. ***На территории сайта*** указывается на гнездовании в комплексах ”Пуркарь” и ”Крокмаз-Тудора”. Во время миграций может наблюдаться во многих комплексах, имеющих озера или примыкающих к Днестру. Питается зелеными частями и семенами различных растений (в основном водных).






Anser albifrons (Scopoli, 1769) **– Gârliță mare – Казарка белолобая**
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в Боннскую Конвенцию, списки Европейской директивы по охране птиц..
Общий ареал: ареал циркумполярный, охватывает полосу тундр и лесотундр Евразии и Северной Америки. В европейской части ареала на запад доходит до полуострова Канин. ***Распространение в Республике Молдова:*** по всей территории, во время осенних и весенних миграций. ***На территории сайта*** в период миграций, стаями в несколько десятков особей в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.






Anser anser (Linnaeus, 1758) **– Gâscă de-vară – Гусь серый**
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**

Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в Боннскую Конвенцию, списки Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: Евразия от субтропиков, южных степей и водоёмов до юга таёжной зоны. ***Распространение в Республике Молдова:*** встречается в основном в южных районах. Редок, как на гнездовании, так и во время кочевок. Гнездится на мелких водоемах с обширными тростниковыми зарослями. ***На территории сайта*** встречается во время миграций в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, на гнездовании в комплексе ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.









Anser erythropus (Linnaeus, 1758) **– Gârliţă mică – Пискулька**
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**

Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
Состояние охраны: включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”), Красный список МСОП (категория **VU**), в списки Бернской и Боннской конвенций, в Приложение I Директивы об охране птиц.
Общий ареал: Палеарктика, зона тундры и лесотундры. ***Распространение в Республике Молдова:*** юге страны, во время миграций. ***На территории сайта*** встречается крайне редко и только на пролете, в комплексах ”Крокмаз-Тудора” и ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.








Anser fabalis (Lath, 1787) **– Gâscă de-semănătură – Гуменник**
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**

Охранный статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской и Боннской конвенций, в Европейскую директиву по охране птиц.

Общий ареал: обитатель низменной тундры, лесотундры и таежной зоны. ***Распространение в Республике Молдова:*** встречается чаще на юге страны, во время миграций. ***На территории сайта*** наблюдается в период лета гусей, достаточно редко и в транзитной форме в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.







Aythya ferina (Linnaeus, 1758) **– Rață-cu-cap-castaniu– Нырок красноголовый**

Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в Красный список МСОП, как уязвимый вид (категория **VU**), в списки Европейской директивы по охране птиц.

Общий ареал: широко распространен во внетропической Евразии. Более многочислен на водоемах степной, лесостепной и южной части лесной зон.

Распространение в Республике Молдова: гнездится в плавнях Прута и реже Днестра, на кочках и тростниковых сплавинах. В постгнездовой период встречается на медленно текущих и стоячих водоемах – старицах, зарастающих озерах и рыборазводных прудах, в небольшом количестве зимует на незамерзающих участках водоемов. ***На территории сайта*** встречается на заросших мелких водоемах, в глухих местах. Питается преимущественно семенами и сочными частями водных растений.






Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) **– Rață moțată – Чернеть хохлатая**

Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: умеренный пояс Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций и зимой обитает на крупных водоемах (реки Днестр, Прут, Кучурганское водохранилище и др.). ***На территории сайта*** во время миграций и зимой встречается на Днестре в зоне комплексов, примыкающих к этой реке. Питается в основном водными беспозвоночными и мелкой рыбой.






Aythya marila (Linnaeus, 1761) **– Rață-cu-cap-negru – Чернеть морская**
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatidee – Утиные**

Статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC.**
Состояние охраны: в Республике Молдова вид не охраняется. Включен в список Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общее распространение*:** Север Евразии и Северной Америки. ***Распространение в Республике Молдова*:** во время миграций изредка встречается на крупных водоемах (Днестр, Кучурганское водохранилище). ***На территории сайта во время миграций наблюдалась в комплексе ”Дикуль-Куца-Мацаринский”, возможны встречи на Днестре в зоне комплексов, примыкающих к этой реке. Питается в основном водными беспозвоночными и растениями.







Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) **– Rață roșie – Нырок белоглазый**

Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**


Охранный статус: угрожаемый вид – **EN.**

Состояние охраны: включен в Красный список МСОП как вид, находящийся в состоянии близком к угрожаемому (категория **NT**), внесен в Красные книги Молдовы, Украины и Приднестровья.

Общий ареал: на гнездовании распространен в Палеарктике – от Марокко и Пиренейского полуострова до подножий Алтая и верховьев р. Хуанхэ. ***Распространение в Республике Молдова:*** встречается в местах где сохранились естественные озерно-болотные угодья. Встречается в плавневых биотопах, в низовьях Прута и Днестра. ***На территории сайта*** во время миграций встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя” и ”Талмазские плавни”.







Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) **– Rață sunătoare – Гоголь**

Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**

Состояние охраны: включен в Красные книги Приднестровья (категория **VU**) и Украины (категория ”**Рідкісний”**), списки Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Общий ареал: лесная зона Северной Америки и Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций и зимой встречается на крупных водоемах (реки Днестр, Прут, Кучурганское водохранилище и др.). ***На территории сайта*** во время миграций и зимой встречается на Днестре в зоне комплексов, примыкающих к этой реке. Питается водными беспозвоночными и мелкой рыбой.





Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) **– Lebădă de-iarnă – Лебедь-кликун**

Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**


Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Операционный Список, в Красную книгу Республики Молдова, Красную книгу Приднестровья (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория "**Рідкісний"**), списки Европейской директивы по охране птиц.

Общий ареал: Северная Азия, Европа (выше 55° северной широты). Зиму проводит преимущественно на берегах Атлантики, Балтийского и Чёрного морей. Ограниченное число представителей этого вида мигрирует и зимует в Италии. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время зимних миграций редко встречается на крупных водоемах (реки Днестр, Прут, на Кучурганском водохранилище и др.), иногда в стаях лебедя шипуна. ***На территории сайта*** во время миграций и зимой единичные особи и небольшие группы встречаются на Днестре в зоне комплексов, примыкающих к этой реке. Питается водными беспозвоночными и мелкой рыбой.








Cygnus olor (Gmelin, 1789) **– Lebădă de-vară – Лебедь-шипун**
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Операционный Список, Красную книгу Приднестровья (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний”**), списки Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: лесная зона Северной Америки и Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** на гнездовании встречается на крупных водоемах (реки Днестр, Прут, Кучурганское водохранилище и др.), во время миграций и зимой образует большие скопления в несколько десятков особей. ***На территории сайта*** во время миграций и зимой встречается на Днестре в комплексах, расположенных в долине реки. Питается в основном растительной пищей, водными растениями, а также поедает мелких беспозвоночных.





Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) **– Gâscă-cu-gât-roșu – Казарка краснозобая**

Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **V**), включен в Красный Список МСОП, как уязвимый вид (категория **VU**), в Красные книги Республики Молдова (категория **VU**), Приднестровья (категория **VU**), Украины (категория ”**Вразливий”**), списки Бернской конвенции, Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Общий ареал: тундра и лесотундра Западной Сибири. Зимует в Прикаспии и Причерноморье. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций и зимой встречается в южных районах. ***На территории сайта*** во время миграций и зимой может наблюдаться в пролете над всеми комплексами. Встречен в комплексе ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”. Кормится растительной пищей, в основном на полях озимых культур.






Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) **– Călifar roșu – Огарь**
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Операционный Список и Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), включен Красную книгу Украины, списки Бернской и Боннской конвенций.

Общий ареал: до недавнего времени был обитателем исключительно открытых мелководных водоемов южных степей и полупустынь от Болгарии до Маньчжурии. В последние десятилетия, ареал огаря существенно продвинулся на север. ***Распространение в Республике Молдова:*** ранее редко встречался в Гагаузии и в районе высоких глиняных обрывов у сел Копанка, Леунтя. ***На территории сайта*** встречается в комплексе ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.






Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) – **Călifar alb** – **Пеганка**
Семейство **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**

Охранный статус: уязвимый вид **– VU**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **V**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), Операционный Список, списки Бернской конвенции.

Общий ареал: морские побережья и прибрежные водоемы севера Европы. ***Распространение в Республике Молдова:*** юг страны, во время миграций. ***На территории сайта*** встречается редко (комплексы ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка” и ”Дикуль-Куца-Мацаринский”), обычно в полете, на миграциях.







Семейство **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**


1. ***Ardea alba*** (Linnaeus, 1758) **– Egretă mare – Цапля белая большая**
2. ***Ardea purpurea*** (Linnaeus, 1766) **– Stârc roşu – Цапля рыжая**
3. ***Ardeola ralloides*** (Scopoli, 1769) **– Stârc galben – Цапля желтая**
4. ***Botaurus stellaris*** (Linnaeus, 1758) **– Buhai de-baltă – Выпь большая**
5. ***Egretta garzetta*** (Linnaeus, 1766) **– Egretă mică – Цапля малая белая**
6. ***Nycticorax nycticorax*** (Linnaeus, 1758) **– Stârc de-noapte – Кваква**

Ardea alba (Linnaeus, 1758) – **Egretă mare** – **Цапля белая большая**
Семейство **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**

Охранный статус: уязвимый вид – **EN**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **EN**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), Операционный Список, в списки Бернской и Боннской конвенций, в Приложение I Директивы об охране птиц.
Общий ареал: космополитный вид из китайского фаунистического типа. В Европе ареал прерывистый. Распространен в умеренной тропической зоне. ***Распространение в Республике Молдова:*** встречается на многих водоемах. Гнездится обычно в зарослях, реже – на деревьях, в группах или колониях, изолированно от других видов цапель. Чаще встречается в поймах крупных рек. ***На территории сайта*** обычный вид, встречается на кормежке во многих водно-болотных комплексах. На гнездовании не был отмечен.








Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) – **Stârc roşu** – **Цапля рыжая**
Семейство **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова как уязвимый вид (категория **VU**), в Операционный Список, списки Бернской и Боннской конвенций, в Приложение I Директивы об охране птиц.
Общий ареал: Европа, на восток – до Центральной Азии, Дальнего Востока, Индии, Китая, на востоке Африки. ***Распространение в Республике Молдова:*** гнездится на всей территории, с большей плотностью в плавнях Днестра и Прута, других больших водоемов. Численность и распространение очень нестабильны. ***На территории сайта*** встречается на многих водоемах, например, в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский” и др.






Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) – **Stârc galben** – **Цапля желтая**
Семейство **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**



Охранный статус: угрожаемый вид – **EN**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **EN**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), Операционный Список. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний**”) и в списки Бернской конвенции, в Приложение I Директивы об охране птиц.

Общий ареал: распространен на юго-востоке Европы, Закавказье, в Малой и Центральной Азии, Северной Африке. ***Распространение в Республике Молдова:*** юг страны. Гнездится на водоемах низовий Днестра и Прута. Численность на Днестре более низкая и нестабильная. ***На территории сайта*** встречается довольно редко, в качестве гостя на пролете, с большей вероятностью в южных комплексах, таких как ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский” и др.





Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) **– Buhai de-baltă – Выпь большая**

Семейство **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**




Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова, как уязвимый вид (категория **VU**), Красную книгу Приднестровья, Операционный Список, в списки Бернской и Боннской конвенций, в Приложение I Директивы об охране птиц.



Общий ареал: в некоторых биотопах Европы. ***Распространение в Республике Молдова:*** встречается местами, во влажных зонах на всей территории. Предпочитает пойменные водоемы, с небольшой глубиной и богатой водной растительностью. ***На территории сайта*** встречается редко. Гнездится в комлексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дубовый кут”, ”Саги-Казачешть”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.




Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) **– Egretă mică – Цапля малая белая**
Семейство **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции**.**

Общий ареал: широко распространен в Восточном полушарии, заселяет южную часть Центральной Европы, Северную и Центральную Африку, Юго-Восточную Азию, Австралию. ***Распространение в Республике Молдова:*** плавни низовий Прута и Днестра, но в поисках пищи посещает и другие водоемы. ***На территории сайта*** в теплый период года встречается регулярно на всех участках на временных мелководных водоемах, обычно в смешанных стаях с другими цаплями. Питается в основном мелкими водными и околоводными животными: рыбой, земноводными, пресмыкающимися, ракообразными, насекомыми и их личинками.








Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) **– Stârc de-noapte – Кваква**

Семейство **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Внесен в списки Бернской конвенции**.**
Общий ареал: гнездовой ареал охватывает тропики и юг умеренной зоны Земного шара. ***Распространение в Республике Молдова:*** пойменные леса рек Прут и Днестр. ***На территории сайта*** встречается регулярно. Как в период гнездования, так и в период кочевок и миграций встречается во всех комплексах.





Семейство **Caprimulgidae** Vigors, 1825 **– Caprimulgide** – **Козодоевые**


1. ***Caprimulgus europaeus*** (Linnaeus, 1758) **– Caprimulg– Козодой**

Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) **– Caprimulg – Козодой**
Семейство **Caprimulgidae** Vigors, 1825 **– Caprimulgide – Козодоевые**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VII**), включен в Операционный Список и в списки Бернской и Боннской конвенции.
Общий ареал: гнездовой ареал охватывает север Африки и Евразию от Западной Европы до Забайкалья и Центрального Китая. ***Распространение в Республике Молдова:*** молодые дубовые леса с отдельными старыми деревьями и с хорошо развитым подлеском. ***На территории сайта*** встречается на гнездовании, во время кормления и на миграции в большинстве комплексов, кроме ”Попяска”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Кицкань”. Питается в основном ночными летающими насекомыми.





Семейство **Certhiidae** Leach, 1820 **– Certiide – Пищуховые**


1. ***Certhia familiaris*** (Linnaeus, 1758) **– Cojoaică de-pădure – Пищуха**

Certhia familiaris (Linnaeus, 1758) **– Cojoaică de-pădure – Пищуха**
Семейство **Certhiidae** Leach, 1820 **– Certiide – Пищуховые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в список Бернской конвенции.
Общий ареал: умеренная зона Европы, Азии и Северной Америки. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы преимущественно северных и центральных районов, а также пойменные леса. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”. Во время миграций и зимой встречается также в комплексах ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными.






Семейство **Charadriidae** (Vigors, 1825) **– Charadriide** – **Ржанковые**

1. ***Charadrius dubius*** (Scopoli, 1786) **– Prundăraș gulerat mic – Малый зуек**
2. ***Vanellus vanellus*** (Linnaeus, 1758) **– Nagâț – Чибис**

Charadrius dubius (Scopoli, 1786) **– Prundăraș gulerat mic – Малый зуек**
Семейство **Charadriidae** (Vigors, 1825) **– Charadriide** – **Ржанковые**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Боннской и Бернской Конвенции.
Общий ареал: гнездовой ареал охватывает большую часть Евразии и север Африки. ***Распространение в Республике Молдова:*** встречается на юге страны во время миграций. ***На территории сайта*** во время миграций встречается в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.






Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) **– Nagâț – Чибис**
Семейство **Charadriidae** (Vigors, 1825) **– Charadriide** – **Ржанковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в Красный список МСОП как вид, находящийся в состоянии близком к угрожаемому (категория **NT**), списки Боннской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: Европа, Азия, зимует на побережье Средиземного моря и в Закавказье. ***Распространение в Республике Молдова:*** спорадично по всей территории в бассейнах рек, на заливных пойменных лугах. ***На территории сайта*** встречается на гнездовании и в период миграций в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.







Семейство **Ciconiidae** Gray, 1840 **– Ciconiide – Аистовые**

1. ***Ciconia ciconia*** (Linnaeus, 1758) **– Barză albă – Аист белый**

2. ***Ciconia nigra*** (Linnaeus, 1758) **– Barză neagră – Аист черный**


Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) **– Barză albă – Аист белый**
Семейство **Ciconiidae** Gray, 1840 **– Ciconiide – Аистовые**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Красную книгу Республики Молдова, как уязвимый вид (категория **VU**), Операционный Список, в списки Бернской и Боннской конвенций. Директива об охране птиц, Приложение I.

Общий ареал: Европа, Северная Африка, Азия, Дальний Восток, Япония. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в пределах всех населенных пунктов и встречается во всех комплексах сайта, кроме комплексов ”Попяска” и ”Пуркарь”. Встречается близ населенных пунктов, расположенных у различных внутренних водоемов, в долине Днестра и на влажных лугах. Адаптирован к проживанию в сельской местности, гнездясь на столбах линий электропередач.





Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) **– Barză neagră – Аист черный**
Семейство **Ciconiidae** Gray, 1840 **– Ciconiide – Аистовые**


Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), Операционный Список. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний**”), в списки Бернской и Боннской конвенций, в Приложение I Директивы об охране птиц.

Общий ареал: от Атлантического до Тихого океана в Палеарктической зоне между 30 и 60 град.с.ш.. ***Распространение в Республике Молдова:*** встречается редко, чаще на миграции, гнездится спорадически в лесах центра и юга страны, а также вдоль крупных рек. Предпочитает густые леса, близ заболоченных участков и подальше от населенных пунктов. ***На территории сайта*** встречается редко, в комплексах поймы Днестра. На гнездовании отмечен только в лесах комплексов ”Талмазские плавни”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский” и ”Кицкань”.







Семейство **Columbidae** (Illiger, 1811) **– Columbide – Голубиные**


1. ***Columba oenas*** (Linnaeus. 1758) **– Porumbel de-scorbură – Клинтух**
2. ***Columba palumbus*** (Linnaeus, 1758) **– Porumbel gulerat – Вяхирь**
3. ***Streptopelia decaocto*** (Frivaldszky, 1838) **– Guguștiuc – Горлица кольчатая**
4. ***Streptopelia turtur*** (Linnaeus, 1758) **– Turturică – Горлица обыкновенная**

Columba oenas (Linnaeus. 1758) – **Porumbel de-scorbură** – **Клинтух**
Семейство **Columbidae** (Illiger, 1811) **– Columbide – Голубиные**

Охранный статус: критически угрожаемый вид **– CR**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **EN**), Операционный Список, списки Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: смешанные и лиственные леса Европы, Иран, Ирак, Малая Азия, юг Западной Сибири, Западный Китай, Северо-западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** ранее гнездился, сейчас встречается лишь на миграциях. ***На территории сайта*** мигрирующий вид. Встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.








Columba palumbus (Linnaeus, 1758) **– Porumbel gulerat – Вяхирь**
Семейство **Columbidae** (Illiger, 1811) **– Columbide – Голубиные**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный Список, в списки Бернской конвенции и Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: умеренные широты Европы и Западной Сибири, северо-западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится и наблюдается во время миграций в пределах почти всех комплексов. Иногда встречается в зимний период. Населяет леса различных типов и древесные насаждения. Питается семенами и зелеными частями растений.





Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) **– Guguștiuc – Горлица кольчатая**

Семейство **Columbidae** (Illiger, 1811) **– Columbide – Голубиные**


Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц.

Общий ареал: Европа, Центральная Азия, Индия, север Китая. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в населенных пунктах, примыкающих к природным комплексам. Во время кормовых посещений регистрировался в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра” (гнездится), ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается семенами и зелеными частями растений.








Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) **– Turturică – Горлица обыкновенная**
Семейство **Columbidae** (Illiger, 1811) **– Columbide – Голубиные**

Охранный статус: близкий к уязвимому – **NT.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в Красный список МСОП, как уязвимый вид (категория **VU**) и списки Боннской конвенции.
Общий ареал: Европа, Центральная Азия и Казахстан, Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** вся территория. ***На территории сайта*** в настоящее время является обычным, широко распространенным видом. Гнездится и встречается во время миграций в пределах всех комплексов. Населяет опушки лесов, лесополосы и отдельные группы деревьев, граничащие с полями. Питается семенами и зелеными частями растений.







Семейство **Coraciidae** Vigors, 1825 **– Coraciide – Сизоворонковые**


1. ***Coracias garrulus*** (Linnaeus, 1758) **– Dumbrăveancă – Сизоворонка**

Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) **– Dumbrăveancă – Сизоворонка**
Семейство **Coraciidae** Vigors, 1825 **– Coraciide – Сизоворонковые**

Статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный Список, в Красные книги: Республики Молдова (категория **VU**), Приднестровья (категория **VU**), Украины (категория ”**Зникаючий”**); списки Бернской и Боннской Конвенций, Европейской директивы по охране птиц.
Общее распространение*:** лесостепная и степная зоны Европы, Юго-Западная Азия и Северо-Западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова*:** южные районы. ***На территории сайта с различной регулярностью гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Кицкань”. Во время миграций может быть встречена в пределах всех комплексов. Питается крупными насекомыми, ящерицами и др.







Семейство **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**


1. ***Corvus corax*** (Linnaeus, 1758) **– Corb – Ворон**
2. ***Corvus cornix*** (Linnaeus, 1758) **– Cioară grivă – Ворона серая**
3. ***Corvus frugilegus*** (Linnaeus, 1758) **– Cioară de-semănătură – Грач**
4. ***Corvus monedula*** (Linnaeus, 1758) **– Stăncuță – Галка**
5. ***Garrulus glandarius*** (Linnaeus, 1758) **– Gaiță – Сойка**
6. ***Pica pica*** (Linnaeus, 1758) **– Coțofană – Сорока**

Corvus corax (Linnaeus, 1758) **– Corb – Ворон**
Семейство **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**

Статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC.**
Состояние охраны: в Республике Молдова находится под охраной государства (категория **VIII**); входит в Операционный список Национальной Экологической Сети.
Общий ареал*:** большая часть Евразии, Северная Африка, Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова*:** круглогодично все районы. ***На территории сайта гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, “Туфа-Стынка Талмаза”, “Талмазские плавни”, “Чиобурчиу-Рэскэець”, “Рэскэець-Олэнешть”, “Пуркарь”, “Ымпэрэтяса”, “Крокмаз-Тудора”, “Кицкань”, “Саги-Казачешть”, “Дубовый кут”, “Дикуль-Куца-Мацаринский”. В осенне-зимнее время встречается во всех комплексах. Питается разнообразной пищей животного и растительного происхождения.








Corvus cornix (Linnaeus, 1758) **– Cioară grivă – Ворона серая**
Семейство **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**

Статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC.**
Состояние охраны: в Республике Молдова вид не охраняется. Включен в списки Бернской Конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: Центральная, Северная и Восточная Европа, Западная Сибирь и Передняя Азия. ***Распространение в Республике Молдова*:** круглогодично все районы. ***На территории сайта*** гнездится и встречается во время миграций и зимой во всех комплексах. Питается разнообразной пищей животного и растительного происхождения.








Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) **– Cioară de-semănătură – Грач**
Семейство **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**



Статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC.**
Состояние охраны:в Республике Молдова вид не охраняется. Включен в списки Бернской Конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: большая часть Евразии. ***Распространение в Республике Молдова*:** круглогодично все районы. ***На территории сайта*** кормится и встречается во время миграций и зимой во всех комплексах. Питается разнообразной пищей растительного и животного происхождения.






Corvus monedula (Linnaeus, 1758) **– Stăncuță – Галка**
Семейство **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**




Статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC.**
Состояние охраны: в Республике Молдова вид не охраняется. Включен в списки Бернской Конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: Западная Евразия и Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** круглогодично все районы. ***На территории сайта*** указывается гнездование в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”. Во время миграций и зимой встречается также в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”. Питается различной пищей животного и растительного происхождения.






Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) **– Gaiță – Сойка**
Семейство **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: Европа, Северо-Западная Африка, Малая Азия, Сибирь, восток Китая, Юго-Восточная Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут". Во время миграций и зимой встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными, плодами растений и др.






Pica pica (Linnaeus, 1758) **– Coțofană – Сорока**
Семейство **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: большая часть Евразии, Северо-Западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** круглогодично все районы. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций и зимой встречается во всех комплексах. Питается различной пищей животного и растительного происхождения.






Семейство **Emberizidae** Vigors, 1831 **– Emberizid*e* – Овсянковые**


1. ***Emberiza citrinella*** (Linnaeus, 1758) **– Presură galbenă – Овсянка обыкновенная**
2. ***Emberiza hortulana*** Linnaeus, 1758 **– Presură de-grădini – Овсянка садовая**
3. ***Emberiza schoeniclus*** (Linnaeus, 1758) **– Presură de-stuf – Овсянка камышовая**

Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) **– Presură galbenă – Овсянка обыкновенная**
Семейство **Emberizidae** Vigors, 1831 **– Emberizid*e* – Овсянковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: умеренные и северные широты Евразии - от Атлантики до Байкала. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы.
На территории сайта гнездится и встречается во время миграций и зимой во всех комплексах. Питается семенами растений и беспозвоночными.







Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 **– Presură de-grădini – Овсянка садовая**
Семейство **Emberizidae** Vigors, 1831 **– Emberizide – Овсянковые**


Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: Евразия. Европейский ареал разорван в центральных и западных частях. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы.

На территории сайта гнездится в комплеках ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Попяска”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтеяса”. Питается беспозвоночными и семенами растений.








Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) **– Presură de-stuf – Овсянка камышовая**
Семейство **Emberizidae** Vigors, 1831 **– Emberizide – Овсянковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа и Западная Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** водно-болотные угодья всех районов.
На территории сайта гнездится в комплеках ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Встречается также зимой. Питается беспозвоночными и семенами растений.





Семейство **Falconidae** Vigors, 1824 **– Falconide – Соколиные**

1. ***Falco cherrug*** Gray, 1834 – **Şoim dunărean** – **Балобан**
2. ***Falco peregrinus*** (Tunstal, 1771) – **Şoim călător** – **Сапсан**
3. ***Falco subbuteo*** (Linnaeus, 1758) **– Șoimul rândunelelor – Чеглок**
4. ***Falco tinnunculus*** (Linnaeus, 1758) **– Vânturel roșu – Пустельга обыкновенная**
5. ***Falco vespertinus*** (Linnaeus, 1766) **– Vânturel de-seară – Кобчик**

Falco cherrug Gray, 1834 – **Şoim dunărean** – **Балобан**
Семейство **Falconidae** Vigors, 1824 **– Falconide – Соколиные**





Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), Операционный Список, в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”), в списки Бернской и Боннской конвенций, в Красный список МСОП (категория **EN**), Приложение I Директивы об охране птиц.

Общий ареал: Центральная и Восточная Европа, Кавказ, Западная Сибирь, Центральная и Юго-Восточная Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** редкая на гнездовании птица. Питается мелкими млекопитающими, птицами, предпочитая сусликов. Занимает гнезда других видов птиц на деревьях и опорах линий электропередач.

На территории сайта залетная и мигрирующая птица. Встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.






Falco peregrinus (Tunstal, 1771) – **Şoim călător** – **Сапсан**
Семейство **Falconidae** Vigors, 1824 **– Falconide – Соколиные**



Охранный статус: критически угрожаемый вид **– CR**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **V**), включен в Красную Книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную Книгу Приднестровья, как уязвимый вид (категория **VU**), Операционный Список, в списки Бернской и Боннской конвенций.
Общий ареал: избегает субтропические влажные леса, Евразийские и Южноамериканские и степи. ***Распространение в Республике Молдова:*** умеренно редкая мигрирующая вдоль лесов и русел рек птица. Преимущественно охотится на птиц, в том числе и водно-болотных. ***На территории сайта*** мигрирующая птица, отмечена по всей территории, кроме комплексов ”Попяска” и ”Заозерное-Нукарь”.






Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) **– Șoimul rândunelelor – Чеглок**
Семейство **Falconidae** Vigors, 1824 **– Falconide – Соколиные**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VII**), включен в Операционный Список, списки Бернской и Боннской конвенций.
Общий ареал: Евразия и Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** с различной регулярностью гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций встречается в пределах всех участков. Охотится в различных биотопах. Питается в основном крупными насекомыми и мелкими птицами.







Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) **– Vânturel roșu – Пустельга обыкновенная**
Семейство **Falconidae** Vigors, 1824 **– Falconidee – Соколиные**

Статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC.**


Состояние охраны: в Республике Молдова находится под охраной государства (категория **VIII**) и включен в Операционный Список, включен в списки Бернской и Боннской Конвенций.

Общий ареал: Евразия за исключением северных областей, Африка. ***Распространение в Республике Молдова*:** все районы. ***На территории сайта*** с различной регулярностью гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, “Грэдина Турчаскэ”, “Туфа-Стынка Талмаза”, “Талмазские плавни”, “Заозерное-Нукарь”, “Чиобурчиу-Рэскэець”, “Рэскэец-Олэнешть”, “Пуркарь”, “Ымпэрэтяса”, “Крокмаз-Тудора”, “Кицкань”, “Дубовый кут”, “Дикуль-Куца-Мацаринский”.










Во время миграций встречается в пределах всех участков. Охотится в полях, на степных и луговых участках, опушках лесов. Питается мышевидными грызунами, крупными насекомыми, ящерицами и др.

Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) **– Vânturel de-seară – Кобчик**
Семейство **Falconidae** Vigors, 1824 **– Falconide – Соколиные**




Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**) и Операционный Список, в Красный список МСОП, как вид, находящийся в состоянии близком к угрожаемому (категория **NT**), в списки Бернской и Боннской конвенций, Европейской директивы по охране птиц.

Общий ареал: степная и лесостепная зоны Восточной Европы, Сибири и Казахстана. ***Распространение в Республике Молдова:*** преимущественно южные районы. ***На территории сайта*** с различной регулярностью гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”. Во время миграций встречается в пределах всего сайта. Охотится на полях, степных и луговых участках, опушках лесов. Питается в основном насекомыми.







Семейство **Fringillidae** Leach, 1820 **– Fringilide – Вьюрковые**


1. ***Acanthis cannabina*** (Linnaeus, 1758) **– Cânepar – Коноплянка**
2. ***Carduelis carduelis*** (Linnaeus, 1758) **– Sticlete – Щегол**
3. ***Chloris chloris*** (Linnaeus, 1758) **– Florinte – Зеленушка**
4. ***Coccothraustes coccothraustes*** (Linnaeus, 1758) **– Botgros – Дубонос**
5. ***Spinus spinus*** (Linnaeus, 1758) **– Scatiu – Чиж**

Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) **– Cânepar – Коноплянка**
Семейство **Fringillidae** Leach, 1820 **– Fringilide – Вьюрковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, Северная Африка, Малая, Передняя и Центральная Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в комлексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Попяска”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”. Во время миграций и зимой встречается во всех комплексах. Питается семенами растений.








Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) **– Sticlete – Щегол**
Семейство **Fringillidae** Leach, 1820 **– Fringilide – Вьюрковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, Северная Африка, Передняя Азия и Западная Сибирь. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится, а также встречается во время миграций и зимой во всех комплексах. Питается семенами растений.








Chloris chloris (Linnaeus, 1758) **– Florinte – Зеленушка**
Семейство **Fringillidae** Leach, 1820 **– Fringilide – Вьюрковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, Северо-Западная Африка, Малая и Центральная Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится, а также встречается во время миграций и зимой во всех комплексах. Питается семенами растений.








Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) **– Botgros – Дубонос**
Семейство **Fringillidae** Leach, 1820 **– Fringilide – Вьюрковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Евразия и Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций и зимой встречается во всех комплексах. Питается семенами растений.








Spinus spinus (Linnaeus, 1758) **– Scatiu – Чиж**
Семейство **Fringillidae** Leach, 1820 **– Fringilide – Вьюрковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: лесная зона Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций и зимой все районы. ***На территории сайта*** встречается во время миграций и зимой во всех комплексах. Питается семенами растений.







Семейство **Gaviidae** Forster, 1788 **– Gaviide – Гагары**

1. ***Gavia arctica*** (Linnaeus, 1758) **– Cufundar polar – Гагара чернозобая**

Gavia arctica (Linnaeus, 1758) **– Cufundar polar – Гагара чернозобая**

Семейство **Gaviidae** Forster, 1788 **– Gaviide – Гагары**




Охранный статус: близкий к уязвимому – **NT.**

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской и Боннской конвенций.

Общий ареал: преимущественно северные широты Евразии и Северной Америки. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграции и зимой встречается на крупных водоемах (реки Днестр, Прут, Кучурганское водохранилище и др.). ***На территории сайта*** во время миграций, а иногда и зимой, изредка встречается на Днестре в зоне комплексов, примыкающих к этой реке. Питается рыбой, водными беспозвоночными.





Семейство **Hirundinidae** Vigors, 1825 **– Hirundinide – Ласточковые**


1. ***Delichon urbica*** (Linnaeus, 1758) **– Lăstun de-casă – Ласточка городская**
2. ***Hirundo rustica*** (Linnaeus, 1758) **– Rândunică – Ласточка деревенская**
3. ***Riparia riparia*** (Linnaeus, 1758) **– Lăstun de-mal – Ласточка береговая**

Delichon urbica (Linnaeus, 1758) **– Lăstun de-casă – Ласточка городская**
Семейство **Hirundinidae** Vigors, 1825 **– Hirundinide – Ласточковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: большая часть Евразии, северо-запад Африки. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в населенных пунктах, примыкающих к природным комплексам. Кормится и встречается во время миграций в воздушном пространстве всех комплексов. Питается насекомыми.








Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) **– Rândunică – Ласточка деревенская**
Семейство **Hirundinidae** Vigors, 1825 **– Hirundinide – Ласточковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: большая часть Евразии и Северной Америки, северо-запад Африки. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в населенных пунктах, примыкающих к природным комплексам. Кормится и встречается во время миграций в воздушном пространстве всех комплексов. Питается насекомыми







Riparia riparia (Linnaeus, 1758) **– Lăstun de-mal – Ласточка береговая**
Семейство **Hirundinidae** Vigors, 1825 **– Hirundinide – Ласточковые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный Список и списки Бернской конвенции.

Общий ареал: Евразия и Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы.

На территории сайта гнездится в береговых обрывах Днестра и Турунчука, в комплексах ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций и кормовых перемещений встречается во всех комплексах. Питается насекомыми.





Семейство **Laniidae** Rafinesque, 1815 **– Laniide – Сорокопутовые**


1. ***Lanius collurio*** (Linnaeus, 1758) **– Sfrânciоc roșiatic – Жулан**
2. ***Lanius excubitor*** (Linnaeus, 1758) **– Sfrânciоc mare – Сорокопут серый**
3. ***Lanius minor*** (Gmelin, 1788) **– Sfrânciоc-cu-fruntea-neagră – Сорокопут чернолобый**

Lanius collurio (Linnaeus, 1758) **– Sfrâncioc roșiatic – Жулан**
Семейство **Laniidae** Rafinesque, 1815 **– Laniide – Сорокопутовые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: Европа и Западная Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** кустарниковые местообитания всех районов. ***На территории сайта*** гнездится и встречается во время миграций во всех комплексах. Питается беспозвоночными, ящерицами и др.






Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) **– Sfrâncioc mare – Сорокопут серый**
Семейство **Laniidae** Rafinesque, 1815 **– Laniide – Сорокопутовые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в Красную книгу Украины (категория **Рідкісний**) и списки Бернской конвенции.



Общий ареал: северные части Евразии и Северной Америки. ***Распространение в Республике Молдова:*** зимой встречается во всех районах. ***На территории сайта*** зимой и во время миграций регистрировался в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Попяска”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается мышевидными грызунами, мелкими птицами и др.






Lanius minor (Gmelin, 1788) **– Sfrâncioc-cu-fruntea-neagră – Сорокопут чернолобый**
Семейство **Laniidae** Rafinesque, 1815 **– Laniide – Сорокопутовые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: Южная и Восточная Европа, Азия - к востоку до Омска и Западного Алтая. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесополосы, опушки лесов преимущественно центральных и южных районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”. Питается беспозвоночными.





Семейство **Laridae** Vigors, 1825 **– Laride – Чайковые**


1. ***Larus cachinnans*** Pallas, 1811 **– Pescăruș pontic – Чайка-хохотунья**
2. ***Larus canus*** (Linnaeus, 1758) **– Pescăruș sur – Сизая чайка**
3. ***Larus ridibundus*** (Linnaeus, 1766) **– Pescăruș râzător – Озерная чайка**

Larus cachinnans Pallas, 1811 **– Pescăruș pontic – Чайка-хохотунья**
Семейство **Laridae** Vigors, 1825 **– Laride – Чайковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: от средиземноморского побережья Пиренейского полуострова к востоку до низовьев Керулена и оз. Далайнор. К северу до северных побережий Средиземного, Черного, Азовского, Каспийского морей и низовьев впадающих в них рек. К югу до южного побережья Средиземного моря, Малой Азии, оз. Севан, южного побережья Каспийского моря, озер Иссык-Куль и Лобнор. ***Распространение в Республике Молдова:*** распространена по всей территории, на крупных водоемах. ***На территории сайта*** регулярно встречается на кормлении на водоемах в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается в основном мелкой рыбой.






Larus canus (Linnaeus, 1758) **– Pescăruș sur – Чайка сизая**
Семейство **Laridae** Vigors, 1825 **– Laride – Чайковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: гнездовой ареал охватывает территорию от Исландии до Камчатки. ***Распространение в Республике Молдова:*** придерживается преимущественно крупных водоемов – больших прудов, озер, водохранилищ. ***На территории сайта*** встречается на кормлении на водоемах в комплексах ”Дубовый кут”, ”Саги-Казачешть” и ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.








Larus ridibundus (Linnaeus, 1766) **– Pescăruș râzător – Чайка озерная**
Семейство **Laridae** Vigors, 1825 **– Laride – Чайковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: по всему Евразийскому континенту, от Исландии и Британских островов вплоть до Камчатки и Приморского края России. ***Распространение в Республике Молдова:*** распространена повсеместно – обычный, местами многочисленный вид, чаще встречается на водохранилищах и рыборазводных прудах, регулярно зимует на незамерзающем участке Кучурганского водохранилища. ***На территории сайта*** встречается на кормлении на водоемах комплексов ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается в основном мелкой рыбой.





Семейство **Meropidae** Rafinesque, 1815 **– Meropide – Щурковые**


1. ***Merops apiaster*** Linnaeus, 1758 **– Prigorie – Щурка золотистая**

Merops apiaster Linnaeus, 1758 **– Prigorie – Щурка золотистая**
Семейство **Meropidae** Rafinesque, 1815 **– Meropide – Щурковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской и Боннской конвенций.
Общий ареал: Европа, Западная Азия, Северо-Западная и Южная Африка.
Распространение в Республике Молдова: все районы.
На территории сайта гнездится в комплексе ”Туфа-Стынка Талмаза”. Во время миграций и кормовых перемещений встречается во всех комплексах. Питается летающими насекомыми.






Семейство **Motacillidae** Horsfield, 1821 **– Motacilide – Трясогузковые**


1. ***Anthus campestris*** (Linnaeus. 1758) **– Fâsă de-câmp – Конек полевой**
2. ***Anthus pratensis*** (Linnaeus. 1758) **– Fâsă de-luncă – Конек луговой**
3. ***Anthus trivialis*** (Linnaeus, 1758) **– Fâsă de-pădure – Конек лесной**
4. ***Motacilla alba*** (Linnaeus, 1758) **– Codobatură albă – Трясогузка белая**
5. ***Motacilla flava*** (Linnaeus, 1758) **– Codobatură galbenă – Трясогузка желтая**

Anthus campestris (Linnaeus. 1758) – **Fâsă de-câmp** – **Конек полевой**
Семейство **Motacillidae** Horsfield, 1821 **– Motacilide – Трясогузковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской и Боннской конвенций.
Общий ареал: центральные и южные регионы Европы, Малая Азия, Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** по всей территории, но в малом количестве ***На территории сайта*** встречается на гнездовании практически повсеместно.








Anthus pratensis (Linnaeus. 1758) – **Fâsă de-luncă** – **Конек луговой**
Семейство **Motacillidae** Horsfield, 1821 **– Motacilide – Трясогузковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в Красный список МСОП, как вид, находящийся в состоянии близком к угрожаемому (категория **NT**), охраняется Бернской конвенцией.

Общий ареал: центральные и южные регионы Европы, Малая Азия, Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** долины рек Прут, Днестр, Реут и других рек, но крайне редко. ***На территории сайта*** встречается на гнездовании спорадично в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”.






Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) **– Fâsă de-pădure – Конек лесной**
Семейство **Motacillidae** Horsfield, 1821 **– Motacilide – Трясогузковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, Северная и Центральная Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** древесно-кустарниковые местообитания всех районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Кицкань”. Во время миграций встречается в пределах всех комплексов. Питается беспозвоночными и семенами растений.








Motacilla alba (Linnaeus, 1758) **– Codobatură albă – Трясогузка белая**
Семейство **Motacillidae** Horsfield, 1821 **– Motacilide – Трясогузковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: большая часть Евразии, север Африки, Аляска. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными и семенами растений.






Motacilla flava (Linnaeus, 1758) **– Codobatură galbenă – Трясогузка желтая**
Семейство **Motacillidae** Horsfield, 1821 **– Motacilide – Трясогузковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, север Африки, в Азии – от Турции до Северного Китая. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Попяска”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными.







Семейство **Muscicapidae** Vigors, 1825 **– Muscicapide – Мухоловковые**

1. ***Ficedula albicollis*** (Temminck, 1815) **– Muscar gulerat – Мухоловка-белошейка**
2. ***Ficedula hypoleuca*** (Pallas, 1764) **– Muscar negru – Мухоловка-пеструшка**
3. ***Ficedula parva*** (Bechstein, 1794) **– Muscar mic – Мухоловка малая**
4. ***Muscicapa striata*** (Pallas, 1764) **– Muscar sur – Мухоловка серая**

Ficedula albicollis (Temminck, 1815) **– Muscar gulerat – Мухоловка-белошейка**
Семейство **Muscicapidae** Vigors, 1825 **– Muscicapide – Мухоловковые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Общий ареал: Европа и Северная Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** пойменные дубравы Днестра и Прута, лесные биотопы преимущественно центральных и северных районов.

На территории сайта гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными, плодами и семенами растений.







Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) – **Muscar negru** – **Мухоловка-пеструшка**
Семейство **Muscicapidae** Vigors, 1825 **– Muscicapide – Мухоловковые**

Охранный статус: уязвимый вид **– VU**.
Состояние охраны: включен в Красную книгу Республики Молдова как уязвимый вид (категория **VU**), списки Бернской конвенции.
Общий ареал: леса Европы, Западной Сибири и Северной Африки. ***Распространение в Республике Молдова:*** на всей территории, где есть негустые леса. Начиная с 90-х годов, численность вида снизилась. ***На территории сайта*** в последний период встречается только на миграции в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Кицкань”, ”Дубовый кут”, ”Саги-Казачешть”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.







Ficedula parva (Bechstein, 1794) **– Muscar mic – Мухоловка малая**
Семейство **Muscicapidae** Vigors, 1825 **– Muscicapide – Мухоловковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.


Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Общий ареал: Европа и почти во всей северной половине Азии. Изолированные очаги обитания отмечены на Кавказе и в Крыму.

Распространение в Республике Молдова: дубравы северных районов.

На территории сайта встречается во время миграций во всех комплексах. Питается беспозвоночными и плодами растений.






Muscicapa striata (Pallas, 1764) **– Muscar sur – Мухоловка серая**
Семейство **Muscicapidae** Vigors, 1825 **– Muscicapide – Мухоловковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Евразия – от Атлантического побережья до Забайкалья, Северо-Западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы и населенные пункты всех районов. ***На территории сайта*** гнездится и встречается во время миграций во всех комплексах. Питается насекомыми и плодами растений.





Семейство **Oriolidae** (Vigors, 1825) **– Oriolide – Иволговые**

1. ***Oriolus oriolus*** (Linnaeus, 1758) **– Grangur – Иволга**


Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) **– Grangur – Иволга**
Семейство **Oriolidae** (Vigors, 1825) **– Oriolide – Иволговые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.

Общий ареал: умеренная зона Европы и Азии, к востоку – до Енисея. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится, а также встречается во время миграций во всех комплексах. Питается беспозвоночными и плодами растений.







Семейство **Pandionidae** (Bonoparte, 1854) **– Pandionide – Скопиные**


1. ***Pandion haliaetus*** (Linnaeus, 1758) **– Uligan pescar – Скопа**

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) **– Uligan pescar – Скопа**
Семейство **Pandionidae** (Bonoparte, 1854) **– Pandionide – Скопиные**



Охранный статус: угрожаемый вид – **EN.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Операционный Список, Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), в Красную книгу Украины (категория ”**Зникаючий”**), в списки Бернской и Боннской конвенций и Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: космополит, во всем мире, кроме Антарктиды. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграции все районы. ***На территории сайта*** встречается во время миграции в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский". Охотится на водоемах. Питается рыбой.





Семейство **Panuridae** Des Murs, 1860 **– Panuride – Усатые синицы**

1. ***Panurus biarmicus*** (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi de-stuf – Синица усатая**

Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi de-stuf – Синица усатая**
Семейство **Panuridae** Des Murs, 1860 **– Panuride – Усатые синицы**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VII**), включен в Операционный Список и списки Бернской конвенции.

Общий ареал: Евразия – от Испании к востоку до бассейна Сунгари. ***Распространение в Республике Молдова:*** водно-болотные угодья всех районов.

На территории сайта гнездится в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Встречается также зимой. Питается беспозвоночными и семенами растений.





Семейство **Paridae** Vigors, 1825 **– Paride – Синицевые**


1. ***Parus caeruleus*** (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi albastru – Лазоревка**
2. ***Parus major*** (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi mare – Синица большая**

Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi albastru – Лазоревка**
Семейство **Paridae** Vigors, 1825 **– Paride – Синицевые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, Западная Азия и Северо-Западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится, а также встречается во время миграций и зимой во всех комплексах. Питается беспозвоночными и семенами растений.






Parus major (Linnaeus, 1758) **– Pițigoi mare – Синица большая**
Семейство **Paridae** Vigors, 1825 **– Paride – Синицевые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, Ближний Восток, Центральная и Северная Азия, Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится, а также встречается во время миграций и зимой во всех комплексах. Питается беспозвоночными и семенами растений.





Семейство **Pelecanidae** Rafinesque, 1815 **– Pelecanide – Пеликановые**

1. ***Pelecanus onocrotalus*** (Linnaeus, 1758) – **Pelican comun** – **Пеликан розовый**

Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758) – **Pelican comun** – **Пеликан розовый**
Семейство **Pelecanidae** Rafinesque, 1815 **– Pelecanidae – Пеликановые**


Охранный статус: угрожаемый вид – **EN**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **EN**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), Операционный Список. Включен в Красную книгу Украины (категория ”**Зникаючий**”), в списки Бернской и Боннской конвенций, Приложение I Директивы об охране птиц.



Общий ареал: гнездится на юго-востоке Европы, на северо-востоке Африки и в Азии. ***Распространение в Республике Молдова:*** на юге страны, в поймах Днестра и Прута и других больших водоемах, богатых рыбой, прилетая на постгнездовое питание и миграции. ***На территории сайта*** в больших стаях может быть встречен на пролете везде, но чаще – в южной части, в комплексах ”ЫмпэрэтЯса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.





Семейство **Phalacrocorocidae** Reichenbach, 1849 **– Falacrocorocide – Баклановые**

1. ***Phalacrocorax pygmaeus*** (Pallas, 1773) **– Cormoran mic – Баклан малый**

Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773) – **Cormoran mic** – **Баклан малый**
Семейство **Phalacrocorocidae** Reichenbach, 1849 **– Falacrocorocide – Баклановые**


Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR**.



Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**) и в Красную книгу Украины (категория ”**Зникаючий**”), Приложение I Директивы об охране птиц.

Общий ареал: Европа. ***Распространение в Республике Молдова:*** вид с южным типом ареала, поэтому распространен только на небольшом участке на юге страны. Гнездится в пойме ”рута и очень редко – в низовьях Днестра. Этот вид чаще приурочен к рыбоводческим хозяйствам. ***На территории сайта*** встречается очень редко, в качестве гостя в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Раньше гнездился на водоемах комплекса ”Талмазские плавни” в смешанных колониях с большим бакланом и цаплями на берегах озера Адана.







Семейство **Phasianidae** Horsfield, 1821 **– Fasianide – Фазановые**


1. ***Coturnix coturnix*** (Linnaeus, 1758) **– Prepeliță – Перепел**
2. ***Perdix perdix*** (Linnaeus, 1758) **– Potârniche – Куропатка серая**
3. ***Phasianus colchicus*** (Linnaeus, 1758) – **Fazan – Фазан**

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) **– Prepeliță – Перепел**
Семейство **Phasianidae** Horsfield, 1821 **– Fasianide – Фазановые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Боннской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: Европа, Азия (до Байкала), Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится на лугах и степных участках в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается растительной пищей и беспозвоночными.







Perdix perdix (Linnaeus, 1758) **– Potârniche – Куропатка серая**
Семейство **Phasianidae** Horsfield, 1821 **– Fasianide – Фазановые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: Европа, Малая Азия, Казахстан и юг Западной Сибири. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** малочисленный, но широко распространенный вид.

Гнездится на лугах, степных и рудеральных участках, среди кустарников и по опушкам лесов во всех комплексах. Зимуют куропатки в тех же биотопах или на полях зерновых культур. Питается растительной пищей и беспозвоночными.








Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) – **Fazan – Фазан**
Семейство **Phasianidae** Horsfield, 1821 **– Fasianide – Фазановые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный Список и списки Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: интродуцирован во многие районы Европы. Исходный ареал: субтропики и тропики Азии, от Турции до Кореи. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится и зимует в различных биотопах во всех комплексах. Питается в основном растительной пищей и беспозвоночными





Семейство **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**


1. ***Dendrocopos major*** (Linnaeus, 1758) **– Ciocănitoare pestriță mare – Дятел большой пестрый**
2. ***Dendrocopos medius*** (Linnaeus, 1758) **– Ciocănitoare de-stejar – Дятел пестрый средний**
3. ***Dendrocopos minor*** (Linnaeus, 1758) **– Ciocănitoare pestriță mică – Дятел малый пестрый**
4. ***Dendrocopos syriacus*** (Hemprich et Ehrenberg, 1833) **– Ciocănitoare de-grădini – Дятел сирийский**
5. ***Jynx torquilla*** (Linnaeus, 1758) **– Capântortură – Вертишейка**
6. ***Picus canus*** Gmelin, 1788 **– Ghionoaie sură – Дятел седой**

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) **– Ciocănitoare pestriță mare – Дятел большой пестрый**
Семейство **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: умеренные широты Евразии, Юго-Восточная Азия, Северо-Западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится, встречается во время миграций и зимой во всех комплексах. Питается беспозвоночными, семенами и плодами растений.






Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) – **Ciocănitoare de-stejar** – **Дятел пестрый средний**
Семейство **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**

Охранный статус: уязвимый вид **– VU**.
Состояние охраны: включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: центральные и южные регионы Европы, Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** Центральные Кодры, долины рек Днестр и Прут. ***На территории сайта*** редкий гнездящийся вид. Встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Кицкань”, ”Дубовый кут”, ”Саги-Казачешть”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.








Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) **– Ciocănitoare pestriță mică – Дятел малый пестрый**
Семейство **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: умеренные и северные широты Евразии, север Африки (Тунис).
Распространение в Республике Молдова: лесные биотопы всех районов.
На территории сайта гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Ымпэрэтяса”, ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций и зимой встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными, семенами и плодами растений.





Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 1833) **– Ciocănitoare de-grădini – Дятел сирийский**
Семейство **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.


Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции и Европейской директивы по охране птиц.

Общий ареал: Южная, Центральная и Восточная Европа, Передняя Азия, запад Ирана, Ирак. ***Распространение в Республике Молдова:*** населенные пункты, лесополосы и другие древесные местообитания всех районов. ***На территории сайта*** указывается на гнездовании в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Оседлый вид. Питается беспозвоночными, плодами и семенами растений.






Jynx torquilla (Linnaeus, 1758) **– Capântortură – Вертишейка**
Семейство **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: умеренные широты Евразии, Северо-Западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится в комлексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными.





Picus canus Gmelin, 1788 **– Ghionoaie sură – Дятел седой**
Семейство **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.

Общий ареал: умеренные широты Евразии, Юго-Восточная Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** пойменные леса Днестра и Прута, леса центральных и северных районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций и зимой встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными.







Семейство **Podicipedidae** Bonoparte, 1831 **– Podicipedide – Поганковые**


1. ***Podiceps ruficollis*** (Pallas, 1764) **– Corcodel mic – Поганка малая**

Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) **– Corcodel mic – Поганка малая**
Семейство **Podicipedidae** Bonoparte, 1831 **– Podicipedide – Поганковые**

Охранный статус: близкий к уязвимому – **NT.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VII**), включен в Операционный Список и списки Боннской конвенции.
Общий ареал: широко, но неравномерно распространен в Евразии, Африке, Австралии и Новой Гвинее. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций и зимой встречается на крупных водоемах (реки Днестр, Прут, Кучурганское водохранилище и др.). ***На территории сайта*** в зимний период и во время миграций встречается на Днестре в зоне комплексов, примыкающих к этой реке. Питается преимущественно водными беспозвоночными.








Семейство **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**


1. ***Crex crex*** (Linnaeus, 1758) **– Cristel de-câmp – Коростель**
2. ***Fulica atra*** (Linnaeus, 1758) **– Lișiță – Лысуха**
3. ***Gallinula chloropus*** (Linnaeus, 1758) **– Găinușă de-baltă – Камышница**
4. ***Porzana parva*** (Scopoli, 1769) **– Cresteţ cenuşiu – Погоныш малый**
5. ***Porzana porzana*** (Linnaeus, 1766) **– Cresteț pestriț – Погоныш обыкновенный**
6. ***Porzana pusilla*** (Pallas, 1776) **– Cresteţ mic – Погоныш крошка**
7. ***Rallus aquaticus*** (Linnaeus, 1758) **– Cârstel de-baltă – Пастушок**

Crex crex (Linnaeus, 1758) **– Cristel de-câmp – Коростель**
Семейство **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VII**), включен в Операционный Список, Красную книгу Республики Молдова (категория **EN**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), в списки Бернской и Боннской конвенций, Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: умеренные широты Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные районы. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций может быть встречен в пределах всех комплексов. Питается беспозвоночными и растительной пищей.







Fulica atra (Linnaeus, 1758) **– Lișiță – Лысуха**
Семейство **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Боннской конвенции и Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: Евразия, север Африки, Австралия. ***Распространение в Республике Молдова:*** обычный вид на территории всей страны, обитает на стоячих и медленно текущих водоемах богатых водной растительностью. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”, на кормлении в ”Чиобурчиу-Рэскэець”. Питается преимущественно растительной пищей.








Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) **– Găinușă de-baltă – Камышница**
Семейство **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова включен в Операционный Список. Включен в списки Боннской конвенции и Европейской директивы по охране птиц.

Общий ареал: ареал почти всесветный, включая тропики и умеренные широты. ***Распространение в Республике Молдова:*** заросшие тростником стоячие и медленнотекущие водоемы. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Пуркарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питание смешанное – зелёные части растений, семена, беспозвоночные.









Porzana parva (Scopoli, 1769) – **Cresteţ cenuşiu** – **Погоныш малый**
Семейство **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**

Охранный статус: уязвимый вид **– VU**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **III**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), в списки Бернской и Боннской конвенций.
Общий ареал: зона степей в Северной Африке, в Европе – до Каспийского моря и в Малой Азии. ***Распространение в Республике Молдова:*** спорадически встречается на всей территории. Заселяет заболоченные участки и водоемы. ***На территории сайта*** довольно редок в большинстве увлажненных участков (комплексы ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”).








Porzana porzana (Linnaeus, 1766) **– Cresteț pestriț – Погоныш обыкновенный**
Семейство **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Боннской конвенции.
Общий ареал: от Западной Европы до Байкала. ***Распространение в Республике Молдова:*** по всей территории обычен, но немногочисленен в сырых местах по берегам водоемов, однако почти никогда не встречается в тростниковых зарослях, предпочитая заросли осоки и других невысоких растений. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора” и ”Тудора-Паланка”.






Porzana pusilla (Pallas, 1776) **– Cresteţ mic – Погоныш крошка**
Семейство **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**

Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
Состояние охраны: включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), в списки Бернской и Боннской конвенций.
Общий ареал: Европа, Азия, Африка и Австралия. ***Распространение в Республике Молдова:*** спорадически на всей территории. Обитает на заболоченных участках и водоемах. ***На территории сайта*** довольно редок на увлажненных участках в комплексах ”Крокмаз-Тудора” и ”Тудора-Паланка”.








Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) **– Cârstel de-baltă** – **Пастушок**
Семейство **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**

Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц
Общий ареал: средние широты Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** на территории всей страны немногочислен или редок, встречается по берегам водоемов в тростниковых зарослях. ***На территории сайта*** гнездится в комлексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора” и ”Тудора-Паланка”.







Семейство **Recurvirostridae** (Bonoparte, 1854) **– Recurvirostride – Шилоклювковые**


1. ***Himantopus himantopus*** (Linnaeus, 1758) **– Piciorong – Ходулочник**

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) **– Piciorong – Ходулочник**
Семейство **Recurvirostridae** (Bonoparte, 1854) **– Recurvirostride – Шилоклювковые**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: включен в Красные книги Республики Молдова и Приднестровья (категория **VU**), охраняется Боннской конвенцией.
Общий ареал: заболоченные участки в тропических и умеренных широтах. ***Распространение в Республике Молдова:*** в южных районах встречается на обширных мелководьях водоемов естественного и искусственного происхождения. ***На территории сайта*** на гнездовании отмечен в комплексах ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”, во время миграций и на кормлении может встречаться во всех комплексах с подходящими условиями.





Семейство **Remizidae** Olphe-Galliard, 1891 **– Remizide – Ремезовые**


1. ***Remiz pendulinus*** (Linnaeus, 1758) **– Boicuș – Ремез**

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) **– Boicuș – Ремез**
Семейство **Remizidae** Olphe-Galliard, 1891 **– Remizide – Ремезовые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный Список.
Общий ареал: Евразия, Северо-Западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** водно-болотные угодья всех районов.
На территории сайта гнездится в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными и семенами растений.








Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**


1. ***Actitis hypoleucos*** (Linnaeus, 1758) **– Fluierar de-munte – Перевозчик**
2. ***Calidris alpina*** (Linnaeus, 1758) **– Fugaci-de-ţărm – Чернозобик**
3. ***Calidris ferruginea*** (Pontoppidan, 1763) **– Fugaci roşcat – Краснозобик**
4. ***Calidris minuta*** (Leisler, 1812) **– Fugaci mic – Кулик-воробей**
5. ***Gallinago gallinago*** (Linnaeus, 1758) **– Becațină comună – Бекас**
6. ***Limosa limosa*** (Linnaeus, 1758) **– Sitar de-mal – Веретенник большой**
7. ***Lymnocryptes minimus*** (Brunnich, 1764) **– Becațină mică – Гаршнеп**
8. ***Numenius arquata*** (Linnaeus, 1758) **– Culic mare – Кроншнеп большой**
9. ***Philomachus pugnax*** (Linnaeus, 1758) **– Bătăuș – Турухтан**
10. ***Scolopax rusticola*** (Linnaeus, 1758) **– Sitar de-pădure – Вальдшнеп**
11. ***Tringa erythropus*** (Pallas, 1764) **– Fluierar negru – Щеголь**
12. ***Tringa glareola*** (Linnaeus, 1758) **– Fluierar de-mlaștină – Фифи**
13. ***Tringa nebularia*** (Gunnerus, 1767) **– Fluierar-cu-picioare-verzi – Большой улит**
14. ***Tringa ochropus*** (Linnaeus, 1758) **– Fluierar de-zăvoi – Черныш**
15. ***Tringa stagnatilis*** (Bechstein, 1803) **– Fluierar de-lac – Поручейник**
16. ***Tringa totanus*** (Linnaeus, 1758) **– Fluierar-cu-picioare-roşii – Травник**

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) **– Fluierar de-munte – Перевозчик**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacidee – Бекасовые**



Статус: вид уязвимый – **VU**.
Состояние охраны: в Республике Молдова вид не охраняется. Включен в списки Боннской и Бернской Конвенции.
Общее распространение*:** область гнездования охватывает большую часть Евразии от южных тундр на севере до пустынь умеренной зоны на юге и от Атлантики до Тихого океана. ***Распространение в Республике Молдова*:** встречается по всей стране на берегах рек, озер и больших прудов, избегает болот. ***На территории сайта отмечен во время миграций в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, на гнездовании отмечен в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Ымпэрэтяса”.






Calidris alpina (Linnaeus, 1758) – **Fugaci de-ţărm** – **Чернозобик**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**

Охранный статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской и Боннской конвенций.

Общий ареал: обитатель низменной тундры. ***Распространение в Республике Молдова:*** изредка встречается на юге страны во время миграций. ***На территории сайта*** отмечен во время миграций в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.








Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) – **Fugaci roşcat** – **Краснозобик**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**

Охранный статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в Красный список МСОП, как вид, находящийся в состоянии близком к угрожаемому (категория **NT**), включен в списки Бернской и Боннской конвенций.
Общий ареал: обитатель сухой и заболоченной тундры. ***Распространение в Республике Молдова:*** изредка встречается на юге страны во время миграций. ***На территории сайта*** встречается редко во время миграций в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.








Calidris minuta (Leisler, 1812) – **Fugaci mic** – **Кулик-воробей**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**

Охранный статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской и Боннской конвенций.
Общий ареал: Европейская тундра. ***Распространение в Республике Молдова:*** изредка встречается на юге страны во время миграций. ***На территории сайта*** встречается редко во время миграций в комплексах ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.








Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) **– Becațină comună – Бекас**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Боннской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: умеренные и субтропические зоны Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций болотные участки во всех районах. ***На территории сайта*** зарегистрирован во время миграций в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными и семенами растений.








Limosa limosa (Linnaeus, 1758) **– Sitar de-mal – Веретенник большой**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**

Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: включен в Красный список МСОП как вид, находящийся в состоянии близком к угрожаемому (категория **NT**), в Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), списки Боннской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: умеренные широты Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций водно-болотные угодья, преимущественно в южных районах. ***На территории сайта*** встречается во время миграций в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Саги-Казачешть”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается в основном беспозвоночными.








Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) **– Becațină mică – Гаршнеп**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**


Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Боннской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: северные и умеренные широты Евразии – от Скандинавии до Восточной Сибири. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций на заболоченных участках во всех районах. ***На территории сайта*** встречается во время миграций в комплекса ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными и семенами растений.







Numenius arquata (Linnaeus, 1758) **– Culic mare – Кроншнеп большой**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: включен в Красный список МСОП, как вид, находящийся в состоянии близком к угрожаемому (категория **NT**), в Красные книги Приднестровья (категория **VU**) и Украины (категория ”**Зникаючий”**), списки Боннской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: северные и умеренные широты Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций водно-болотные угодья, преимущественно в южных районах. ***На территории сайта*** встречается во время миграций в комплексах ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными.





Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) **– Bătăuș – Турухтан**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**


Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Боннской конвенции и Европейской директивы по охране птиц.

Общий ареал: с африканских и западноевропейских зимовок летит гнездиться в лесостепь, лесную зону и тундру Европы и Сибири. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций водно-болотные угодья, преимущественно в южных районах. Держится на открытых илистых берегах водоёмов. ***На территории сайта*** во время миграций зарегистрирован почти во всех комплексах с подходящими условиями. Охотно формирует стаи, порой очень крупные.









Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) **– Sitar de-pădure – Вальдшнеп**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Боннской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: лесная и лесостепная зоны Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций лесные территории во всех районах. ***На территории сайта*** во время миграций может быть встречен в пределах всех комплексов. Иногда встречается зимой в пойменных лесах. Питается беспозвоночными и семенами растений.








Tringa erythropus (Pallas, 1764) – **Fluierar negru** – **Щеголь**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



Охранный статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Боннской конвенции и Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: тундра и лесотундра Европы. ***Распространение в Республике Молдова:*** изредка встречается на участках влажных зон во время миграций, одиночно, реже мелким группками. ***На территории сайта*** встречается редко во время миграций в комплексах ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.






Tringa glareola (Linnaeus, 1758) **– Fluierar de-mlaștină – Фифи**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской и Боннской конвенций, Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: гнездится в Евразии от Скандинавии и Дании до Анадыря и Камчатки. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций широкие прибрежные участки мелководий во всех районах. ***На территории сайта*** встречается во время миграций в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается в основном околоводными насекомыми и их личинками.








Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) **– Fluierar-cu-picioare-verzi – Улит большой**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Боннской конвенции и Европейской директивы по охране птиц.
Общий ареал: лесная зона Евразии – от Шотландии и Скандинавского полуострова до Камчатки и низовьев Амура. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций широкие участки мелководий водоемов во всех районах ***На территории сайта*** встречается во время миграций в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается в основном водными насекомыми.






Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) **– Fluierar de-zăvoi – Черныш**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской и Боннской конвенций.
Общий ареал: лесная зона Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций встречается повсеместно на берегах рек, ручьев и оросительных каналов, держится обычно парами и небольшими группами. ***На территории сайта*** зарегистрирован во время миграций и на кормежке в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Кормом служат наземные и водные насекомые и их личинки.








Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) – **Fluierar de-lac** – **Поручейник**
Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**

Охранный статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской и Боннской конвенций.
Общий ареал: заболоченные участки в долинах рек степной и лесостепной зон Европы. ***Распространение в Республике Молдова:*** иногда встречается на участках влажных зон речных долин во время миграций. ***На территории сайта*** встречается не часто во время миграций в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.







Tringa totanus (Linnaeus, 1758) – **Fluierar-cu-picioare-roşii** – **Травник**

Семейство **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**




Охранный статус: вид с дефицитом данных – **DD.**

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Боннской конвенции и Европейской директивы по охране птиц

Общий ареал: обитатель сырых лугов и травянистых болот от тайги до гор и пустынь Европы. ***Распространение в Республике Молдова:*** на гнездовании не отмечен. Обычен во влажных зонах во время миграций. ***На территории сайта*** достаточно обычный вид во время миграций в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.






Семейство **Sittidae** Lesson, 1828 **– Sitide – Поползни**


1. ***Sitta europaea*** (Linnaeus, 1758) **– Țiclean – Поползень**

Sitta europaea (Linnaeus, 1758) **– Țiclean – Поползень**
Семейство **Sittidae** Lesson, 1828 **– Sitide – Поползни**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, большая часть Азии, Северная Африка.
Распространение в Республике Молдова: лесные биотопы преимущественно северных и центральных районов, а также пойменные леса Нижнего Днестра.
На территории сайта гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”. Питается беспозвоночными и плодами растений.





Семейство **Sternidae** Bonoparte, 1838 **– Sternide – Крачковые**


1. ***Chlidonias hybridus*** (Pallas, 1811) **– Chirighiţă-cu-obraji-albi – Крачка белощекая**
2. ***Chlidonias niger*** (Linnaeus. 1758) **– Chirighiţă neagră – Крачка черная**
3. ***Sterna hirundo*** (Linnaeus, 1758) **– Chiră de-baltă – Крачка речная**

Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) **– Chirighiţă-cu-obraji-albi – Крачка белощекая**
Семейство **Sternidae** Bonoparte, 1838 **– Sternide – Крачковые**



Охранный статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: спорадично населяет пресные водоемы Южной и Центральной Европы. ***Распространение в Республике Молдова:*** гнездится на отдельных водоемах южных регионов страны. Несколько шире отмечается во время миграций. ***На территории сайта*** чаще регистрируется в качестве залетного в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.






Chlidonias niger (Linnaeus. 1758) – **Chirighiţă neagră** – **Крачка черная**
Семейство **Sternidae** Bonoparte, 1838 **– Sternide – Крачковые**

Охранный статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской и Боннской конвенций.
Общий ареал: пресные водоемы Восточной и спорадично – Западной Европы. ***Распространение в Республике Молдова:*** гнездится на водоемах южных регионов страны и в поймах речных долин. Несколько шире отмечается во время миграций. ***На территории сайта*** регистрируется как залетный (реже гнездится) в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.








Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) **– Chiră de-baltă – Крачка речная**

Семейство **Sternidae** Bonoparte, 1838 **– Sternide – Крачковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: гнездовой ареал охватывает большую часть Европы, Азии и Северной Америки, гнездится также на западном побережье Африки и в Карибском море. ***Распространение в Республике Молдова:*** обычный гнездящийся вид, характерный для всех озерно–плавневых угодий. ***На территории сайта*** регистрируется на миграции и кормлении в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.





Семейство **Strigidae** (Vigors, 1825) **– Strigide – Совиные**

1. ***Asio flammeus*** (Pontoppidan, 1763) **– Ciuf de-câmp – Сова болотная**
2. ***Asio otus*** (Linnaeus, 1758) **– Ciuf de-pădure – Сова ушастая**
3. ***Athene noctua*** (Scopoli, 1769) **– Cucuvea – Сыч домовый**
4. ***Otus scops*** (Linnaeus, 1758) **– Ciuf pitic – Сплюшка**
5. ***Strix aluco*** (Linnaeus, 1758) **– Huhurez de-pădure – Неясыть серая**

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) **– Ciuf de-câmp – Сова болотная**
Семейство **Strigidae** (Vigors, 1825) **– Strigide – Совиные**


Охранный статус: угрожаемый вид – **EN.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **III**), включен в Операционный Список, Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **EN**), в Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний”**), списки Бернской конвенции и Европейской директивы по охране птиц.



Общий ареал: северные и умеренные широты Евразии и Северной Америки, Южная Америка (Аргентина, Чили и др.). ***Распространение в Республике Молдова:*** чаще встречается во время миграций и зимой. ***На территории сайта*** встречается во время миграций и зимой в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается в основном мышевидными грызунами.






Asio otus (Linnaeus, 1758) **– Ciuf de-pădure – Сова ушастая**
Семейство **Strigidae** (Vigors, 1825) **– Strigide – Совиные**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VII**), включен в Операционный Список и списки Бернской конвенции.
Общий ареал: умеренные зоны Евразии и Северной Америки, Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. Зимой численность возрастает за счет особей, прилетевших из более северных регионов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Зимой встречается также и на других участках. Питается в основном мышевидными грызунами.






Athene noctua (Scopoli, 1769) **– Cucuvea – Сыч домовый**
Семейство **Strigidae** (Vigors, 1825) **– Strigide – Совиные**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный Список и списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, Азия (кроме севера), Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”. Оседлый вид. Питается в основном мышевидными грызунами.






Otus scops (Linnaeus, 1758) **– Ciuf pitic – Сплюшка**
Семейство **Strigidae** (Vigors, 1825) **– Strigide – Совиные**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Операционный Список, Красную книгу Приднестровья (категория **VU**) и Красную книгу Украины (категория ”**Рідкісний”**), в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, юг Сибири, Малая Азия, Ближний Восток и Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается крупными насекомыми.





Strix aluco (Linnaeus, 1758) **– Huhurez de-pădure – Неясыть серая**

Семейство **Strigidae** (Vigors, 1825) **– Strigide – Совиные**




Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный Список, Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), в списки Бернской конвенции.

Общий ареал: Европа, Западная Сибирь, Передняя и Центральная Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время кочевок и зимой может быть встречен в большинстве комплексов. Питается в основном мышевидными грызунами.





Семейство **Sturnidae** (Rafinesque, 1815) **– Sturnide – Скворцовые**

1. ***Sturnus vulgaris*** Linnaeus, 1758 **– Graur – Скворец обыкновенный**

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 **– Graur – Скворец обыкновенный**
Семейство **Sturnidae** (Rafinesque, 1815) **– Sturnide – Скворцовые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Общий ареал: Евразия – от Атлантики до Байкала, интродуцирован в Северную Америку, Южную Африку и Австралию. ***Распространение в Республике Молдова:*** один из самых многочисленных и широко распространенных в республике видов птиц, встречается повсеместно. ***На территории сайта*** гнездится и встречается во время миграций и зимой во всех комплексах. Питается беспозвоночными, плодами и семенами растений.





Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**

1. ***Acrocephalus arundinaceus*** (Linnaeus, 1758) **– Lăcar mare – Камышевка дроздовидная**
2. ***Acrocephalus palustris*** (Bechstein, 1798) **– Lăcar de-mlaştină – Камышевка болотная**
3. ***Acrocephalus schoenobaenus*** (Linnaeus, 1758) **– Lăcar mic – Камышевка-барсучок**
4. ***Acrocephalus scirpaceus*** (Hermann, 1804) **– Lăcar de-stuf – Камышевка тростниковая**
2. ***Hippolais icterina*** (Vieillot, 1817) **– Frunzăriță galbenă – Пересмешка зеленая**
3. ***Locustella fluviatilis*** **(**Wolf, 1810) **– Greluşel de-zăvoi – Сверчок речной**
4. ***Locustella luscinioides*** (Savi, 1824) **– Greluşel de-stuf – Сверчок соловьиный**
5. ***Locustella naevia*** **(**Boddaert, 1783) **– Greluşel pătat – Сверчок обыкновенный**
6. Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) **– Pitulice mică – Пеночка-теньковка**
7. Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) **– Pitulice sfârâitoare – Пеночка-трещотка**
8. Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) **– Pitulice fluierătoare – Пеночка-весничка**
9. ***Sylvia atricapilla*** (Linnaeus, 1758) **– Silvie-cu-cap-negru – Славка-черноголовка**
10. ***Sylvia borin*** (Boddaert, 1783) **– Silvie de-zăvoi – Славка садовая**
11. ***Sylvia communis*** (Latham, 1787) **– Silvie de-câmp – Славка серая**
12. ***Sylvia curruca*** (Linnaeus, 1758) **– Silvie mică – Славка-завирушка**
13. ***Sylvia nisoria*** (Bechstein, 1795) **– Silvie porumbacă – Славка-ястребинка**

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) **– Lăcar mare – Камышевка дроздовидная**
Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**


Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.

Общий ареал: Евразия, Северо-Западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** водно-болотные угодья всех районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Рэскаэць-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными.








Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) – **Lăcar de-mlaştină** – **Камышевка болотная**
Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Западная и частично Восточная Европа, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова:*** широко и спорадично распространен на всей территории страны. ***На территории сайта*** малочисленная на гнездовании птица. Населяет кустарниковые заросли побережий различных водоемов Численность низкая. Встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.





Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) **– Lăcar mic – Камышевка-барсучок**
Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.

Общий ареал: Западная Евразия, Северо-Западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** водно-болотные угодья всех районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными.






Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) **– Lăcar de-stuf – Камышевка тростниковая**
Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Западная Евразия, Северо-Западная Африка.
Распространение в Республике Молдова: водно-болотные угодья всех районов.
На территории сайта гнездится в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными.






Hippolais icterina (Vieillot, 1817) **– Frunzăriță galbenă – Пересмешка зеленая**
Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Западная Евразия – от Скандинавии и восточной Франции к востоку до долины Оби. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными и плодами растений.






Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) – **Greluşel de-zăvoi** – **Сверчок речной**
Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Центральная и Южная Европа. ***Распространение в Республике Молдова:*** широко распространен по долинам рек, особенно в южных регионах, но везде малочислен. ***На территории сайта*** довольно малочисленная на гнездовании птица. Встречается в комплексах с заболоченными местообитаниями – ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.








Locustella luscinioides (Savi, 1824) **– Greluşel de-stuf – Сверчок соловьиный**
Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: южные регионы Европы и Западной Азии. ***Распространение в Республике Молдова:*** довольно широко и преимущественно в поймах рек Днестр и Прут, но повсюду малочислен. ***На территории сайта*** довольно редкая на гнездовании птица. Встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ” и ”Крокмаз-Тудора”.








Locustella naevia (Boddaert, 1783) **– Greluşel pătat – Сверчок обыкновенный**
Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**

Охранный статус: вид с дефицитом данных – **DD.**
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Центральная и Южная Европа, Центральная Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** распространен спорадично по долинам рек и внутренним водоемам. Численность всюду невелика. ***На территории сайта*** довольно редкая на гнездовании птица. Отмечена во влажных зонах в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”.







Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) **– Pitulice mică – Пеночка-теньковка**
Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.

Общий ареал: умеренные и северные широты Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта:*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными и плодами растений.





Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) **– Pitulice sfârâitoare – Пеночка-трещотка**
Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.

Общий ареал: Евразия. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы преимущественно центральных и северных районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Кицкань”. Во время миграций встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными и плодами растений.





Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) **– Pitulice fluierătoare – Пеночка-весничка**
Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.

Общий ареал: умеренные и северные широты Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** пойменные леса Днестра и Прута, лесные биотопы преимущественно центральных и северных районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными и плодами растений.






Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) **– Silvie-cu-cap-negru – Славка-черноголовка**
Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.

Общий ареал: Европа, Западная Сибирь, Северо-Западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится и встречается во время миграций во всех комплексах. Питается беспозвоночными и плодами растений.








Sylvia borin (Boddaert, 1783) **– Silvie de-zăvoi – Славка садовая**
Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.


Общий ареал: Европа, Западная Сибирь, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** преимущественно пойменные леса. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Попяска”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными и плодами растений.






Sylvia communis (Latham, 1787) **– Silvie de-câmp – Славка серая**

Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, Западная Сибирь, Северо-Западная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** кустарниково-травянистые биотопы, заросли высокостебельных сорных растений во всех районах. ***На территории сайта*** гнездится и встречается во время миграций во всех комплексах. Питается беспозвоночными и плодами растений.





Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) **– Silvie mică – Славка-завирушка**

Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**


Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.

Общий ареал: от западных границ Европы до Забайкалья, от лесотундры до южной Азии. ***Распространение в Республике Молдова:*** преимущественно пойменные леса и урбанизированный ландшафт во всех районах. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными и плодами растений.







Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) **– Silvie porumbacă – Славка-ястребинка**

Семейство **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Общий ареал: Западная Евразия – от Скандинавии и восточной Франции к востоку до долины Оби. ***Распространение в Республике Молдова:*** преимущественно сухие кустарниковые и лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Попяска”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными и плодами растений.





Семейство **Treskiornithidae** (Richmond, 1917) **– Tresciornitide – Ибисовые**


1. ***Platalea leucorodia*** (Linnaeus, 1758) **– Lopătar – Колпица**
2. ***Plegadis falcinellus*** (Linnaeus, 1766) **– Ţigănuş – Каравайка**

Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) – **Lopătar** – **Колпица**
Семейство **Treskiornithidae** (Richmond, 1917) **– Tresciornitide – Ибисовые**



Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR**.
Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), Красную книгу Приднестровья (категория **VU**), Операционный Список, в Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”), в списки Бернской и Боннской конвенций, Приложение I Директивы об охране птиц.
Общий ареал: Европа и Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** юг страны, в долинах рек Прут и Днестр. В плавнях Прута гнездится. ***На территории сайта*** встречается в качестве мигранта или залетной птицы в комплексах ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Саги-Казачешть”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Дефицит приемлемых угодий в пределах сайта делают его редким.





Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) – **Ţigănuş** – **Каравайка**
Семейство **Treskiornithidae** (Richmond, 1917) **– Tresciornitide – Ибисовые**




Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**),), Красную книгу Приднестровья, как уязвимый вид (категория **VU**), Красную книгу Украины (категория ”**Вразливий**”), Операционный Список, в списки Бернской и Боннской конвенций. Директива об охране птиц, Приложение I.

Общий ареал: от юга Европы до Центральной и Восточной Азии, Филиппины, Индонезия, Австралия, юг Африки, Мадагаскар и Центральная Америка. ***Распространение в Республике Молдова:*** юг страны, в долинах рек Прут и Днестр.

На территории сайта встречается в качестве мигранта или залетной птицы в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Саги-Казачешть”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Характерным, как место кормовой концентрации, является луговой меандр, расположенный в северной части комплекса ”Талмазские плавни”.





Семейство **Troglodítidae** Swainson, 1832 **– Trogloditide – Крапивниковые**

1. ***Troglodytes troglodytes*** (Linnaeus, 1758) **– Pănțăruș – Крапивник**

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) **– Pănțăruș – Крапивник**
Семейство **Trogloditidae** Swainson, 1832 **– Trogloditide – Крапивниковые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.

Общий ареал: Евразия и Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы северных и центральных районов, во время миграций и зимой по всей республике. ***На территории сайта*** указывается на гнездовании в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”. Во время миграций и зимой встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными и семенами растений.





Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**


1. ***Erithacus rubecula*** (Linnaeus, 1758) **– Măcăleandru – Зарянка**
2. ***Luscinia luscinia*** (Linnaeus, 1758) **– Privighetoare de-zăvoi – Соловей обыкновенный**
3. ***Luscinia svecica*** (Linnaeus, 1758) **– Guşă vânătă – Варакушка**
4. ***Oenanthe oenanthe*** (Linnaeus, 1758) **– Pietrar sur – Каменка обыкновенная**
5. ***Phoenicurus ochruros*** (Gmelin, 1774) **– Codroş de-munte – Горихвостка-чернушка**
6. ***Phoenicurus phoenicurus*** (Linnaeus, 1758) **– Codroş de-pădure – Горихвостка обыкновенная**
7. ***Saxicola rubetra*** (Linnaeus. 1758) **– Mărăcinar mare – Чекан луговой**
8. ***Saxicola torquata*** (Linnaeus, 1766) **– Mărăcinar negru – Чекан черноголовый**
9. ***Turdus iliacus*** (Linnaeus. 1766) **– Sturz de-vii – Белобровик**
10. ***Turdus merula*** (Linnaeus, 1758) **– Mierlă – Дрозд черный**
11. ***Turdus philomelos*** (Brehm, 1831) **– Sturz cântător – Дрозд певчий**
12. ***Turdus pilaris*** (Linnaeus, 1758) **– Cocoşar – Дрозд-рябинник**
13. ***Turdus viscivorus*** Linnaeus, 1758 **– Sturz de-vâsc – Дрозд-деряба**

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) **– Măcăleandru – Зарянка**
Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Западная Евразия и Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится и встречается во время миграций во всех комплексах. Часть птиц остается зимовать. Питается беспозвоночными и плодами растений.






Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) **– Privighetoare de-zăvoi – Соловей обыкновенный**
Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: умеренные широты Евразии – от южной Швеции и Чехии до западного Алтая. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится и встречается во время миграций во всех комплексах. Питается беспозвоночными и плодами растений.





Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) **– Guşă vânătă – Варакушка**
Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU.**

Состояние охраны: включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **EN**), списки Бернской конвенции и Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Общий ареал: северные и умеренные широты Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** Припрутье и Кучурганское водохранилище.

На территории сайта встречается во время миграции в комплексе ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными и плодами растений.






Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) **– Pietrar sur – Каменка обыкновенная**
Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Евразия, Северо-Западная Африка, Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными и семенами растений.






Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) **– Codroș de-munte – Горихвостка-чернушка**
Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, Кавказ, Центральная Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** указывается гнездование в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Талмазские плавни”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”. Довольно редко встречается во время миграций в комплексах ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”. Питается беспозвоночными и семенами растений.








Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) **– Codroș de-pădure – Горихвостка обыкновенная**
Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, Северо-западная Африка, Малая Азия, Иран, Ирак. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”. Во время миграций встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными и плодами растений.








Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) – **Mărăcinar mare** – **Чекан луговой**
Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа. ***Распространение в Республике Молдова:*** по всей территории республики, обычен по долинам рек, в Кодрах. ***На территории сайта*** довольно малочисленная птица, встречается в комплексах ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Попяска”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.








Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) **– Mărăcinar negru – Чекан черноголовый**
Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Бернской конвенции.

Общий ареал: Евразия и Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Тудора-Паланка”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Питается беспозвоночными и семенами растений.








Turdus iliacus (Linnaeus. 1766) – **Sturz de-vii** – **Белобровик**
Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в Красный список МСОП, как близкий к уязвимому вид (категория **NT**).
Общий ареал: северо-восточная Европа и север Азии. ***Распространение в Республике Молдова:*** во время миграций по лесным территориям. ***На территории сайта*** довольно малочисленный во время миграций вид, встречающийся в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Кицкань”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.






Turdus merula (Linnaeus, 1758) **– Mierlă – Дрозд черный**
Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: Европа, Северо-Западная Африка, леса Малой и Центральной Азии. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными и плодами растений.






Turdus philomelos (Brehm, 1831) **– Sturz cântător – Дрозд певчий**
Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: Европа, Сибирь, Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** лесные биотопы всех районов. ***На территории сайта*** гнездится в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Во время миграций встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными и плодами растений.






Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) **– Cocoșar – Дрозд-рябинник**
Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: северные и умеренные широты Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** изредка гнездится в северных районах. Во время миграций и зимой встречается повсеместно. ***На территории сайта*** во время миграций и зимой встречается во всех комплексах. Питается беспозвоночными и плодами растений.






Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 **– Sturz de-vâsc – Дрозд-деряба**
Семейство **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
Состояние охраны: в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в списки Европейской директивы по охране птиц (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Общий ареал: северные и умеренные широты Евразии – от Атлантического побережья до Байкала, Северо-Западная Африка, Малая Азия, Кавказ.
Распространение в Республике Молдова: во время миграций и зимой все районы.
На территории сайта регистрировался во время миграций в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Крокмаз-Тудора”, ”Озеро Лэптура-Старица Днестра”, ”Кицкань”, ”Саги-Казачешть”, ”Дубовый кут”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. На некоторых участках также встречался зимой. Питается беспозвоночными и плодами растений.





Семейство **Upupidae** Leach, 1820 **– Upupide – Удодовые**

1. ***Upupa epops*** Linnaeus, 1758 **– Pupăză – Удод**

Upupa epops Linnaeus, 1758 **– Pupăză – Удод**
Семейство **Upupidae** Leach, 1820 **– Upupide – Удодовые**




Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

Состояние охраны: в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный Список и списки Бернской конвенции.

Общий ареал: Евразия, Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** гнездится и встречается во время миграций во всех комплексах. Питается беспозвоночными.





Класс **Mammalia** Linnaeus, 1758 **– Mamifere – Млекопитающие**

Конспект редких видов млекопитающих Рамсарского сайта «Нижний Днестр», охраняемых на национальном и международных уровнях, представляет собой аннотированный список таксонов, произрастающих на его территории. Семейства и виды внутри семейств расположены в алфавитном порядке.

Для каждого вида приводятся следующие характеристики:

- латинское, румынское и русское названия];
- принадлежность к семейству на латинском, румынском и русском языках;
- статус (категория редкости);
- охранный статус (включенность в Экологическое законодательство Республики Молдова (категории редкости охраняемых видов: I – исчезнувший вид, II – вид, находящийся под угрозой исчезновения, III – вид, численность которого сокращается катастрофически быстро, что может поставить его под угрозу исчезновения, IV – редкий вид, V – неопределенный вид, VI – восстановленный вид, VII – недостаточно изученный вид, VIII – вид, не вызывающий опасений) [199], Операционный список [123], Красную книгу Республики Молдова [9], Красную книгу Приднестровья [112], Красную книгу Украины [186], Списки МСОП [21], Европейский Красный список [22], Бернскую Конвенцию [11], Приложения Директивы по местообитаниям [14]);
- общий ареал [19];
- распространение в Республике Молдова;
- распространение на территории сайта – приуроченность к природным комплексам;
- приуроченность к местообитаниям;
- фото Цуркану В.Ф. и Бондаренко А.М. Использованы материалы сайта www.wikipedia.org

Фауна и редкие виды млекопитающих

В составе фауны млекопитающих Рамсарского сайта «Нижний Днестр» выявлено **32** вида [1, 2, 7, 9, 32, 52, 85, 106, 107, 119 и др.], охраняемых на международном и национальном уровнях. Они различаются по степени редкости, представлены разными по численности популяциями, распространение некоторых из них ограничивается одним или несколькими пунктами. Некоторые виды нуждаются в специальных мерах по сохранению, особенно виды высоких категорий редкости.

Под государственной охраной в Республике Молдова находятся 22 вида [199]: 2 вида находятся под угрозой исчезновения (категория **II**) – *Mustela lutreola* Linnaeus, 1761 и *Nyctalus lasiopterus* Schreber, 1780; 2 вида, численность которых сокращается катастрофически быстро, что может поставить их под угрозу исчезновения (категория **III**) – *Felis silvestris* Schreber, 1777, *Lutra lutra* Linnaeus, 1758; 12 редких видов (категория **IV**) – *Eptesicus serotinus* Schreber, 1774, *Martes martes* Linnaeus, 1758, *Mustela erminea* Linnaeus, 1758, *Myotis bechsteinii* Kuhl, 1817, *Myotis dasycneme* Boie, 1825, *Myotis daubentonii* Kuhl, 1817, *Nyctalus leisleri* Kuhl, 1817, *Nyctalus noctula* Schreber, 1774, *Pipistrellus nathusii* Keyserling and Blasius, 1839, *Rhinolophus hipposideros* Bechstein, 1800, *Sorex minutus* Linnaeus, 1766, *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758; состояние 6 видов не вызывает опасений (категория **VIII**) – *Erinaceus europeus* Barrett-Hamilton, 1900, *Martes foina* Erxleben, 1777, *Meles meles* Linnaeus, 1758, *Mustela nivalis* Linnaeus, 1766, *Mustela putorius* Linnaeus, 1758, *Sorex araneus* Linnaeus, 1758,

Наиболее редкие виды высоких категорий редкости включены в Красную книгу Республики Молдова [9]: 4 критически угрожаемых видов (категория **CR**) – *Mustela lutreola* Linnaeus, 1761, *Myotis bechsteinii* Kuhl, 1817 *Nyctalus lasiopterus* Schreber, 1780 и *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758; 4 угрожаемых (категория **EN**) – *Myotis dasycneme* Boie, 1825, *Neomys anomalus* Cabrera, 1907, *Pipistrellus nathusii* Keyserling and Blasius, 1839, *Rhinolophus hipposideros* Bechstein, 1800; 12 уязвимых видов (категория **VU**) – *Cricetus cricetus* Pallas, 1773, *Crocidura leucodom* Hermann, 1780, *Felis silvestris* Schreber, 1777, *Lutra lutra* Linnaeus, 1758, *Martes martes* Linnaeus, 1758, *Micromys minutus* Pallas, 1771, *Mustela erminea* Linnaeus, 1758, *Myotis daubentonii* Kuhl, 1817, *Myotis mystacinus* Kuhl, 1817, *Myoxus glis* Linnaeus, 1766, *Pipistrellus kuhlii* Kuhl, 1817, *Plecotus austriacus* Fischer, 1829.

В Красную книгу Приднестровья включены 8 видов [112]: 3 критически угрожаемых вида (категория **CR**) – *Felis silvestris* Schreber, 1777, *Mustela erminea* Linnaeus, 1758, *Neomys anomalus* Cabrera, 1907; 4 угрожаемых (категория **EN**) – *Lutra lutra* Linnaeus, 1758, *Martes martes* Linnaeus, 1758, *Myotis dasycneme* Boie, 1825, *Rhinolophus hipposideros* Bechstein, 1800 и 1 уязвимый (категория **VU**) – *Meles meles* Linnaeus, 1758,

В Операционный список, составленный при разработке Национальной Экологической Сети Республики Молдова, включены 14 видов [123].

На территории сайта встречаются редкие виды, в сопредельной территории Украины. В Красную книгу Украины включены 23 зафиксированных на территории сайта видов [186], из них 10 видов категории ”**Вразливий**”, 3 вида категории ”**Зникаючий**”, 3 вида категории ”**Рідкісний**”, 1 вид категории ” **Недостатньо відомий**” и 6 видов категории ”**Неоцінений**”.

В Красный Список Международного Союза по Охране Дикой Природы включены 5 видов [21] – *Lutra lutra* Linnaeus, 1758, *Mustela lutreola* Linnaeus, 1761, *Myotis bechsteinii* Kuhl, 1817, *Myotis dasycneme* Boie, 1825, *Nyctalus lasiopterus* Schreber, 1780.

В Красный Список Европы включены 7 видов [22] – *Felis silvestris* Schreber, 1777, *Lutra lutra* Linnaeus, 1758, *Mustela lutreola* Linnaeus, 1761, *Myotis bechsteinii* Kuhl, 1817, *Myotis dasycneme* Boie, 1825, *Nyctalus lasiopterus* Schreber, 1780, *Rhinolophus hipposideros* Bechstein.

Из Списка Конвенции по Сохранению Европейской дикой природы и естественных местообитаний (Бернская Конвенция, 1979) [11] строго охраняемых видов зафиксированы 26 видов. В Список Боннской Конвенции включены 15 видов.

В Приложения II Директивы по местообитаниям (Директива Совета 92/43/EEC от 21 мая 1992 по сохранению природных местообитаний и дикой фауны и флоры) [14] включены 5 видов – *Cricetus cricetus* Pallas, 1773, *Felis silvestris* Schreber, 1777, *Myotis bechsteinii* Kuhl, 1817, *Myotis dasycneme* Boie, 1825, *Rhinolophus hipposideros* Bechstein и в Приложение IV – 17 редких видов млекопитающих.

Семейство **Cricetidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Cricetide – Хомяковые**

1. ***Cricetus cricetus*** Pallas, 1773 **– Hârciog – Хомяк обыкновенный**


Cricetus cricetus Pallas, 1773 **– Hârciog – Хомяк обыкновенный**
Семейство **Cricetidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Cricetide – Хомяковые**

Охранный статус: критически угрожаемый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), в Операционный список, Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.

Общий ареал: степная и лесостепная зоны Центральной и Южной Европы, до Западной Сибири. ***Распространение в Республике Молдова:*** не часто, во всех зонах страны. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Талмазские лавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”. Заселяет как необработанные поля, так и агрокультуры, межи, края дорог, лесополосы.







Семейство **Erinaceidae** G.Fischer, 1814 **– Erinaceide – Ежовые**


1. ***Erinaceus europeus*** Barret-Hamilton, 1900 – **Arici comun** – **Еж обыкновенный**

Erinaceus europeus Barret-Hamilton, 1900 – **Arici comun** – **Еж обыкновенный**
Семейство **Erinaceidae** G.Fischer, 1814 **– Erinaceide – Ежовые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный список и Приложение Бернской конвенции.
Общий ареал: Европа, Азия, Африка и Новая Зеландия. ***Распространение в Республике Молдова:*** на всей территории страны, особенно в биотопах с островками леса на севере и в центре. ***На территории сайта*** встречается во всех комплексах, преобладая в ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”,”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.





Семейство **Felidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Felide – Кошачьи**

1. ***Felis silvestris*** Schreber, 1777 **– Pisica sălbatică – Кот лесной**

Felis silvestris Schreber, 1777 **– Pisica sălbatică – Кот лесной**

Семейство **Felidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Felide – Кошачьи**

Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.


***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), в Операционный список, Приложения Бернской конвенции, CITES и Директивы по местообитаниям.

Общий ареал: ареал вида охватывает Пиренейский полуостров, центр и юго-восток Европы, Кавказ. ***Распространение в Республике Молдова:*** заросли тростника в низовьях Днестра и Прута, леса Центральных Кодр и севера страны. ***На территории сайта*** встречается как в лесных комплексах, так и в прибрежных зарослях тростника.









Семейство **Muridae** Illiger, 1811 **– Muride – Мышиные**


1. ***Micromys minutus*** Pallas, 1771 **– Șoarece pitic – Мышь малютка**

Micromys minutus Pallas, 1771 **– Șoarece pitic – Мышь малютка**
Семейство **Muridae** Illiger, 1811 **– Muride – Мышиные**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**).
Общий ареал: степная и лесостепная зоны Евразии, от северо-востока Испании до Кореи, на север – до широты в 65º. На юге граница ареала проходит через юг Румынии, Украины, север Кавказа и Монголии. ***Распространение в Республике Молдова:*** Центральная и Северная зоны, долины Днестра и Прута. ***На территории сайта*** встречается в большинстве комплексов с участками леса и высокой травянистой растительностью.





Семейство **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**


1. ***Lutra lutra*** Linnaeus, 1758 **– Vidră – Выдра**
2. ***Martes foina*** Erxleben, 1777 **– Jder de-piatră – Куница каменная**
3. ***Martes martes*** Linnaeus, 1758 **– Jder de-pădure – Куница лесная**
4. ***Meles meles*** Linnaeus, 1758 **– Bursuc – Барсук**
5. ***Mustela erminea*** Linnaeus, 1758 **– Hermelină – Горностай**
6. ***Mustela lutreola*** Linnaeus,1761 **– Nurcă europeană – Норка европейская**
7. ***Mustela nivalis*** Linnaeus,1766 **– Nevăstuică – Ласка**
8. ***Mustela putorius*** Linnaeus, 1758 **– Dihor de-pădure – Хорек лесной**

Lutra lutra Linnaeus, 1758 **– Vidră – Выдра**
Семейство **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**





Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **III**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), в Операционный список, Приложения Бернской конвенции и CITES.
Общий ареал: Евразия и северо-запад Африки, за исключение зоны пустыни и тундры. ***Распространение в Республике Молдова:*** встречается в Днестре и Пруте и в их притоках. Также была отмечена и в других водоемах страны. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Тудора-Паланка”.






Martes foina Erxleben, 1777 **– Jder de-piatră – Куница каменная**
Семейство **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**








Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**). Включен в Приложения Бернской конвенции.
Общий ареал: ареал вида включает большую часть Евразии – от Пиренейского полуострова до Монголии и Гималайских гор. ***Распространение в Республике Молдова:*** вся территория страны. Часто в населенных пунктах и каменистых биотопах, откуда и название – каменная куница. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Талмазские плавни” ”Долина Олэнешть-Крокмаз ”Туфа-Стынка Талмаза”,,”Пуркарь”, ”Ымпэрэтяса”, ”Тудора-Паланка”.



Martes martes Linnaeus, 1758 **– Jder de-pădure – Куница лесная**
Семейство **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), в Операционный список, Красный список МСОП, Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: Европа, Малая Азия, север Ирака и Ирана, Кавказ, Западная Сибирь. ***Распространение в Республике Молдова:*** в лесных экосистемах, преимущественно в центральной части страны. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Копанка-Леунтя”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”. Предпочитает старые леса с дуплистыми деревьями.






Meles meles Linnaeus, 1758 **– Bursuc – Барсук**
Семейство **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**. ***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**), включен в Операционный список, Приложения Бернской конвенции.

Общий ареал: ареал вида охватывает всю Европу (за исключением северных областей Скандинавии), Сибирь, Центральную Азию, Дальний Восток и Китай. Большая часть Европы и Малая Азия заселена подвидом *Meles meles meles*. ***Распространение в Республике Молдова:*** заселяет все леса, преимущественно в зоне Кодр. ***На территории сайта*** встречается в комплексах “Чиобурчиу-Рэскэець”, “Копанка-Леунтя”, “Талмазские плавни”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Заозерное-Нукарь”. Предпочитает лесные биотопы, с пересеченным рельефом, где роет свои подземные норы..








Mustela erminea Linnaeus, 1758 **– Hermelină – Горностай**
Семейство **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**

Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), в Операционный список, Приложения Бернской конвенции и Директивы по местообитаниям .
Общий ареал: ареал вида простирается по всему северному полушарию, охватывая Европу, Азию, Северную Америку и Малую Азию. ***Распространение в Республике Молдова:*** заселяет различные биотопы, преимущественно пойменные биотопы, леса Кодр. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”.








Mustela lutreola Linnaeus,1761 **– Nurcă europeană – Норка европейская**
Семейство **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**

Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), в Операционный список, Приложения Бернской конвенции.





Общий ареал: эндемичный европейский вид с ареалом, охватывающим север Испании, юго-запад Франции, Румынию, Эстонию, Литву, Беларусь, Украину и европейскую часть России . В настоящее время ареал сокращается из-за замещения американской норкой *Neovison vison*. ***Распространение в Республике Молдова:*** спорадически встречается в низовьях Днестра и Прутаs. ***На территории сайта*** встречается в комлексах ”Талмазские плавни”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Тудора-Паланка”. Вид приспособлен к водной среде обитания.




Mustela nivalis Linnaeus,1766 **– Nevăstuică – Ласка**
Семейство **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**). Включен в Приложения Бернской конвенции.
Общий ареал: Евразия и Северная Африка, Северная Америка. ***Распространение в Республике Молдова:*** обитает на всей территории страны. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Тудора-Паланка”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Заселяет все типы экосистем, включая населенные пункты.






Mustela putorius Linnaeus, 1758 **– Dihor de-pădure – Хорек лесной**
Семейство **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**). Включен в Приложения Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: ареал вида простирается с юга Европы до юга Швеции, центра Финляндии и Кольского полуострова. На восток – до северо-востока России и центра Украины. ***Распространение в Республике Молдова:*** вся территория страны; обитает в биотопах, прилегающих к населенным пунктам. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Тудора-Паланка”, ”Ымпэрэтяса”. Предпочитает негустые леса, поймы рек и другие биотопы.







Семейство **Myoxidae – Mioxide – Соневые**

1. ***Myoxus glis*** (Linnaeus,1766) **– Pârș comun – Соня обыкновенная**

Myoxus glis (Linnaeus,1766) **– Pârș comun – Соня обыкновенная**

Семейство **Myoxidae – Mioxide – Соневые**




Охранный статус: уязвимый вид – **VU**

***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**).

Общий ареал: Центральная и Южная Европа, Малая Азия, Кавказ. Изолированные популяции были отмечены и в Восточной Европе (регион реки Волга). ***Распространение в Республике Молдова:*** обитает преимущественно в лесах центральной части страны. ***На территории сайта*** был отмечен в комплексе ”Туфа-Стынка Талмаза”. Предпочитает леса и старые сады.






Семейство **Soricidae** G.Fischer, 1817 **– Soricide – Землеройковые**

1. **Crocedura leucodon** Hermann, 1780 – **Chițcan-cu-abdomen-alb** – **Белозубка белобрюхая**
2. **Neomys anomalus** Cabrera, 1907 **– Chițcan-mic-de-apă – Кутора малая**
3. ***Sorex araneus* Linnaeus, 1758** – **Chițcan comun** – **Землеройка обыкновенная**
4. ***Sorex minutus*** Linnaeus, 1758 – **Chițcan mic** – **Бурозубка малая**

Crocedura leucodon Hermann, 1780 – **Chiţcan-cu-abdomen-alb** – **Белозубка белобрюхая**
Семейство **Soricidae** G.Fischer, 1817 **– Soricide – Землеройковые**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**).
Общий ареал: ареал вида охватывает центр и юго-восток Европы, юго-запад Азии. ***Распространение в Республике Молдова:*** на всей территории, но в небольшой численности. ***На территории сайта*** был зарегистрирован в комплексе ”Талмазские плавни”.






Neomys anomalus Cabrera, 1907 **– Chițcan-mic-de-apă – Кутора малая**
Семейство ***Soricidae*** G.Fischer, 1817 **– Soricide – Землеройковые**

Охранный статус: угрожаемый вид – **EN**.
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **EN**).

Общий ареал: южные регионы Западной и Центральной Европы, простирается на север – до Рейна и Беловежской Пущи, на восток – до Орловской и Воронежской областей России. ***Распространение в Республике Молдова:*** обычный вид во влажных местах поймы Днестра и Прута. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Рэскэець-Олэнешть”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”. Млекопитающее, которое живет, как в водной, так и в наземной среде. Прекрасный пловец и ныряльщик, очень редко удаляется от берега. Предпочитает ручьи и реки с чистой водой, и медленным течением.







Sorex araneus Linnaeus, 1758 – Chiţcan comun – Землеройка обыкновенная


Семейство **Soricidae** G.Fischer, 1817 **– Soricide – Землеройковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **VIII**). Включен в Приложения Бернской конвенции.

Общий ареал: ареал вида охватывает большую часть Северной Европы и Сибири, до Енисея и озера Байкал. На юг простирается до Центральной Азии, Турции и Палестины. ***Распространение в Республике Молдова:*** на всей территории страны, в особенности, в местах с островковыми лесами центральной и северной части страны. ***На территории сайта*** встречается во всех комплексах, преобладая в ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”.






Sorex minutus Linnaeus, 1758 – **Chiţcan mic** – **Бурозубка малая**
Семейство **Soricidae** G.Fischer, 1817 **– Soricide – Землеройковые**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**). Включен в Приложения Бернской конвенции.
Общий ареал: ареал вида охватывает почти всю Европу и большую часть Азии. На север простирается до Кольского полуострова.
Распространение в Республике Молдова: на всей территории страны, в особенности, во влажных пойменных лесах Днестра и Прута. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець” и др.





Отряд **Microchiroptera** Dobson, 1875 **– Microchiroptera – Рукокрылые**


Семейство **Rhinolophidae** Gray, 1825 **– Rinolofide – Подковоносые**

1. ***Rhinolophus hipposideros*** Bechstein, 1800 **– Rinolofid mic – Подковонос малый**

Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 **– Rinolofid mic – Подковонос малый**
Семейство **Rhinolophidae** Gray, 1825 **– Rinolofide – Подковоносые**



Охранный статус: угрожаемый вид – **EN**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **EN** в Операционный список, Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: Западная Европа, Кавказ и Малая Азия, до Гималайских гор, Северная Африка. ***Распространение в Республике Молдова:*** обычный, но немногочисленный вид. Чаще встречается вдоль речных долин и каменистых биотопах. ***На территории сайта*** был отмечен в комплексе “Талмазские плавни”.






Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**

1. ***Eptesicus serotinus*** Schreber, 1774 **– Liliac târziu – Кожан поздний**
2. ***Myotis bechsteinii*** Kuhl,1817 **– Noptar Bechstein – Ночница длиноухая**
3. ***Myotis dasycneme*** Boie,1825 **– Noptar de-iaz – Ночница прудовая**
4. ***Myotis daubentonii*** Kuhl,1817 **– Noptar de-apă – Ночница водянная**
5. ***Myotis mystacinus*** Kuhl,1817 **– Noptar-cu-mustăți – Ночница усатая**
6. ***Nyctalus lasiopterus*** Schreber, 1780 **– Nictal gigantic – Вечерница гигантская**
7. ***Nyctalus leisleri*** Kuhl,1817 **– Nictal mic – Вечерница малая**
8. ***Nyctalus noctua*** Schreber, 1774 **– Nictal roșcat – Вечерница рыжая**
9. ***Pipistrellus kuhlii*** Kuhl,1817 **– Pipistrel Kuhli – Нетопырь средиземноморский**
10. ***Pipistrellus nathusii*** Keyserling,1839 **– Pipistrel Natuzi (de-pădure) – Нетопырь лесной**
11. ***Pipistrellus pipistrellus*** Schreber, 1774 **– Pipistrel pitic – Нетопырь карлик**
12. ***Pipistrellus pygmaeus*** Leach,1825 **– Pipistrel mic – Нетопырь малый**
13. ***Plecotus austriacus*** Fischer, 1829 **– Liliac-cu-urechi-mari – Ушан серый**
14. ***Vespertilio murinus*** Linnaeus, 1758 **– Vespertil bicolor comun – Кожан двухцветный**

Eptesicus serotinus Schreber, 1774 **– Liliac târziu – Кожан поздний**
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**). Включен в Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: умеренная зона Евразии. ***Распространение в Республике Молдова:*** обычный вид на территории всей страны. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Заселяет различные биоценозы в антопизированном ландшафте, образует колонии. Использует ниши различных построек, пещеры и карьеры, где и зимует.








Myotis bechsteinii Kuhl,1817 **– Noptar Bechstein – Ночница длиноухая**
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**



Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), в Операционный список, Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: центр Пиренейского полуострова, центр и юго-восток Европы, Кавказ и частично Малая Азия. ***Распространение в Республике Молдова:*** редко вдоль речных долин, на каменистых участках. ***На территории сайта*** был отмечен в комплексе ”Талмазские плавни”.





Myotis dasycneme Boie,1825 – Noptar de-iaz – Ночница прудовая
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 – Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши


Охранный статус: угрожаемый вид – **EN**.

***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **EN**), в Операционный список, Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.

Общий ареал: ареал вида охватывает узкое географическое пространство - между 49 и 63 параллелями, и которое простирается от севера Франции, через Бельгию, Голандию, север Германии и Польши, Белоруссию, европейскую часть России, Западную Сибирь до Енисея. ***Распространение в Республике Молдова:*** пойменные биотопы Днестра и Прута. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ” и ”Талмазские плавни”.












Myotis daubentonii Kuhl,1817 **– Noptar de-apă – Ночница водянная**
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide –**
Гладконосые летучие мыши

Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), в Операционный список, Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: ареал вида охватывает умеренную зону Евразии, от Великобритании и Франции до острова Сахалин. ***Распространение в Республике Молдова:*** преимущественно в центре и на севере страны. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Грэдина Турчаскэ”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”.




Myotis mystacinus Kuhl,1817 **– Noptar-cu-mustăți – Ночница усатая**
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**

Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: центр и юго-восток Европы, юг Скандинавии и Великобритании, Марокко, Малая Азия, до Кавказа. На северо-востоке Европы простирается до Уральских гор. ***Распространение в Республике Молдова:*** обитает на всей территории. ***На территории сайта*** встречается во всех комплексах, преобладая в ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець” и др. Заселяет различные места с природными или антропогенными укрытиями.








Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 **– Nictal gigantic – Вечерница гигантская**
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**



Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **II**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), в Операционный список, Красный список МСОП (категория **CR**), Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: лиственные леса Европы, Закавказье, Крым, достигая к востоку Уральских гор. ***Распространение в Республике Молдова:*** леса Центральных Кодр и север страны. ***На территории сайта*** был отмечен только в комплексе ”Талмазские плавни”. Предпочитает леса с дуплистыми деревьями.





Nyctalus leisleri Kuhl,1817 – **Nictal mic – Вечерница малая**
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 – **Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**


Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**). Включен в Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.

Общий ареал: в Европе ареал вида простирается на север до южного побережья Балтийского моря и от запада России до Уральских гор, северо-запад Африки (Марокко и Алжир). Имеет изолированные популяции в Закавказье и Гималаях. ***Распространение в Республике Молдова:*** степная зона и лесные биотопы, но может адаптироваться в парках и населенных пунктах. ***На территории сайта*** встречается во всех комплексах, Преобладая в ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець” и др. Предпочитает лесные участки возле рек и озер.







Nyctalus noctua Schreber, 1774 – **Nictal roșcat – Вечерница рыжая**
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 – **Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**


Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.

***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**). Включен в Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.

Общий ареал: лиственные леса Европы, Западная Сибирь, Центральная Азия, Китай, Ближний Восток. ***Распространение в Республике Молдова:*** заселяет всю территорию, преимущественно леса центра и севера страны. ***На территории сайта*** встречается практически во всех комплексах, преобладая в ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Обитает в лесах, парках и садах. Может быть замечен и в населенных пунктах.








Pipistrellus kuhlii Kuhl,1817 **– Pipistrel Kuhli – Нетопырь средиземноморский**
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**



Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.
***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: ареал вида охватывает засушливые и полусухие регионы по периметру Средиземного моря, юго-восток Европы и Кавказ, некоторые страны северо-востока Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока. ***Распространение в Республике Молдова:*** недостаточно изучено. ***На территории сайта*** был отмечен в комплексах ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”. Обитает в открытых биотопах и населенных пунктах.





Pipistrellus nathusii Keyserling,1839 **– Pipistrel Natuzi (de-pădure) – Нетопырь лесной**
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**


Охранный статус: угрожаемый вид – **EN**.

***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **EN**), Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.

Общий ареал: ареал вида охватывает Центральную Европу – до Уральских гор, Кавказа и Ближнего Востока. ***Распространение в Республике Молдова:*** встречается, как в лесных биотопах, так и в населенных пунктах. ***На территории сайта*** встречается почти во всех биотопах, преобладая в ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Предпочитает лесные опушки, долины рек и населенные пункты.








Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 **– Pipistrel pitic – Нетопырь карлик**
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**



Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова не предприняты меры. Включен в Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: ареал вида достаточно обширен, простирается в большей части Европы (за исключением Скандинавии), юго-западной Азии и северо-западной Африки (Марокко, Алжир, Тунис). ***Распространение в Республике Молдова:*** все районы. ***На территории сайта*** встречается в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Пуркарь” и”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Предпочитает антропогенные биотопы, где занимает различные ниши построек, а также старые леса, открытые участки с травянистой растительностью, окруженной деревьями и кустарниками.






Pipistrellus pygmaeus Leach,1825 **– Pipistrel mic – Нетопырь малый**
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**

Охранный статус: вид, вызывающий наименьшие опасения – **LC**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова не предприняты меры. Включн в Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: ареал вида охватывает Европу, Кавказ и Малую Азию, фрагментирован и недостаточно изучен. ***Распространение в Республике Молдова:*** недостаточно изучено. ***На территории сайта*** был зарегистрирован в комплексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Заозерное-Нукарь”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Заселяет опушки лесов и населенные пункты. Как убежище предпочитает различные укрытия антропогенного происхождения.







Plecotus austriacus Fischer, 1829 **– Liliac-cu-urechi-mari – Ушан серый**
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**


Охранный статус: уязвимый вид – **VU**.

***Состояние охраны*:** включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **VU**), Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.

Общий ареал: ареал вида охватывает Европу – от Испании и юга Англии до Балкан и юга Украины. ***Распространение в Республике Молдова:*** недостаточно изучено. ***На территории сайта*** был отмечен в комлексах ”Копанка-Леунтя”, ”Грэдина Турчаскэ”, ”Туфа-Стынка Талмаза”, ”Талмазские плавни”, ”Чиобурчиу-Рэскэець”, ”Долина Олэнешть-Крокмаз”, ”Ымпэрэтяса” ”Заозерное-Нукарь”, ”Дикуль-Куца-Мацаринский”. Больше ассоциирован с редкими лесами, открытыми полуаридными участками, антропогенными территориями.








Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 **– Vespertil bicolor comun – Кожан двухцветный**
Семейство **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**

Охранный статус: критически угрожаемый вид – **CR**.
***Состояние охраны*:** в Республике Молдова охраняется государством (категория **IV**), включен в Красную книгу Республики Молдова (категория **CR**), в Операционный список, Приложения Бернской и Боннской конвенций, Директивы по местообитаниям.
Общий ареал: субтропические и умеренные регионы Евразии (центральная и юго-восточная часть Европы, юго-восток Азии, южная часть Сибири, Монголия – до Дальнего Востока и Китая. ***Распространение в Республике Молдова:*** был отмечен в одном лишь месте центральной зоны. ***На территории сайта*** был отмечен в комплексе ”Пуркарь”.







Алфавитный указатель латинских названий растений

Acer campestre L. ……..... 19
Acer tataricum L. 19
Achillea coarctata Poir. ……..... 23, 24, 40, **41**
Achillea ochroleuca Ehrh. ……..... 23, 40, **42**
Achillea setacea Waldst. et Kit. ……..... 16
Adonis vernalis L. ……..… 14, 15, 16, 23, 24, 25, 144, **145**
Aegopodium podagraria L. 20
Agropyron pectinatum (M.Bieb.) Beauv. 15, 16
Agrostis stolonifera L. 20
Alisma gramineum Lej. …..……..... 22, 26, **27**
Alisma loeselii Gorski ……..... **27**
Alismataceae Vent. ……..... **26, 27**
Alliaceae J.Agardh ……..... **28, 29**
Allium paniculatum L. ……..... 28, **29**
Alopecurus pratensis L. 17
Amaryllidaceae J.St.-Hil. …..……..…..... **30, 31**
Amaryllis colchiciflora (Waldst. et Kit.) Ker-Gawl. ……..... **31**
Amoria vesiculosa (Savi) Roskov **89**
Amygdalus nana L. ……... 23, 150, **151**
Andropogon gryllus L. **132**
Anemone montana Hoppe **146**
Anemone pulsatilla L. var. *ucrainica* Ugr. **147**
Apiaceae Juss. ……..... 32, **33**
Araceae Juss. ……..... **34, 35**
Artemisia austriaca Jacq. 15, 16
Artemisia santonica L. 11
Arum orientale M.Bieb. ……..... 24, 34, **35**
Asparagaceae Juss. ……..... **36, 37, 38, 39**
Asparagus officinalis L. ……..... 23, 36, **37**
Asparagus tenuifolius Lam. ……..... 23, 24, 36, **38**
Asparagus verticillatus L. ……..... 23, 36, **39**
Asteraceae Dumort. ……..... **40,41, 52, 43, 44, 45, 46, 47, 48**
Astragalus albidus Waldst. et Kit. ……..... 23, 79, **80**
Astragalus austriacus Jacq. 15, 16
Astragalus dasyanthus Pall. ……..... 23, 24, 79, **81**
Astragalus excapus L. ……..... 24, 79, **82**
Astragalus onobrychis L. 15, 16
Astragalus ponticus Pall. ……..... 24, 79, **83**
Astragalus vesicarius auct., non L. **80**
Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch …….. 13
Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow …..... 23, 24, 94, **95**
Berberidaceae Juss. ……..... **49, 50**
Berberis vulgaris L. ……..... 49, **50**
Bidens radiata Thuill. 13
Bidens tripartita L. 13
Boraginaceae Juss. ……..... **51, 52**
Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb. 11
Brassicaceae Burnett ……..... **53**
Campanulaceae Juss. ……..... **56, 57**
Campanula persicifolia L. ……..... 24, 56, **57**
Camphorosma annua Pall. 11
Carex acutiformis Ehrh. 18, 20
Carex hirta L. 17
Carex caryophyllea Latourr. ……..... 67, **68**

Carex otrubae Podp. 17
Carex pseudocyperus L. ……. 67, **69**
Carex riparia Curt. 20
Carex rhizina Blytt ex Lindb. ……..…….... 23, 24, 67, **70**
Carex sylvatica Huds. 18
Caryophyllaceae Juss. ……..... **58, 59, 60**
Castalia minoriflora Simonk. **124**
Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. ……..… 121, **122**
Celastraceae R.Br. ……..…..…..... **61, 62**
Centaurea marschalliana Spreng. 14
Centaurea trinervia Steph. 15, 16
Cerastium glutinosum Fries ……..……... 23, 58, **59**
Cerastium ucrainicum Pacz. ex Klokov ……..…….. **59**
Chamaecytisus lindemannii (V.Krecz.) Klásková ……… 79, **84**
Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm. ……….. 24, 79, **85**
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wołoszcz.) Klásková ...
..... 23, 79, **86**
Chenopodium rubrum L. 13
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. ……..……. 23, 24, 131, **132**
Cirsium oleraceum (L.) Scop. ……..……. 18
Clematis recta L. ……..……..... 14
Colchicum ancyrense B.L.Burtt 117
Colchicum biebersteinii Rouy 117
Colchicum triphyllum G.Kunze ……..…… 23, 24, 116, **117**
Convallaria bifolia L. ……..……... **64**
Convallariaceae Horan. ……..……..... **63, 64**
Convolvulaceae Juss. **65, 66**
Convolvulus lineatus L. ……..……..…….... 23, 24, 65, **66**
Cotinus coggygria Scop. …...…….. 19
Crambe tataria Sebeok …….…….... 15, 23, 24, 25, 53, **54**
Crataegus monogyna Jacq. 19
Crataegus torminalis L. **156**
Crocus reticulatus Stev. ex Adams …….... 15, 16, 23, 24, 105, **106**
Crocus variegatus Hoppe et Hornsch. **106**
Cyperaceae Juss. ……..…... **67**
Cyperus fuscus L. 13
Cyperus glaber L. 13
Cyperus glomeratus L. …… 23, 67, **71**
Cyperus michelianus (L.) Link. ……... **72**
Cyperus michelianus (L.) Link. ……..….. **72**
Cyperus serotinus Rottb. ……..……..... **75**
Cytisus lindemannii V.Krecz. **84**
Cytisus rochelii Wierzb. **85**
Cytisus ruthenicus Fisch. ex Wołoszcz. **86**
Dianthus capitatus Balb. ex DC. …...……...…… 58, **60**
Dichostylis micheliana (L.) Nees ……..…… 13, 25, 67, **72**
Elatinaceae Dumort. …… **77, 78**
Elatine hydropiper L. ……..…… 24, 77, **78**
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. ……..… 13, 22, 67, **73**
Eleocharis euuniglumis Zinserl. ……. **74**
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. ……... 22, 67, **74**
Elytrigia repens (L.) Nevski 17, 20
Erodium ciconium (L.) L`Her. ……..... 23, 90, **91**
Erodium ruthenicum M.Bieb. ……..... 90, **92**
Erodium serotinum Stev. **92**
Euonymus nanus M.Bieb. ……..….. 23, 24, 61, **62**
Euonymus verrucosa Scop. 19
Euphorbia seguieriana Neck. 14

Fabaceae Lindl. …..... **79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89**
Festuca pratensis Huds. 17
Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. 11
Festuca valesiaca Gaudin 14, 15, 16
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 18
Frangula alnus Mill. 20
Fraxinus excelsior L. 18, 19
Geraniaceae Juss. ……..... **90, 91, 92, 93**
Geranium cyconium L. **91**
Geranium palustre L. ……..... 22, 90, **93**
Geranium sylvaticum L. 18
Goniolimon besserianum (Schult.) Kusn. ……..…
……..... 15, 16, 23, 128, **129**
Gnaphalium arenarium L. ……..... **43**
Gratiola officinalis L. ……..... 22, 161, **162**
Haplophyllum suaveolens (DC.) G.Don fil. ……..... 157, **158**
Helichrysum arenarium (L.) Moench 15, 16, 23, 24, 40, **43**
Hieracium glaucescens Bess. ……..……... **46**
Humulus lupulus L. 20
Hyacinthaceae Batsch …..... **94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101**
Hyacinthella leucophaea (C.Koch) Schur ……. 23, 24, 94, **96**
Hyacinthus sarmatica Pall. ex Georgi **95**
Hydrocharis morsus-ranae L. ……..... 102, **103**
Hydrocharitaceae Juss. ……..…..... **102, 103, 104**
Inula ensifolia L. 16
Inula helenium L. ……..……..……..... 24, 40, **44**
Inula hirta L. 16
Iridaceae Juss. ……..... **105, 106, 107, 108, 109**
Iris aphylla L. ……..……..….. 24, 105, **107**
Inula ensifolia L. 16
Inula helenium L. ……..……..... 24, 40, **44**
Inula hirta L. 16
Iridaceae Juss. ……..... **105**
Iris aequiloba Ledeb. **108**
Iris aphylla L. ……..……..… 24, 105, **107**
Iris hungarica Waldst. et Kit. **105, 107**
Iris pumila L. ……..... 15, 16, 23, 105, **108**
Iris variegata L. ……..... 16, 23, 105, **109**
Juncellus serotinus (Rottb.) Glarke ……..... 67, **75**
Juncus gerardii Loisel. 10, 11
Jurinea multiflora (L.) B.Fedtsch. 16
Koeleria cristata (L.) Pers. 15, 16
Lathyrus aphaca L. ……..……..... 79, **87**
Lemna polyrrhiza L. **111**
Lemnaceae S.F.Gray ……..……..…… **110, 111**
Lentibulariaceae Rich ……..… **112, 113**
Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr. ……..... 22, 94, **97**
Lepidium latifolium L. 11
Ligustrum vulgare L. 19
Limnanthemum peltatum S.G.Gmel. **120**
Limonium gmelinii (Willd.) O.Kuntze **130**
Limonium hypanicum Klokov ……..…..... 128, **130**
Linaceae DC. ex S.F.Gray ……..……... **114, 115**
Linum nervosum Waldst. et Kit. ……..……..... 114, **115**
Listera ovata (L.) R.Br. ……..……..... 23, 24, 125, **126**
Lolium perenne L. 17
Lunaria annua L. ……..……..... 23, 53, **55**
Lycopus europaeus L. 18

Lysimachia nummularia L. 18
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt ……..… 23, 63, **64**
Marsilea natans L. **160**
Medicago rigidula (L.) All. ……..… 23, 79, **88**
Medicago polymorpha L. var. *rigidula* L. **88**
Melanthiaceae Batsch ……..…….. **116, 117, 118**
Menyanthaceae Dumort. …… **119, 120**
Menyanthes nymphoides L. **120**
Muscari leucophaea C.Koch …….…..….. **96**
Muscari tenuiflorum Tausch **97**
Myogalum boucheanum Kunth **98**
Najadaceae Juss. ……..…….. **121, 122**
Najas minor All. **122**
Nepeta parviflora M.Bieb. 16
Nymphaea alba L. ……...…...12, 23, 24, 123, **124**
Nymphaea minoriflora (Simonk.) Wissjul. **124**
Nymphaeaceae Salisb ……..... **123, 124**
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) O.Kuntze .12,23,24,119, **120**
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. 16
Ophrys ovata L. **126**
Orchidaceae Juss. ……..……. **125, 126, 127**
Orchis chlorantha Cust. **127**
Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. .. 23, 24, 94, **98**
Ornithogalum divergens Boreau ….…….…… 22, 94, **99**
Ornithogalum kochii Parl. ....……..…… 24, 94, **100**
Ornithogalum refractum Schlecht. ….. 15, 16, 23, 24, 94, **101**
Ornithogalum tenuifolium Guss. **100**
Persicaria hydropiper (L.) Spach 13
Persicaria lapathifolia (L.) S.F.Gray 13, 18
Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey. et Scherb. 23, 24, 40, **45**
Phleum pratense L. 17
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 17, 20
Pilosella glaucescens (Bess.) Sojak ….……..…… 22, 40, **46**
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. ….. 23, 24, 25, 125, **127**
Plumbaginaceae Juss. …….. **128, 129, 130**
Poa angustifolia L. 15, 16
Poa pratensis L. 17, 20
Poa trivialis L. 17
Poaceae Barnhart ….... **131, 132, 133, 134, 135, 136, 137**
Podospermum molle (M.Bieb.) Fisch. et Mey. ……...…… **47**
Populus alba L. 20
Populus nigra L. 18, 20
Potamogeton berchtoldii Fieb. ……... 22, 138, **139**
Potamogeton compressus L. ……..…….. 25, 138, **140**
Potamogeton gramineus L. ……..…….. 138, **141**
Potamogeton heterophyllus Schreb. …..……..... **141**
Potamogeton lucens L. …..…… 138, **142**
Potamogeton natans L. ……...…… 138, **143**
Potamogeton pusillus auct., non L. **139**
Potamogeton zosterifolius Schumacher **140**
Potamogetonaceae Dumort. ……..… **138, 139, 140, 141, 142, 143**
Potentilla astracanica Jacq. ……...……..... 23, 150, **152**
Potentilla supina L. 13
Prunus spinosa L. 19
Prunus tenella Batsch **151**
Pseudolysimachion euxinum (Turrill) Holub **163**
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. 10
Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh. 10
Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb. …...…..... 23, 24, 144, **146**
Pulsatilla nigricans Störk **147**

Pulsatilla ucrainica (Ugr.) Wissjul. …….. 24, 144, **147**
Pyrethrum odessanum Klokov ……..…… **48**
Pyrus elaeagnifolia Pall. ……. 23, 25, 150, **153**
Quercus pubescens Willd. 19
Quercus robur L. 19
Ranunculaceae Juss. …..…… **144, 145, 146, 147**
Reseda inodora Reichenb. …….. 148, **149**
Resedaceae S.F.Gray ……..… **148, 149**
Rosa micrantha Borrer ex Smith ……..… 22, 150, **154**
Rosa pimpinellifolia auct. non L. **155**
Rosa tschatyrdagi Chrshan. …….. 22, 150, **155**
Rosaceae Juss. ……. **150, 151, 152, 153, 154, 155, 156**
Rubus caesius L. 18, 20
Rumex sanguineus L. 20
Ruta suaveolens DC. **158**
Rutaceae Juss. …… **157, 158**
Sagittaria sagittifolia L. 12
Salix alba L. 18, 20
Salix cinerea L. 20
Salix fragilis L. 18, 20
Salvia nutans L. 15, 16
Salvia pratensis L. 14, 16
Salvinia natans (L.) All. ……... 23, 24, 25, 159, **160**
Salviniaceae Dumort. ……..……..… **159, 160**
Sambucus nigra L. 20
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla …….. **76**
Scirpus acicularis L. …… **73**
Scirpus triqueter L. ……..…… 23, 67, **76**
Scirpus uniglumis Link …… **74**
Scorzonera mollis M.Bieb. ……..… 23, 24, 40, **47**
Scrophulariaceae Juss. ……..... **161, 162, 163**
Seseli tortuosum L. ……..……..… 23, 24, 32, **33**
Sorbus domestica L. 19
Sorbus torminalis (L.) Crantz ……..... 23, 24, 150, **156**
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. ……..… 22, 110, **111**
Statice besseriana Schult. **129**
Statice gmelinii Willd. **130**
Stellaria media (L.) Vill. 18
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. 23, 24, 25, 30, **31**
Stipa capillata L. 14, 15, 16
Stipa lessingiana Trin. et Rupr. ……..... 15, 16, 23, 24, 131, **133**
Stipa longifolia Borb. **136**
Stipa pennata L. ……..... 14, 23, 24, 131, **134**
Stipa pulcherrima C.Koch ……..... 14, 23, 24, 131, **135**
Stipa stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. **136**
Stipa tirsa Stev. ……..…….. 23, 24, 131, **136**
Stipa ucrainica P.Smirn. ……... 15, 16, 23, 24, 131, **137**
Stratiotes aloides L. 12
Suaeda prostrata Pall. 11
Swida sanguinea (L.) Opiz 20
Symphytum orientale L. …….. **52**
Symphytum tauricum Willd. 24, 51, **52**
Tamaricaceae Link ……... **164, 165**
Tamarix ramosissima Ledeb. ……..……. 164, **165**
Tanacetum odessanum (Klokov) Tzvel. ……..…..… 22, 40, **48**
Thymus marschallianus Willd. 15, 16
Trapa natans L. ……..…….. 12, 23, 24, 25, 166, **167**
Trapaceae Dumort. ……..……. **166, 167**
Trifolium turgidum M.Bieb. **89**
Trifolium vesiculosum Savi ……..…….. 24, 79, **89**

Tussilago hybrida L. ……..… **45**
Typha laxmannii Lepech. ……..…….. 23, 168, **169**
Typhaceae Juss. ……..…… **168, 169**
Ulmus glabra Huds. 18
Urtica dioica L. 18
Utricularia vulgaris L. ……...…….. 23, 112, **113**
Valeriana locusta L. γ. *coronata* L. **171**
Valerianaceae Batsch …..…….. **170, 171**
Valerianella coronata (L.) DC. …...…….. 170, **171**
Vallisneria spiralis L. ……...……... 23, 102, **104**
Vallisneria spiralis L. ……...……..... 23, 102, **104**
Verbascum phoeniceum L. 16
Veratrum nigrum L. ……...…….. 23, 24, 116, **118**
Veronica euxina Turrill ……..…… 25, 161, **163**
Veronica gryniana Klokov **163**
Viburnaceae Juss. ……..……...… **172, 173**
Viburnum opulus L. …..…… 20, 23, 172, **173**
Vitaceae Juss. ……...……..… **174, 175**
Vitis sylvestris C.C.Gmel. …….. 20, 23, 174, **175**

Алфавитный указатель румынских названий растений

Aliacee **28**
Alismatacee **26**
Alunele comprimate 40, **41**
Alunele palid-galbene 40, **42**
Amarilidacee **30, 31**
Apărătoare Beser 128, **129**
Apiacee **32, 33**
Aracee **34, 35**
Aron oriental 34, **35**
Asparagacee **36, 37, 38, 39**
Asteracee **40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48**
Belevalie sarmaţiană 94, **95**
Berberidacee **49, 50**
Boraginacee **51, 52**
Brănduşă trifilă 116, **117**
Brasicacee **53, 54, 55**
Broscăriţă Berhtold 138, **139**
Broscăriţă graminee 138, **141**
Broscăriţă lucioasă 138, **142**
Broscăriţă natantă 138, **143**
Broscăriţă turtită 138, **140**
Buhăiaş ovat 125, **126**
Burdujă comună 112, **113**
Campanulacee **56, 57**
Captalan 40, **45**
Cariofilacee **58, 59, 60**
Caulinie minoră 121, **122**
Călin comun 172, **173**
Cănăriţă glutinoasă 58, **59**
Ceapă paniculată 28, **29**
Celastracee **61, 62**
Celnuşă divergentă 94, **99**
Celnuşă Koch 94, **100**
Celnuşă 94, **98**
Celnuşă răsfrântă 94, **101**
Ciperacee **67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76**
Ciufă glomerată 67, **71**
Clopoţel persicifoliu 56, **57**
Convalariacee **63, 64**
Convolvulacee **65, 66**
Cornaci natant 166, **167**
Coşaci acaul 79, **82**
Coşaci alburiu 79, **80**
Coşaci pontic 79, **83**
Dediţel montan 144, **146**
Dediţel ucrainean 144, **147**
Dihostil Micheli 67, **72**
Dracilă comună 49, **50**
Drob Lindeman 79, **84**
Drob Roşel 79, **85**
Drob rusesc 79, **86**
Elatinacee **77, 78**

Fabacee ……..... **79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89**
Fetică coronată …… 170, **171**
Gălbinele …….. 157, **158**
Garofiţă capitată ……..…… 58, **60**
Geraniacee ……... **90, 91, 92, 93**
Geraniu palustru ……..... 90, **93**
Ghiocel-de-toamnă …….. 30, **31**
Hiacintacee ……..…… **94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101**
Hidrocaritacee ……..… **102, 103, 104**
Hodolean tătăresc …… 53, **54**
Iarba broaştelor …… 102, **103**
Iarbă mare …… 40, **44**
In multinervat ……..… 114, **115**
Iridacee …… **105, 106, 107, 108, 109**
Juncel tardiv ……..... 67, **75**
Lăptiucă moale …… 40, **47**
Lemnacee …… **110, 111**
Lentibulariacee …… **112, 113**
Leopoldie tenuifloră ……..... 94, **97**
Limbariţă graminee …… 26, **27**
Linacee …… **114, 115**
Lintiţă poliriză ……. 110, **111**
Lopăţea anuală ……..…… 53, **55**
Lucernă rigidiusculă …… 79, **88**
Măceş micrant …….. 150, **154**
Măceş-de-Ciatârdag ……..…… 150, **155**
Măzăroi afil ……..... 79, **87**
Melantiacee …….. **116, 117, 118**
Meniantacee ……..……..... **119, 120**
Migdal pitic ……...……. 150, **151**
Naiadacee ……... **121, 122**
Negară frumoasă …… 131, **135**
Negară Lesing ……..... 131, **133**
Negară penată …… 131, **134**
Negară piramidală ……..... 131, **136**
Negară ucraineană ……..... 131, **137**
Nimfă albă ……..... 123, **124**
Nimfeacee ……..... **123, 124**
Orhidacee ……... **125, 126, 127**
Papură Laxman ……. 168, **169**
Păr eleagnifoliu …….. 150, **153**
Peştişoară natantă ……... 159, **160**
Piperul apei ……..... 77, **78**
Pipiriguţ acicular ……..... 67, **73**
Pipiriguţ uniglum ……..... 67, **74**
Pliscul berzei …….. 90, **91**
Plumbaginacee ……... **128, 129, 130**
Plutică peltată ……..… 119, **120**
Poacee ……..……. **131, 132, 133, 134, 135, 136, 137**
Potamogetonacee ……... **138, 139, 140, 141, 142, 143**
Priboi rusesc ……... 90, **92**
Ranunculacee ……. **144, 145, 146, 147**
Rechie nemirositoare ……...….. 148, **149**
Resedacee ……...… **148, 149**
Rogoz cariofiloid ……..... 67, **68**
Rogoz pseudociperoid ……... 67, **69**

Rogoz rizineu …… 67, **70**
Rosacee …… **150, 151, 152, 153, 154, 155, 156**
Ruşcuţă vernală …… 144, **145**
Rutacee …… **157, 158**
Sadină …… 131, **132**
Salviniacee …… **159, 160**
Sârmuliţă spiralată …… 102, **104**
Scrântitoare astrachanică …… 150, **152**
Scrofulariacee ……… **161, 162, 163**
Sică hipanică …… 128, **130**
Siminoc arenicol …… 40, **43**
Sorb …… 150, **156**
Sparanghel medicinal …… 36, **37**
Sparanghel verticilat …… 36, **39**
Stânjenel scund …… 105, **108**
Stânjenel unghresc …… 105, **107**
Stânjenel vărgat …… 105, **109**
Strigoaie neagră …… 116, **118**
Stupiniţă verzuie …… 125, **127**
Şofrănel reticulat …… 105, **106**
Tamaricacee …… **164, 165**
Tamariscă rămuroasă …… 164, **165**
Tătănească de-Crimeea …… 51, **52**
Tifacee …… **168, 169**
Trapacee …… **166, 167**
Trfoi veziculos …… 79, **89**
Ţipirig trigonal …… 67, **76**
Umbra iepurelui …… 36, **38**
Umbrăvioară bifolie …… 63, **64**
Valerianacee …… **170, 171**
Veninariţă medicinală …… 161, **162**
Veronică euxină …… 161, **163**
Vetrice-de-Odesa …… 40, **48**
Viburnacee …… **172, 173**
Viţă sălbatică …… 174, **175**
Vitacee …… **174, 175**
Volbură liniată …… 65, **66**
Vonicer pitic …… 61, **62**
Vulturiţă glaucescentă …… 40, **46**
Zambilă albicioasă …… 94, **96**
Zăvăcustă …… 79, **81**
Zmeoae şerpuitoare …… 32, **33**

Алфавитный указатель русских названий растений

Авран лекарственный ……..... 161, **162**
Адонис весенний ……...… 144, **145**
Аистник аистовый ……..... 90, **91**
Аистник русский ……..... 90, **92**
Амариллисовые ……..... **30, 31**
Ароидные ……..… **34, 35**
Аронник восточный …… 34, **35**
Астрагал беловатый ……..... 79, **80**
Астрагал бесстебельный ……..... 79, **82**
Астрагал понтийский ……. 79, **83**
Астрагал шерстистоцветковый …….. 79, **81**
Астровые ……..... **40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48**
Барбарис обыкновенный …… 49, **50**
Барбарисовые ……..… **49, 50**
Безвременник трехлистный ……116, **117**
Белокопытник гибридный …….. 40, **45**
Бельвалия сарматская ……..… 94, **95**
Бересклет карликовый ……...…. 61, **62**
Бересклетовые ……. **61, 62**
Бобовые ……..... **79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89**
Болотница игольчатая ……... 67, **73**
Болотница одночешуйная …….. 67, **74**
Болотноцветник щитолистный ……..…… 119, **120**
Бурачниковые ……..… **51, 52**
Валерианелла увенчанная …….. 170, **171**
Валериановые …….. **170, 171**
Валлиснерия спиральная ……..... 102, **104**
Вахтовые ……... **119, 120**
Вероника Гриня ……..... 161, **163**
Виноград лесной ……..... 174, **175**
Виноградовые ……..... **174, 175**
Водокрас обыкновенный ……..... 102, **103**
Водокрасовые …… **102, 103, 104**
Вьюнок линейчатый ……..... 65, **66**
Вьюнковые ……..... **65, 66**
Гвоздика головчатая ……..... 58, **60**
Гвоздиковые ……..... **58, 59, 60**
Герань болотная ……..... 90, **93**
Гераниевые …… **90, 91, 92, 93**
Гиацинтик светло-голубой ……..... 94, **96**
Гиацинтовые ……..... **94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101**
Гребенщик многоветвистый ……... 164, **165**
Гребенщиковые …… **164, 165**
Груша лохолистная ……... 150, **153**
Девясил высокий …….. 40, **44**
Дихостилис Микели ……..... 67, **72**
Жабрица извилистая ……..... 32, **33**
Злаки ……... **131, 132, 133, 134, 135, 136, 137**
Золотобородник цикадовый …… 131, **132**
Зонтичные ……..... ……...… **32, 33**
Ирисовые ……...… **105, 106, 107, 108, 109**
Калина обыкновенная ……... 172, **173**

Калиновые **172, 173**
Камыш трехгранный 67, **76**
Капустные **53, 54, 55**
Касатик венгерский 105, **107**
Касатик карликовый 105, **108**
Касатик пестрый 105, **109**
Катран татарский 53, **54**
Каулиния малая 121, **122**
Кермек южнобугский 128, **130**
Клевер пузырчатый 79, **89**
Ковыль красивейший 131, **135**
Ковыль Лессинга 131, **133**
Ковыль перистый 131, **134**
Ковыль узколистный 131, **136**
Ковыль украинский 131, **137**
Козелец мягкий 40, **47**
Колокольчик персиколистный 56, **57**
Колокольчиковые **56, 57**
Кувшинка белая 123, **124**
Кувшинковые **123, 124**
Ландышевые **63**
Лапчатка астраханская 150, **152**
Лен жилковатый 114, **115**
Леопольдия тонкоцветковая 94, **97**
Лук метельчатый 28, **29**
Луковые **28, 29**
Лунник однолетний 53, **55**
Льновые **114, 115**
Любка зеленоцветковая 125, **127**
Лютиковые **144, 145, 146, 147**
Люцерна жестковатая 79, **88**
Майник двулистный 63, **64**
Мелантиевые **116, 117, 118**
Миндаль низкий 150, **151**
Многокоренник обыкновенный 110, **111**
Наядовые **121, 122**
Норичниковые **161, 162, 163**
Окопник крымский 51, **52**
Орхидные **125, 126, 127**
Осока гвоздиковая 67, **68**
Осока корневищная 67, **70**
Осока ложносытевая 67, **69**
Осоковые **67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76**
Пижма одесская 40, **48**
Повойничек водяной перец 77, **78**
Повойничковые **77, 78**
Прострел горный 144, **146**
Прострел украинский 144, **147**
Птицемлечник Буше 94, **98**
Птицемлечник Коха 94, **100**
Птицемлечник преломленный 94, **101**
Птицемлечник расходящийся 94, **99**

Пузырчатка обыкновенная ……..… 112, **113**
Пузырчатковые ……..… **112, 113**
Ракитник Линдемана ……..... 79, **84**
Ракитник Рошеля ……..... 79, **85**
Ракитник русский ……..... 79, **86**
Рдест Берхтольда ……..... 138, **139**
Рдест блестящий ……..... 138, **142**
Рдест злаковый ……..... 138, **141**
Рдест плавающий …….. 138, **143**
Рдест сплюснутый ……..... 138, **140**
Рдестовые ……..… **138, 139, 140, 141, 142, 143**
Резеда непахучая ……..... 148, **149**
Резедовые ……..... **148, 149**
Рогоз Лаксмана ……..... 168, **169**
Рогозовые ……..... **168, 169**
Рогульник плавающий ……..... 166, **167**
Рогульниковые ……..... **166, 167**
Роза мелкоцветковая ……..... 150, **154**
Роза чатырдагская ……..... 150, **155**
Розовые …….. **150, 151, 152, 153, 154, 155, 156**
Рутовые ……..... **157**
Рябина глоговина ……..… 150, **156**
Ясковые ……...../.. **110, 111**
Сальвиниевые ……..... **159, 160**
Сальвиния плавающая ……..…….…… 159, **160**
Свинчатковые …….. **128, 139, 130**
Ситничек поздний ……67, **75**
Спаржа лекарственная …… 36, **37**
Спаржа мутовчатая ……..36, **38**
Спаржа тонколистная ……..… 36, **39**
Спаржевые ……..... **36, 37, 38, 39**
Сыть скученная ……..... 67, **71**
Тайник яйцевидный ……..…… 125, **126**
Тысячелистник бледножелтый …….. 40, **42**
Тысячелистник сжатый …….. 40, **41**
Углостебельник Бессера ……..…… 128, **129**
Цельнолистник душистый ……..… 157, **158**
Цмин песчаный ……..... 40, **43**
Частуха злаковидная ……..……..... 26, **27**
Частуховые ……..... **26, 27**
Чемерица черная …….. 116, **118**
Чилим ……..…… 166, **167**
Чина безлисточковая ……..… 79, **87**
Шафран сетчатый ……..……..... 105, **106**
Штернбергия зимовникоцветная ……..……..... 30, **31**
Ясколка клейкая …….. 58, **59**
Ястребиночка сизоватая …… 40, **46**

Алфавитный указатель латинских названий животных

Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) …..…… 373, **374**
Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) …. 282, 283, 284, 285, **286**
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 285, **287**
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) …..……...… 282, 285, **288**
Accipitridae (Vieillot, 1816) ……..……..… **285-302**
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) .....….. 183, 184, 242, **243**
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) ……. 475, **476**
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) ……..……. 475, **477**
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) …..... 475, **478**
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) …..…..… 475, **479**
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) …….. 444, **445**
Aegithalidae Reichenbach, 1850 ……..…… **303, 304**
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 303, **304**
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) ……..... 182, 184, 222, **223**
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) ……..…….. 305, **306**
Alaudidae Vigors, 1825 ……...……..…….... **305, 306, 307**
Alcedinidae Rafinesque, 1815 ……..…… **308, 309**
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 308, **309**
Ameles descolor (Charpentier, 1825) …… 183, 184, 220, **221**
Amphibia Linnaeus, 1758 ……...……..…..……. **249**
Anas acuta (Linnaeus, 1758) ……. 310, **311**
Anas clypeata (Linnaeus, 1758) …..…… 310, **312**
Anas crecca (Linnaeus, 1758) ……..…… 310, **313**
Anas penelope (Linnaeus, 1758) ……...…… 310, **314**
Anas plathyrhynchos (Linnaeus, 1758) ……..…….. 310, **315**
Anas querquedula (Linnaeus, 1758) ……...….. 310, **316**
Anas strepera (Linnaeus, 1758) …… 283, 284, 310, **317**
Anatidae Vigors, 1825 ……..... **310-331**
Anax imperator (Leach, 1815) ……...….....… 183, 184, 210, **211**
Animalia Linnaeus, 1758 ……..……..... **176**
Anser albifrons (Scopoli, 1769) ……..……..… 310, **318**
Anser anser (Linnaeus, 1758) ……..……... 310, **319**
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) ...…….. 282, 283, 284, 310, **320**
Anser fabalis (Lath, 1787) ……...……..… 310, **321**
Anthus campestris (Linnaeus. 1758) ……..... 395, **396**
Anthus pratensis (Linnaeus. 1758) ..……..... 282, 395, **397**
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) ……...……..... 395, **398**
Apatura iris (Linnaeus, 1758) ……...…… 183, 184, 222, **224**
Apatura metis (Freyer, 1829) …..……..… 183, 184, 185, 222, **225**
Apidae Latreille, 1802 ..…..……..… **186, 187, 188, 189**
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 283, 284, 285, **289**
Aquila clanga (Pallas, 1811) ……..... 282, 283, 284, 285, **290**
Aquila pomarina (Ch.L. Brehm, 1831) 282, 283, 284, 285, **291**
Ardea alba (Linnaeus, 1758) ……....… 282, 283, 332, **333**
Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) …..……..... 282, 283, 332, **334**
Ardeidae Leach, 1820 …….. **332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339**
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) ….....… 282, 283, 284, 332, **335**
Argynnis aglaja Linnaeus, 1758 ……..…….. 182, 184, 222, **226**
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) ...…..... 282, 283, 284, 467, **468**
Asio otus (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 467, **469**
Athene noctua (Scopoli, 1769) ……...……..... 282, 467, **470**
Aves Linnaeus, 1758 ……..... **280**

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) ……..…..... 282, 310, **322**
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) ……...……. 310, **323**
Aythya marila (Linnaeus, 1761) ……..……...… 310, **324**
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) …. 282, 283, 284, 310, **325**
Bombina bombina Linnaeus, 1761 ……..…….. 251, 255, **256**
Bombus argillaceus (Scopoli, 1763) ……... 183, 184, 186, **187**
Bombus ruderatus (Fabricius, 1775) ..…… 183, 184, 186, **188**
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) …...… 282, 283, 332, **336**
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) 283, 284, 310, **326**
Bufo bufo Linnaeus, 1758 ……...… 251, 252, **253**
Bufo viridis Laurenti, 1786 …….. 251, 252, **254**
Bufonidae J.E.Gray, 1825 …… **252, 253, 254**
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) ……...…….. 283, 285, **292**
Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) …...……..… 283, 285, **293**
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) …..... 283, 284, 285, **294**
Calidris alpina (Linnaeus, 1758) ……. 444, **446**
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) …...… 282, 444, **447**
Calidris minuta (Leisl. 1812) ……...……... 444, **448**
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) ……... 184, 204, **205**
Caprimulgidae Vigors, 1825 ……..…... **339, 340**
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) …..… 282, 339, **340**
Carabidae Latreille, 1802 ……..... **191 ,192, 193, 194**
Carabus clathratus Linnaeus, 1761 ..…….. 183, 184, 191, **192**
Carabus ullrichii (Germar, 1824) …… 183, 184, 191, **193**
Carabus variolosus (Fabricius, 1787) …..... 183, 184, 191, **194**
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) …...…….. 281, 373, **375**
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) ……..……..… 184,204, **206**
Cerambycidae Latreille, 1802 ……..…….. **195, 196, 197**
Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) …...…… 183, 184, 185, 195, **196**
Certhia familiaris (Linnaeus, 1758) ……..… 341, **342**
Certhiidae Leach, 1820 ……..……..…... **341, 342**
Cetoniidae Leach, 1815 ……..……..... **198, 199**
Charadriidae (Vigors, 1825) ……..……. **343, 344, 345**
Charadrius dubius (Scopoli, 1786) ……...…….... 343, **344**
Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) …...……..... 463, **464**
Chlidonias niger (Linnaeus. 1758) …...……...…. 463, **465**
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) ……...… 373, **376**
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) ……...…….. 282, 283, 346, **347**
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) ……..…..… 282, 283, 284, 346, **348**
Ciconiidae Gray, 1840 ……...……...…. **346, 347, 348**
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) …...…..... 282, 283, 284, 285, **295**
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) …...……..... 282, 285, **296**
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) …….. 282, 283, 284, 285, **297**
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 283, 284, 285, **298**
Clitellata Michaelsen, 1919 ……..…… **177**
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) …...……. 373, **377**
Coenagrionidae Kirby, 1890 ……..……..…….... **200, 201**
Colias chrysotheme (Esper, 1781) ...……..… 183, 184, 185, 233, **234**
Coluber caspius Linnaeus, 1758 ……...…… 268, 269, **270**
Colubridae Oppel, 1811 ……... **269, 270, 271, 272, 273, 273**
Columba oenas (Linnaeus. 1758) ……..... 282, 283, 284, 349, **350**
Columba palumbus (Linnaeus, 1758) …...……..... 282, 349, **351**
Columbidae (Illiger, 1811) ……... **349, 350, 351, 352, 353**
Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) …...….. 282, 283, 284, 354, **355**
Coraciidae Vigors, 1825 ……..……..... **354, 355**
Coronella austriaca Laurenti, 1768 ……...……... 268, 269, **271**

Corvidae Vigors, 1825 …... **356, 357, 358, 359, 360, 361, 362**
Corvus corax (Linnaeus, 1758) ……..…… 282, 356, **357**
Corvus cornix (Linnaeus, 1758) ……..…….. 281, 356, **358**
Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) ……..…… 281, 356, **359**
Corvus monedula (Linnaeus, 1758) …… 356, **360**
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) …..…… 419, **420**
Crex crex (Linnaeus, 1758) ……..… 282, 283, 432, **433**
Cricetidae Fischer-Waldheim, 1817 ……... **517, 518**
Cricetus cricetus Pallas, 1773 ……. 515, 516, 517, **518**
Crocedura leucodon Hermann, 1780 ……..... 515, 536, **537**
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) …..……. 282, 283, 310, **327**
Cygnus olor (Gmelin, 1789) ……..…… 282, 283, 310, **328**
Delichon urbica (Linnaeus, 1758) ……..…….. 381, **382**
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) …..……..… 423, **424**
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) ….....… 283, 423, **425**
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) …..……. 423, **426**
Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg) ….... 423, **427**
Discoglossidae Fitzinger, 1843 ……..… **255, 256**
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) ……... 332, **337**
Elaphe quatuorlineata Lacepede, 1789 …..….... 268, 269, **272**
Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758) ……. 183, 202, **203**
Elateridae Leach, 1815 ……..…..……..… **202, 203**
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) ...……..… 363, **364**
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 …..…….... 363, **365**
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) …..…….. 363, **366**
Emberizidae Vigors, 1831 ……..... **363, 364, 365, 366**
Emydidae Rafinesque, 1815 ……..…..... **275, 275, 276**
Emys orbicularis Linnaeus, 1758 ……...… 268, 275, **276**
Eptesicus serotinus Schreber, 1774 ……..... 515, 544, **545**
Erebidae Leach, 1815 …..……...…. **204, 205, 206, 207**
Erinaceidae G.Fischer, 1814 …… **519, 520**
Erinaceus europeus Barret-Hamilton, 1900 ……..... 515, 519, **520**
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) ……... 497, **498**
Erythromma lindenii (Sélys, 1840) …..……. 183, 184, 200, **201**
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) ….. 183, 184, 185, 204, **207**
Falco cherrug (I.E. Gray, 1834) ……..... 282, 283, 284, 367, **368**
Falco peregrinus (Tunstal, 1771) ……..... 282, 283, 284, 367, **369**
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) …..……..... 282, 367, **370**
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) ……..……..... 283, 367, **371**
Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) ...……..… 282, 283, 367, **372**
Falconidae Vigors, 1824 ……... **367, 368, 369, 370, 371, 372**
Felidae Fischer-Waldheim, 1817 ……... **521, 522**
Felis silvestris Schreber, 1777 ……..... 515, 516, 521, **522**
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) ……..…….. 401, **402**
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) ……..……..... 283, 401, **403**
Ficedula parva (Bechstein, 1794) ……..……..... 401, **404**
Formica rufa Linnaeus, 1761 ……..…..…….. 184, 185, 208, **209**
Formicidae Latreille, 1802 ……..……..……..... **208, 209**
Fringillidae Leach, 1820 ……..…..... **373, 374, 375, 376, 377, 378**
Fulica atra (Linnaeus, 1758) …… 432, **434**
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) ……... 444, **449**
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) …..……432, **435**
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) ……..…..……. 356, **361**
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) …… 379, **380**
Gaviidae Forster, 1788 ……..……..…..... **379, 380**
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 283, 284, 285, **299**

Hamearis lucina Linnaeus, 1758 …… 183, 184, 235, **236**
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) .. 282,283, 284, 285, **300**
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) .. 283,284,440, **441**
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) ……..…… 475, **480**
Hirudinidae Whitman, 1886 ……..……..….. **179, 180**
Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758) ……....…… 179, **180**
Hirundinidae Vigors, 1825 ……..…..… **381, 382, 383, 384**
Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) ……..…..…… 381, **383**
Hyla arborea Linnaeus, 1758 …….. 251, 257, **258**
Hylidae Rafinesque, 1815 ……... **257, 258**
Insecta (Linnaeus, 1758) ……....……... **181**
Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758 …..… 183, 184, 228, **229**
Jynx torquilla (Linnaeus, 1758) ……..…… 423, **428**
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 ……. 268, 277, **278**
Lacerta viridis Linnaeus, 1758 …… 268, 277, **279**
Lacertidae Bonoparte, 1831 ……..……..… **277, 278, 279**
Laniidae Rafinesque, 1815 ……...….. **358, 359, 360, 361**
Lanius collurio (Linnaeus, 1758) ……..…… 281, 385, **386**
Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) …..……..….. 284, 385, **387**
Lanius minor (Gmelin, 1788) ……...……..… 385, **388**
Laridae Vigors, 1825 …….……..... **389, 390, 391, 392**
Larus cachinnans Pallas, 1811 ……...…..... 389, **390**
Larus canus (Linnaeus, 1758) ……...…. 389, **391**
Larus ridibundus (Linnaeus, 1766) ……...……. 389, **392**
Leurorrhinia pectoralis Charpentier, 1825 .. 183, 185,210, **212**
Libellulidae Rambur, 1842 ……. **210, 211, 212**
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) ……. 282, 283, 444, **450**
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) ……..… 475, **481**
Locustella luscinioides (Savi, 1824) ……...…….. 475, **482**
Locustella naevia (Boddaert, 1783) ……..…… 475, **483**
Lucanidae Latreille, 1804 ……..……..…… **218, 219**
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) ……..... 183, 184, 185, 218, **219**
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) ……. 305, **307**
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) …….. 497, **499**
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) ……...… 283, 497, **500**
Lutra lutra Linnaeus, 1758 ……..... 515, 516, 525, **526**
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) …...…...… 183, 185, 213, **214**
Lycaenidae Leach, 1815 ……..... **213, 214, 215, 216, 217**
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) ...……..... 444, **451**
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) …..……. 183, 184, 185, 213, **215**
Mammalia Linnaeus, 1758 ……..……..... **513**
Mantidae Burmeister, 1838 ……..…….…..... **220, 221**
Martes foina Erxleben, 1777 ……..... 515, 525, **527**
Martes martes Linnaeus, 1758 ……..... 515, 525, **528**
Megascolia maculata (Drury, 1773) …….…… 183, 184, 239, **240**
Meles meles Linnaeus, 1758 ……..... 515, 525, **529**
Meropidae Rafinesque, 1815 ……..……..….. **393, 394**
Merops apiaster Linnaeus, 1758 …….. 281, 393, **394**
Microchiroptera Dobson, 1875 ……..…..... **541**
Micromys minutus Pallas, 1771 ……..... 515, 523, **524**
Milvus migrans (Boddaert, 1783) ...…….... 282, 283, 284, 285, **301**
Morimus asper funereus (Mulsant, 1862) 183, 184, 185, 195, **197**
Motacilla alba (Linnaeus, 1758) …….. 395, **399**
Motacilla flava (Linnaeus, 1758) …….. 395, **400**
Motacillidae Horsfield, 1821 ……..….. **395, 396, 397, 698, 699, 400**
Muridae Illiger, 1811 ……..……. **523, 524**

Muscicapa striata (Pallas, 1764) ……..... 401, **405**
Muscicapidae Vigors, 1825 …..……. **401, 402, 403, 404, 405**
Mustela erminea Linnaeus, 1758 …… 515, 525, **530**
Mustela lutreola Linnaeus, 1761 …… 515, 516, 525, **531**
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 …….. 515, 525, **532**
Mustela putorius Linnaeus, 1758 …..…… 515, 525, **533**
Myotis bechsteinii Kuhl, 1817 …… 515, 516, 544, **546**
Myotis dasycneme Boie, 1825 …… 515, 516, 544, **547**
Myotis daubentonii Kuhl, 1817 ……..... 515, 544, **548**
Myotis mystacinus Kuhl, 1817 ……..... 515, 544, **549**
Myoxidae ……..... **534, 535**
Myoxus glis (Linnaeus, 1766) ……..... 515, 534, **535**
Natrix tessellata Laurenti, 1768 ……..…… 268, 269, **273**
Neomys anomalus Cabrera, 1907 ……... 515, 536, **538**
Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) …. 182, 184, 213, **216**
Neptis sappho (Pallas, 1771) ……... 183, 184, 185, 222, **227**
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) .. 282, 283, 284, 444, **452**
Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 …….... 515, 516, 544, **550**
Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 ……..... 515, 544, **551**
Nyctalus noctua Schreber, 1774 ……..... 515, 544, **552**
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) ……. 332, **338**
Nymphalidae Rafinesque, 1815 … **222, 223,224, 225,226,227**
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) …… 497, **501**
Onconotus servillei (Fischer von Waldheim, 1846) .....
.....…..….....…… 183, 185, 246, **247**
Oriolidae (Vigors, 1825) ……...……..……...… **406, 407**
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) …… 406, **407**
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) ..…… 183, 184, 237, **238**
Otus scops (Linnaeus, 1758) …..……..... 282, 283, 284, 467, **471**
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) ...…….. 282, 283, 284, 408, **409**
Pandionidae (Bonoparte, 1854) ……...……..….... **408, 409**
Panuridae Des Murs, 1860 ..... **410, 411**
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 410, **411**
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) ……...….... 183, 184, 228, **230**
Papilionidae Latreille, 1802 ……..…… **228, 229, 230, 231, 232**
Paridae Vigors, 1825 ……...……..……... **412, 413, 414**
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) … 183, 184, 185, 228, **231**
Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) ...…… 412, **413**
Parus major (Linnaeus, 1758) …..……..... 281, 412, **414**
Pelecanidae Rafinesque, 1815 ……...……..……..… **415, 416**
Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758) 282, 283, 284, 415, **416**
Pelobates fuscus Laurenti, 1768 ……...…… 251, 259, **260**
Pelobatidae Bonoparte, 1850 …..……...…...… **259, 260**
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) ……. 419, **421**
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) ...…….. 282, 283, 285, **302**
Phalacrocorocidae Reichenbach, 1849 ..…….. **417, 418**
Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773) 282, 283, 284, 417, **418**
Phasianidae Horsfield, 1821 ……..……...…… **419, 420, 421, 422**
Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) …...…….....… 283, 419, **422**
Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) …..…….…… 444, **453**
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) ……..…… 497, **502**
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) …… 497, **503**
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) ……..…475, **484**
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) ……..... 475, **485**
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) ……..… 475, **486**
Pica pica (Linnaeus, 1758) …… 356, **362**

Picus canus Gmelin, 1788 ……..…… 423, **429**
Pieridae Duponchel, 1835 ……..……..…. **233, 234**
Picidae Vigors, 1825 .....… **423, 424, 425, 426, 427, 428, 429**
Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 ……..... 515, 544, **553**
Pipistrellus nathusii Keyserling, 1839 ……... 515, 544, **554**
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 …….. 544, **555**
Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 …… 544, **556**
Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) . 282, 283, 284, 492, **493**
Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) ….....
.....… 183, 184, 185, 213, **217**
Plecotus austriacus Fischer, 1829 ……..... 515, 544, **557**
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) . 282, 283, 284, 492, **494**
Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) ……..……... 282, 430, **431**
Podicipedidae Bonoparte, 1831 ……....…..... **430, 431**
Porzana parva (Scopoli, 1769) ……... 283, 432, **436**
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) ……..... 283, 432, **437**
Porzana pusilla (Pallas, 1776) ...……....… 283, 432, **438**
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) .....
..... 183, 184, 185, 242, **244**
Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767) ….. 183, 184, 198, **199**
Rallidae Bonoparte, 1831 ……..…… **432-439**
Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) ……..…… 432, **439**
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 …...…… 251, 261, **262**
Ranidae Rafinesque, 1814 ……...…..…. **261, 262**
Recurvirostridae (Bonoparte, 1854) ……..…..…..... **440, 441**
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) ……...…… 283, 442, **443**
Remizidae Olphe-Galliard, 1891 ……....…..... **442, 443**
Reptilia Laurenti, 1768 ……...……..……..... **266**
Rhinolophidae Gray, 1825 ……....… **542, 543**
Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 ..... 515, 516, 542, **543**
Riodinidae Grote, 1895 …...……....… **235, 236**
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) ……....… 283, 381, **384**
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) …...…... 282, 283, 284, 310, **329**
Saga pedo (Pallas, 1771) ……..……..…… 246, **248**
Salamandridae Goldfuss, 1820 ……..……..……. **263, 264, 265**
Saturnia pyri (Denis et Schiffermüller, 1775) ….. 183, 184, 242, **245**
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) ……....… 497, **504**
Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) …….. 497, **505**
Scarabaeidae Latreille, 1802 ……..……..….....… **237, 238**
Scolia hirta (Schrank, 1781) ……..…… 183, 184, 239, **241**
Scoliidae Latreille, 1802 ……..…….. **239, 240, 241**
Scolopacidae Vigors, 1825 ……...……..…….....… **444**
Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) ...……..... 444, **454**
Sitta europaea (Linnaeus, 1758) ……..... 461, **462**
Sittidae Lesson, 1828 ……..……..……..... **461, 462**
Sorex araneus Linnaeus, 1758 ……..... 515, 536, **539**
Sorex minutus Linnaeus, 1758 ……..... 515, 536, **540**
Soricidae G.Fischer, 1817 ……..... **536, 537, 538, 539, 540**
Sphingidae Latreille, 1802 ……...……..….... **242, 243, 244, 245**
Spinus spinus (Linnaeus, 1758) …..…….. 373, **378**
Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) …...……...… 463, **466**
Sternidae Bonoparte, 1838 ……..……..... **463, 464, 465, 466**
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) ……..... 349, **352**
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) ...……..…… 282, 349, **353**
Strigidae (Vigors, 1825) ……..... **467, 468, 469, 470, 471, 472**
Strix aluco (Linnaeus, 1758) ...……..… 283, 467, **472**
Sturnidae (Rafinesque, 1815) ……..……....… **473, 474**
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 …...…….....… 281, 473, **474**

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) ……. 281, 475, **487**
Sylvia borin (Boddaert, 1783) ……..… 475, **488**
Sylvia communis (Latham, 1787) …….. 475, **489**
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) ……..…… 475, **490**
Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) ……. 475, **491**
Sylviidae Vigors, 1825 ……...…… **475-491**
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) …. 282, 283, 284, 310, **330**
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) ……. 282, 283, 310, **331**
Tettigoniidae Krauss, 1902 ……..…….. **246, 247, 248**
Treskiornithidae (Richmond, 1917) ……..… **492, 493, 494**
Tringa erythropus (Pallas, 1764) ……...……..…… 444, **455**
Tringa glareola (Linnaeus, 1758) ……...…… 444, **456**
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) ……...… 444, **457**
Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) …...…….. 444, **458**
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) ……... 284, 444, **459**
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) ……...……..… 444, **460**
Triturus cristatus Laurenti, 1786 …...……..… 251, 263, **264**
Triturus vulgaris Laurenti, 1786 ……. 251, 263, **265**
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) ……. 495, **496**
Trogloditidae Swainson, 1832 ……..…….…… **495, 496**
Turdidae (Rafinesque, 1815) ……..... **497**
Turdus iliacus (Linnaeus, 1766) …… 282, 497, **506**
Turdus merula (Linnaeus, 1758) ……... 281, 497, **507**
Turdus philomelos (Brehm, 1831) ……....… 281, 497, **508**
Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) ……..... 497, **509**
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 ……. 497, **510**
Upupa epops Linnaeus, 1758 ……..... 283, 511, **512**
Upupidae Leach, 1820 ……...……...… **511, 512**
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) …...……..... 282, 343, **345**
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 ……..... 515, 544, **558**
Vespertilionidae Gray, 1821 ……..…….... **544**
Xylocopa valga Gerstäcker, 1872 ……...… 183, 184, 186, **189**
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) ……...…... 183, 184, 186, **190**
Zamenis longissimus Laurenti, 1768 ……...……..... 268, 269, **274**
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermüller, 1775) ….....
.....……… 183, 184, 185, 228, **232**

Алфавитный указатель румынских названий животных

Anatide ……..……..…. **310-331**
Animale ……..…… **176**
Accipitride ……..... **285-302**
Acvilă de-munte ……..…… 285, **289**
Acvilă pitică …… 285, **300**
Acvilă ţipătoare mare …….. 285, **290**
Acvilă ţipătoare mică ……... 285, **291**
Aegitalide …… **303, 304**
Alaudide …….. **305, 306, 307**
Albăstrița argintie …… 213, **217**
Albăstrița cimbrișorului ……... 213, **215**
Albăstrița măcrișului ……...…… 213, **214**
Albină valgă ……...… 186, **189**
Albină violetă ……..… 186, **190**
Alcedinide ……... **308, 309**
Amfibieni …… **249**
Anatide …… **310**
Arctiidă-Hera ……..…… 204, **207**
Ardeide ……..... **332, 333, 334, 335, 336, 337, 338**
Arici comun ……. 519, **520**
Barză albă …… 346, **347**
Barză neagră …… 346, **348**
Bătăuș …….. 444, **453**
Becațină comună ……. 444, **449**
Becațină mică …….. 444, **451**
Boicuș …….. 442, **443**
Bondar de-argilă ……..… 186, **187**
Bondar roșiatic ……..……..… 186, **188**
Botgros ……..... 373, **377**
Broasca țestoasă de-apă ……..….. 275, **276**
Broasca brună de-câmp ……..... 259, **260**
Broască râioasă sură ……..... 252, **253**
Broască râioasă verde ……..……..... 252, **254**
Broască roşie de-pădure ……..... 261, **262**
Brotăcel ……..... 257, **258**
Bufonide ……... **252, 253, 254**
Buhai de-baltă ……..... 332, **336**
Buratic ……..... 257, **258**
Bursuc ……..... 525, **529**
Cal de-stepă ……..... 246, **248**
Calimorfă dominula ……..... 204, **205**
Capântortură ……...……..... 423, **428**
Caprimulg ……..... 339, **340**
Caprimulgide ……... **339, 340**
Carabidă clatratus ……..…… 191, **192**
Carabidă vario ……..... 191, **194**
Carabida-lui-Ulrih ……..... 191, **193**
Carabide ……...… **191, 192, 193, 194**
Catocala zmeurului …….. 204, **206**
Călifar alb ……..... 310, **331**
Călifar roșu ……..... 310, **330**
Călugărița incoloră ……..... 220, **221**
Cânepar ……..... 373, **374**
Cârstel de-baltă ……..... 432, **439**

Cerambicide ……..…… **195, 196, 197**
Certiide …… **341, 342**
Cetoniide ……..... **198, 199**
Cetonischemă aeruginosa ……..... 198, **199**
Charadriide …….. **343, 344, 345**
Chiră de-baltă …….. 463, **466**
Chirighiţă-cu-obraji-albi …….. 463, **464**
Chirighiţă neagră ……. 463, **465**
Chițcan comun …… 536, **539**
Chițcan-cu-abdomen-alb …….. 536, **537**
Chițcan mic …….. 536, **540**
Chițcan-mic-de-apă ……. 536, **538**
Ciconiide …….. **346, 347, 348**
Cioară de-semănătură …….. 356, **359**
Cioară grivă …… 356, **358**
Ciocănitoare de-grădini ……... 423, **427**
Ciocănitoare de-stejar …….. 423, **425**
Ciocănitoare pestriță mare ……... 423, **424**
Ciocănitoare pestriță mică ……..…… 423, **426**
Ciocârlie de-câmp …… 305, **306**
Ciocârlie de-pădure ……. 305, **307**
Ciuf de-câmp ……... 467, **468**
Ciuf de-pădure ……. 467, **469**
Ciuf pitic …….. 467, **471**
Cocoșar …… 497, **509**
Codalb ……. 285, **299**
Codița albastră de-stejar …….. 213, **216**
Codobatură albă ……... 395, **399**
Codobatură galbenă ……... 395, **400**
Codroș de-munte ……..... 497, **502**
Codroș de-pădure ……... 497, **503**
Coenagrionide ……..…….. **200, 201**
Cojoaică de-pădure …… 341, **342**
Colubride ……..... **269, 270, 271, 272, 273, 274**
Columbide ……..... **349, 350, 351, 352, 353**
Coraciide ……..... **354, 355**
Corb ……... 356, **357**
Corcodel mic ……..…. 430, **431**
Cormoran mic ……..... 417, **418**
Corvide ……**6, 357, 358, 359, 360, 361, 362**
Cosașul-lui-Servillei …….. 246, **247**
Coțofană …….. 356, **362**
Cresteţ cenuşiu ……..... 432, **436**
Cresteţ mic …….. 432, **438**
Cresteț pestriț …….. 432, **437**
Cricetide ……..... **517, 518**
Cristel de-câmp …….. 432, **433**
Croitor cenușiu …….. 195, **197**
Croitor-mare-al-stejarului ……..…….. 195, **196**
Cucuvea …….. 467, **470**
Cufundar polar ……... 379, **380**
Culic mare …….. 444, **452**
Dihor de-pădure …….. 525, **533**
Discogloside ……..…… **255, 256**
Dumbrăveancă ……... 354, **355**
Egretă mare …… 332, **333**

Egretă mică 332, **337**
Elateride **202, 203**
Emberizide **363, 364, 365, 366**
Emidide **275, 276**
Erebide **204, 205, 206, 207**
Erete de-stuf 285, **296**
Erete sur 285, **298**
Erete vânăt 285, **297**
Erinaceide **519, 520**
Falacrocorocide **417, 418**
Falconide **367, 368, 369, 370, 371, 372**
Fasianide **419, 420, 421, 422**
Fazan 419, **422**
Fâsă de-câmp 395, **396**
Fâsă de-luncă 395, **397**
Fâsă de-pădure 395, **398**
Felide **521, 522**
Florinte 373, **376**
Fluierar-cu-picioare-roşii 444, **460**
Fluierar-cu-picioare-verzi 444, **457**
Fluierar de-lac 444, **459**
Fluierar de-mlaștină 444, **456**
Fluierar de-munte 444, **445**
Fluierar de-zăvoi 444, **458**
Fluierar negru 444, **455**
Fluture Aglaia 222, **226**
Fluture-Apolon-negru 228, **231**
Fluture-cap-de-mort 242, **243**
Fluture-cu-irizații 222, **224**
Fluture Mahaon 228, **230**
Fluture metis 222, **225**
Fluture pestriț de-pădure 235, **236**
Fluture pestriț sapfo 222, **227**
Fluture podalir 228, **229**
Fluture polixena 228, **232**
Formicide **208, 209**
Fringilide **373, 374, 375, 376, 377, 378**
Frunzăriță galbenă 475, **480**
Fugaci de-ţărm 444, **446**
Fugaci mic 444, **448**
Fugaci roşcat 444, **447**
Furnica roșie 208, **209**
Gaie neagră 285, **301**
Gaiță 356, **361**
Gaviide **379, 380**
Găinușă de-baltă 432, **435**
Gălbioară aurie 233, **234**
Gândac-rinocer 237, **238**
Gârliță mare 310, **318**
Gârliţă mică 310, **320**
Gâscă-cu-gât-roșu 310, **329**
Gâscă de-semănătură 310, **321**
Gâscă de-vară 310, **319**
Ghionoaie sură 423, **429**

Grangur ……..… 406, **407**
Graur ……. 473, **474**
Greluşel de-stuf ……...…… 475, **482**
Greluşel de-zăvoi …….. 475, **481**
Greluşel pătat …… 475, **483**
Guguştiuc ……..... 349, **352**
Gușă vânătă …….. 497, **500**
Hârciog ……. 517, **518**
Hermelină ……. 525, **530**
Hilide …… **257, 258**
Hirudinidee ……..... **179, 180**
Hirundinide ……... **381, 382, 383, 384**
Huhurez de-pădure ……...…… 467, **472**
Insecte ……...… **181**
Izvoraş-cu-abdomen-roşu ……..… 255, **256**
Jder de-pădure …….. 525, **528**
Jder de-piatră …… 525, **527**
Lacertide ……... **277, 278, 279**
Laniide …….. **385, 386, 387, 388**
Laride ……..... **389, 390, 391, 392**
Lăcar de-mlaştină …… 475, **477**
Lăcar de-stuf …… 475, **479**
Lăcar mare ……..... 475, **476**
Lăcar mic …….. 475, **478**
Lăstun de-casă …….. 381, **382**
Lăstun de-mal ……..……..... 381, **384**
Lebădă de-iarnă ……..... 310, **327**
Lebădă de-vară ……..... 310, **328**
Libelulide …….……..... **210, 211, 212**
Libelulă de-baltă ……....… 210, **212**
Libelulă imperială ……..... 210, **211**
Libelula-lui-Linden ……..... 200, **201**
Licenide ……..... **213, 214, 215, 216, 217**
Liliac-cu-urechi-mari ……..... 544, **557**
Liliac târziu …… 544, **545**
Lipitoarea medicinală ……..... 179, **180**
Lipitori ……..... **177**
Lișiță …….... 432, **434**
Lopătar ……..... 492, **493**
Lucanide ……..... **218, 219**
Mamifere ……..... **513**
Mantide ……..... **220, 221**
Măcăleandru ……..…… 497, **498**
Mărăcinar mare ……... 497, **504**
Mărăcinar negru ……..... 497, **505**
Meropide ……..... **393, 394**
Microchiroptera ……..... **541**
Mierlă ……..... 497, **507**
Mioxide ……..... **534, 535**
Motacilide ……..... **395, 396, 397, 398, 399, 400**
Muride ……..... **523, 524**
Muscar gulerat ……..…… 401, **402**

Muscar mic 401, **404**
Muscar negru 401, **403**
Muscar sur 401, **405**
Muscicapide **401, 402, 403, 404, 405**
Mustelide **525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533**
Nagâț 343, **345**
Nevăstuică 525, **535**
Nictal gigantic 544, **550**
Nictal mic 544, **551**
Nictal roșcat 544, **552**
Nimfalide **222, 223, 224, 225, 226, 227**
Noptar Bechstein 544, **546**
Noptar-cu-mustăți 544, **549**
Noptar de-apă 544, **548**
Noptar de-iaz 544, **547**
Nurcă europeană 525, **531**
Ochi-de-păun-mare 242, **245**
Oriolide **406, 407**
Pandionide **408, 409**
Panuride **410, 411**
Papilionide **228, 229, 230, 231, 232**
Paride **412, 413, 414**
Pănțăruș 495, **496**
Păsări **280**
Pârș comun 534, **535**
Pelecanide **415, 416**
Pelican comun 415, **416**
Pelobatide **259, 260**
Pescăraș albastru 308, **309**
Pescăruș pontic 389, **390**
Pescăruș râzător 389, **392**
Pescăruș sur 389, **391**
Picide **423, 424, 425, 426, 427, 428, 429**
Piciorong 440, **441**
Pieride **233, 234**
Pietrar sur 497, **501**
Pipistrel de-pădure 544, **554**
Pipistrel Kuhli 544, **553**
Pipistrel mic 544, **556**
Pipistrel Natuzi 544, **554**
Pipistrel pitic 544, **555**
Pisica sălbatică 521, **522**
Pitulice fluierătoare 475, **486**
Pitulice mică 475, **484**
Pitulice sfârâitoare 475, **485**
Pițigoi albastru 412, **413**
Pițigoi codat 303, **304**
Pițigoi de-stuf 410, **411**
Pițigoi mare 412, **414**
Pocnitor roșcat 202, **203**
Podicipedide **430, 431**
Porumbac proserpin 242, **244**

Porumbel de-scorbură ……..…… 349, **350**
Porumbel gulerat …….. 349, **351**
Potârniche …….. 419, **421**
Prepeliță …… 419, **420**
Presură de-grădini ……. 363, **365**
Presură de-stuf …….. 363, **366**
Presură galbenă ……..... 363, **364**
Prigorie …… 393, **394**
Privighetoare de-zăvoi …….. 497, **499**
Prundăraș gulerat mic ……... 343, **344**
Pupăză …….. 511, **512**
Ralide ….....… **432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439**
Ranide ……... **261, 262**
Rață câraitoare ……..…… 310, **316**
Rață-cu-cap-castaniu …… 310, **322**
Rață-cu-cap-negru …… 310, **324**
Rață fluierătoare ……... 310, **314**
Rață lingurar ……. 310, **312**
Rață mare …….. 310, **315**
Rață mică …….. 310, **113**
Rață moțată ……... 310, **323**
Rață pestriță …….. 310, **317**
Rață roșie …….. 310, **325**
Rață sulițar …… 310, **311**
Rață sunătoare ……..... 310, **326**
Rădașcă ……..… 218, **219**
Rândunică ……..…… 381, **383**
Recurvirostride ……..... **440, 441**
Remizide ……..... **442, 443**
Reptile ……..... **266**
Rinolofid mic ……..... 542, **543**
Rinolofide ……..... **542, 543**
Riodinide ……..... **235, 236**
Salamandride ……..... **263, 264, 265**
Scarabeide ……..... **237, 238**
Scatiu …….. 373, **378**
Scoliide ……..… **239, 240, 241**
Scolopacide ……..... **444**
Sfingide ……..…… **242, 243, 244, 245**
Sfrâncioc-cu-fruntea-neagră ……... 385, **388**
Sfrâncioc mare ……..... 385, **387**
Sfrâncioc roșiatic ……..... 385, **386**
Silvie-cu-cap-negru ……..... 475, **487**
Silvie de-câmp ……..... 475, **489**
Silvie de-zăvoi ……..... 475, **488**
Silvie mică …….. 475, **490**
Silvie porumbacă ……..... 475, **491**
Silviide ……..... **491-475**
Sitar de-mal ……..... 444, **450**
Sitar de-pădure ……..... 444, **454**
Sitide ……...……..... **461, 462**
Soricide ……..... **536, 537, 538, 539, 540**

Stăncuță 356, **360**
Stârc de-noapte 332, **338**
Stârc galben 332, **335**
Stârc roşu 332, **334**
Sternide **463, 464, 465, 466**
Sticlete 373, **375**
Strigide **467, 468, 469, 470, 471, 472**
Sturnide **473, 474**
Sturz cântător 497, **508**
Sturz de-vâsc 497, **510**
Sturz de-vii 497, **506**
Şarpe-cu-abdomen-galben 269, **270**
Şarpe-cu-patru-dungi 269, **272**
Şarpe-de-alun 269, **271**
Şarpe-de-apă 269, **273**
Şarpele-lui-Esculap 269, **274**
Şerpar 285, **295**
Şoarece pitic 523, **524**
Şoim călător 367, **369**
Şoim dunărean 367, **368**
Şoimul rândunelelor 367, **370**
Şorecar comun 285, **292**
Şorecar încălțat 285, **293**
Şorecar roșu 285, **294**
Şopârla ageră 277, **278**
Şopârla cenuşie 277, **278**
Şopârla verde 277, **279**
Tettigoniide **246, 247, 248**
Tresciornitide **492, 493, 494**
Triton comun 263, **265**
Triton crestat 263, **264**
Trogloditide **495, 496**
Turdide **497-510**
Turturică 349, **353**
Țiclean 461, **462**
Ţigănuş 492, **494**
Uligan pescar 408, **409**
Uliu-cu-picioare-scurte 285, **286**
Uliu păsărar 285, **288**
Uliu porumbar 285, **287**
Upupide **511, 512**
Urzicar 222, **223**
Vânturel de-seară 367, **372**
Vânturel roșu 367, **371**
Vespertil bicolor comun 544, **558**
Vespertilionide **544**
Vidră 525, **526**
Viespar 285, **302**
Viespe gigant 239, **240**
Viespe stepică 239, **241**

Алфавитный указатель русских названий животных

Аист белый ……. 346, **347**
Аист черный …….. 346, **348**
Аистовые …… **346, 347, 348**
Американские пресноводные черепахи ……..… **275, 276**
Баклан малый …… 417, **418**
Баклановые …… **417, 418**
Балобан ……..…… 367, **368**
Барсук ……. 525, **529**
Бекас …… 444, **449**
Бекасовые ……... **444**
Белобровик ……. 497, **506**
Белозубка белобрюхая ……. 536, **537**
Белянки ……..… **233, 234**
Беркут ……. 285, **289**
Богомол бесцветный …… 220, **221**
Большой дубовый усач ……..…… 195, **196**
Большой ночной павлиний глаз …….. 242, **245**
Бражник мертвая голова ……..… 242, **243**
Бражник прозерпина …… 242, **244**
Бражники ……... **242, 243, 244, 245**
Бронзовка гладкая ……..…… 198, **199**
Бронзовки ……..… **198, 199**
Бурозубка малая ……..… 536, **540**
Вальдшнеп ……..…… 444, **454**
Варакушка …….. 497, **500**
Веретенник большой …… 444, **450**
Вертишейка …….. 423, **428**
Вечерница гигантская ……. 544, **550**
Вечерница малая …….. 544, **551**
Вечерница рыжая ……... 544, **552**
Водные беспозвоночные (зообентос) ……... **177**
Ворон …….. 356, **357**
Ворона серая ……... 356, **358**
Врановые ……..…… **356, 357, 358, 359, 360, 361, 362**
Выдра ……..... 525, **526**
Выпь большая …….. 332, **336**
Вьюрковые ……..... **373, 374, 375, 376, 377, 378**
Вяхирь ……..… 349, **351**
Гагара чернозобая ……... 379, **380**
Гагары ……..…..... **379, 380**
Галка ……..... 356, **360**
Гаршнеп ……..... 444, **451**
Гладконосые летучие мыши ……..... **544**
Гоголь ……..... 310, **326**
Голубиные ……..…… **349, 350, 351, 352, 353**
Голубянка аргирогномон ……..... 213, **217**
Голубянка арион ……....… 213, **215**
Голубянки ……..… **213, 214, 215, 216, 217**
Горихвостка обыкновенная ……..... 497, **503**
Горихвостка-чернушка …….. 497, **502**
Горлица кольчатая ……... 349, **352**
Горлица обыкновенная ……...… 349, **353**

Горностай 525, **530**
Грач 356, **359**
Гуменник 310, **321**
Гусь серый 310, **319**
Длиннохвостые синицы **303, 304**
Дозорщик-император 210, **211**
Дрозд певчий 497, **508**
Дрозд черный 497, **507**
Дрозд-деряба 497, **510**
Дроздовые **497**
Дрозд-рябинник 497, **509**
Дубонос 373, **377**
Дыбка степная 246, **248**
Дятел большой пестрый 423, **424**
Дятел малый пестрый 423, **426**
Дятел пестрый средний 423, **425**
Дятел седой 426, **429**
Дятел сирийский 423, **427**
Дятловые **423, 424, 425, 426, 427, 428, 429**
Еж обыкновенный 519, **520**
Ежовые **519, 520**
Жаба зеленая 252, **254**
Жаба обыкновенная 252, **253**
Жабы **252, 253, 254**
Жаворонковые **305, 306, 307**
Жаворонок лесной 305, **307**
Жаворонок полевой 305, **306**
Желтушка золотистая 233, **234**
Жерлянка краснобрюхая 255, **256**
Животные **176**
Жужелица золотоямчатая 191, **192**
Жужелица изменчивая 191, **194**
Жужелица Ульриха 191, **193**
Жужелицы **191, 192, 193, 194**
Жук-носорог 237, **238**
Жук-олень 218, **219**
Жулан 385, **386**
Зарянка 497, **498**
Зеленушка 373, **376**
Землеройка обыкновенная 536, **539**
Землеройковые **536, 537, 538, 539, 540**
Земноводные **249**
Зефир дубовый 213, **216**
Зимняк 285, **293**
Зимородковые **308, 309**
Зимородок 308, **309**
Змееяд 285, **295**
Ибисовые **492, 493, 494**
Иволга 406, **407**
Иволговые **406, 407**
Казарка белолобая 310, **318**
Казарка краснозобая 310, **329**
Каменка обыкновенная 497, **501**
Камышевка болотная 475, **477**
Камышевка дроздовидная 475, **476**
Камышевка тростниковая 475, **479**

Камышевка-барсучок 475, **478**
Камышница 432, **435**
Канюк 285, **292**
Каравайка 492, **494**
Кваква 310, **338**
Квакша обыкновенная 257, **258**
Квакши **257, 258**
Клинтух 349, **350**
Кобчик 367, **372**
Кожан двухцветный 544, **558**
Кожан поздний 544, **545**
Козодоевые **339, 340**
Козодой 339, **340**
Колпица 492, **493**
Конек лесной 395, **398**
Конек луговой 395, **397**
Конек полевой 395, **396**
Коноплянка 373, **374**
Коростель 432, **433**
Коршун черный 285, **301**
Кот лесной 521, **522**
Кошачьи **521, 522**
Крапивник 495, **496**
Крапивниковые **495, 496**
Крапивница 222, **223**
Краснозобик 444, **447**
Крачка белощекая 463, **464**
Крачка речная 463, **466**
Крачка черная 463, **465**
Крачковые **463, 464, 465, 466**
Кроншнеп большой 444, **452**
Круглоязычные **255, 256**
Кряква 310, **315**
Кулик-воробей 444, **448**
Куница каменная 525, **527**
Куница лесная 525, **528**
Куньи **525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533**
Курганник 285, **294**
Куропатка серая 419, **421**
Кутора малая 536, **538**
Лазоревка 412, **413**
Ласка 525, **532**
Ласточка береговая 381, **384**
Ласточка городская 381, **382**
Ласточка деревенская 381, **383**
Ласточковые **381, 382, 383, 384**
Лебедь-кликун 310, **327**
Лебедь-шипун 310, **328**
Ленточница малиновая 204, **206**
Лунь болотный 285, **296**
Лунь луговой 285, **298**
Лунь полевой 285, **297**
Лысуха 432, **434**
Лягушка прыткая 261, **262**
Лягушки настоящие **261, 262**
Малый зуек 343, **344**

Махаон 228, **230**
Медведица Гера 204, **207**
Медведица-госпожа 204, **205**
Медянка 269, **271**
Млекопитающие **513**
Мнемозина 228, **231**
Моримус темный 195, **197**
Муравьи **208, 209**
Мухоловка малая 401, **404**
Мухоловка серая 401, **405**
Мухоловка-белошейка 401, **402**
Мухоловка-пеструшка 401, **403**
Мухоловковые **401, 402, 403, 404, 405**
Мышиные **523, 524**
Мышь малютка 523, **524**
Насекомые **181**
Настоящие богомолы **220, 221**
Настоящие кузнечики **246, 247, 248**
Настоящие стрекозы **210, 211, 212**
Нетопырь карлик 544, **555**
Нетопырь лесной 544, **554**
Нетопырь малый 544, **556**
Нетопырь средиземноморский 544, **553**
Неясыть серая 467, **472**
Нимфалиды **222, 223, 224, 225, 226, 227**
Норка европейская 525, **531**
Ночница водяная 544, **548**
Ночница длинноухая 544, **546**
Ночница прудовая 544, **547**
Ночница усатая 544, **549**
Нырок белоглазый 310, **325**
Нырок красноголовый 310, **322**
Овсянка камышовая 363, **366**
Овсянка обыкновенная 363, **364**
Овсянка садовая 363, **365**
Овсянковые **363, 364, 365, 366**
Огарь 310, **330**
Орел-карлик 285, **300**
Орлан-белохвост 285, **299**
Осоед 285, **302**
Парусники **228, 229, 230, 231,232**
Пастушковые **432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439**
Пастушок 432, **439**
Пеганка 310, **331**
Пеликан розовый 415, **416**
Пеликановые **415, 416**
Пеночка-весничка 475, **486**
Пеночка-теньковка 475, **484**
Пеночка-трещотка 475, **485**
Перевозчик 444, **445**
Переливница ивовая 222, **224**
Переливница метида 222, **225**
Перепел 419, **420**
Пересмешка зеленая 475, **480**
Перламутровка Аглая 222, **226**
Пеструшка лесная 235, **236**

Пеструшка темнокрылая 222, **227**
Пискулька 310, **320**
Пищуха 341, **342**
Пищуховые **341, 342**
Пиявка медицинская 179, **180**
Пиявки **179, 180**
Пластинчатоусые **237, 238**
Поганка малая 430, **431**
Поганковые **430, 431**
Погоныш крошка 432, **438**
Погоныш малый 432, **436**
Погоныш обыкновенный 432, **437**
Подалирий 228, **230**
Подковонос малый 542, **543**
Подковоносые **542, 543**
Подорлик большой 285, **290**
Подорлик малый 285, **291**
Поликсена 228, **232**
Полоз желтобрюхий 269, **270**
Полоз четырехполосый 269, **272**
Полоз Эскулапов 269, **274**
Поползень 461, **462**
Поползни **461, 462**
Поручейник 444, **459**
Пресмыкающиеся **266**
Птицы **280**
Пустельга обыкновенная 367, **371**
Пчела-плотник 186, **189**
Пчёлы настоящие **186, 187, 188, 189, 190**
Ремез 442, **443**
Ремезовые **442, 443**
Ржанковые **343, 344, 345**
Риодиниды **235, 236**
Рогачи **218, 219**
Рукокрылые **541**
Рыжий лесной муравей 208, **209**
Саламандровые **263**
Сапсан 367, **369**
Сверчок обыкновенный 475, **483**
Сверчок речной 475, **481**
Сверчок соловьиный 475, **482**
Свиязь 310, **314**
Сизоворонка 354, **355**
Сизоворонковые **354, 355**
Синица большая 412, **414**
Синица длиннохвостая 303, **304**
Синица усатая 410, **411**
Синицевые **412, 413, 414**
Скворец обыкновенный 473, **474**
Скворцовые **473, 474**
Сколии **239, 240, 241**
Сколия волосатая 239, **241**
Сколия-гигант 239, **240**
Скопа 408, **409**
Скопиные **408, 409**
Славка садовая 475, **488**
Славка серая 475, **489**
Славка-завирушка 475, **490**

Славка-черноголовка 475, **487**
Славка-ястребинка 475, **491**
Славковые **475-491**
Сова болотная 467, **468**
Сова ушастая 467, **469**
Совиные **467, 468, 469, 470, 471, 472**
Сойка 356, **361**
Соколиные **367, 368, 369, 370, 371, 372**
Соловей обыкновенный 497, **499**
Соневые **534, 535**
Соня обыкновенная 534, **535**
Сорока 356, **362**
Сорокопут серый 385, **387**
Сорокопут чернолобый 385, **388**
Сорокопутовые **385, 386, 387, 388**
Сплюшка 467, **471**
Стрекоза болотная 210, **212**
Стрелка Линдена 200, **201**
Стрелки **200, 201**
Сыч домовый 467, **470**
Травник 444, **460**
Тритон гребенчатый 263, **264**
Тритон обыкновенный 263, **265**
Трясогузка белая 395, **399**
Трясогузка желтая 395, **400**
Трясогузковые **395, 396, 397, 398, 399, 400**
Турухтан 444, **453**
Тювик европейский 285, **286**
Удод 511, **512**
Удодовые **511, 512**
Уж водяной 269, **273**
Ужеобразные **269, 270, 271, 272, 273, 274**
Улит большой 444, **457**
Усатые синицы **410, 411**
Усачи **195, 196, 197**
Утиные **310**
Утка серая 310, **317**
Ушан серый 544, **557**
Фазан 419, **422**
Фазановые **419, 420, 421, 422**
Фифи 444, **456**
Ходулочник 440, **441**
Хомяк обыкновенный 517, **518**
Хомяковые **517, 518**
Хорек лесной 525, **533**
Цаплевые **332, 333, 334, 335, 336, 337, 338**
Цапля белая большая 332, **333**
Цапля желтая 332, **335**
Цапля малая белая 332, **337**
Цапля рыжая 332, **334**
Чайка озерная 389, **392**
Чайка-хохотунья 389, **390**
Чайка сизая 389, **391**
Чайковые **389, 390, 391, 392**
Чеглок 367, **370**
Чекан луговой 497, **504**

Чекан черноголовый 497, **505**
Червонец огненный 213, **214**
Черепаха болотная 275, **276**
Чернеть морская 310, **324**
Чернеть хохлатая 310, **323**
Чернозобик 444, **446**
Черныш 444, **458**
Чесночница обыкновенная 259, **260**
Чесночницы **259, 260**
Чибис 343, **345**
Чиж 373, **378**
Чирок-свистунок 310, **313**
Чирок-трескунок 310, **316**
Шевчук Сервиля 246, **247**
Шилоклювковые **440, 441**
Шилохвость 310, **311**
Широконоска 310, **312**
Шмель глинистый 186, **187**
Шмель красноватый 186, **188**
Пчела-плотник фиолетовый 186, **190**
Щегол 373, **375**
Щеголь 444, **455**
Щелкун краснокрылый 202, **203**
Щелкуны **202, 203**
Щурка золотистая 393, **394**
Щурковые **393, 394**
Эребиды **204, 205, 206, 207**
Ястребиные **285-302**
Ястреб-перепелятник 285, **288**
Ястреб-тетеревятник 285, **287**
Ящерица зеленая 277, **279**
Ящерица прыткая 277, **278**
Ящерицы настоящие **277, 278, 279**

Список литературы

1. Andreev A., Derjanschi V., Jurminschi S., Izverskaia T., Lala M., Kuharuk E., Sîrodoev G. Planurile manageriale pentru habitatele naturale şi agricole ale sectorului Purcari-Crocmaz din zona umedă a Nistrului. Societatea Ecologică ”Biotica”. Chişinău, 2002. 80 p.
2. Andreev A., Jura L., Şabanova G., Derjanschi V. Izverskaia T., Jurminschi S., Sîrodoev G., Talmaci I. Terenurile agricole de o valoare naturală înaltă. Societatea Ecologică ”Biotica”. Chişinău, 2007. 112 p.
3. Andreev A., Talmaci I., Şabanova G., Izverskaia T. şi a. Convenţia RAMSAR şi zonele umede de importanţă internaţională în Republica Moldova. Societatea Ecologică ”Biotica”. Chişinău, 2008. 84 p.
4. Atlasul speciilor de vertebrate (mamifere, reptile, amfibieni, pești) incluse în cadastrul regnului animal al Republicii Moldova, Chișinău, 2013. 100 c.
5. Bejenaru I., Andreev A., Sirodoev G. Ramsar site ”Lower Dniester (Nistru de Jos)” nr. 1316. http://www.ramsar.org/w.n.moldova_dniester.htm 2003
6. Bilz M., Kell S.P., Maxted N. and Landsdown R.V. European Red List of Vascular Plants. Luxembourg: Publications Office of European Union. 2011.
7. Bondarenco A.M. Fauna of bats of the Kitskansky wood (Moldova, Transdniester Region). Plecotus et al. 2006. Vol. 9. P. 18-24. [In Russian with English summary]. 630 p.
8. Cartea Roşie a plantelor vasculare din România /Gheorghe Dihoru, Gavril Negrean. Bucureşti: ”Editura Academiei Române”, 2009. 630 p.
9. Cartea Roşie a Republicii Moldova. Ed. III. Chişinău: ”Ştiinţa”, 2015. 492 p.
10. CITES. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Secretariat. 2011. http:/www.cites.org./
11. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Bern, Switzerland. 1979. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/104.htm.
12. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals. Bonn, 23 December 2002. https://www.cms.int/sites/default/files/publication/consolidated_part_I_and_II_en.pdf
13. Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds //Official Journal of the European Communities. 25 april 1979. P. 1-19.
14. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, O.J. L206, 22.07.92.1992. P. 0007-0050.
15. Ghendov V., Izverscaia T., Shabanova G. Distributional pattern of some rare feather-grasses (*Stipa*, *Poaceae*) in the flora of Republic of Moldova //Conservation of plant diversity. Intern. sc. symposium. Second ed. Chişinău: S. n., 2012. P. 161-167.
16. Ghendov V., Izverscaia T., Shabanova G. Pre-identified Red List of vascular plants in the flora of Republic of Moldova //Journal of Botany, 2012. Vol. IV, Nr. 1(5). P. 41-52.

17. Ghendov V., Izverscaia T., Shabanova G. Rare vascular plants of European importance in the flora of Republic of Moldova //Conservation of plant diversity. Intern. sc. symposium. Second ed. Chişinău: S. n., 2012. P. 155-161.
18. Ghendov V., Izverscaia T., Shabanova G. Threatened vascular plants of the natural flora of Republic of Moldova //Dendrology, floriculture and landscape gardening. Materials of Int. Sci. Conf. Vol. 2. Nikitsky Botanical Gardens, Yalta, Ukraine, June 5-8, 2012. P. 17.
19. Handbook of the Mammals of the World. Vol. 1-9 /Edited by Don E Wilson, Russell A.Mittermeier, Thomas E. Lacher. 2009-2019. https://www.lynxeds.info/sites/default/files/pdfs/Lynx%20Edicions_Families%20HMW%20Volumes.pdf
20. Interpretation manual of European Union Habitats – Eur28. European Commission DG Environment. Nature ENV B.3. 2013. 144 p.
21. IUCN. IUCN Red List of Threatened Species. http:/www.iucnredlist.org./
22. IUCN. IUCN Red List of Threatened Species. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/beetles/status.htm
23. Izverskaya T. The Current State of the Flora of Moldova and the Conservation of Rare Species //Russian Conservation News, 2000. N 24. P. 17-18.
24. Jurminschi S.D., Ţurcanu V.F. şi a. Date experimentale referitor la înmulüirea în condiüii de captivitate a speciei *Vipera ursini* //Mat. conf a III a Zoologilor din Moldova. Chişinău, 1995. P. 31-32.
25. Lumea animală a Moldovei /Cozari T., Usatâi M., Vladimirov M.Vol. 2. Peşti. Amfibieni. Reptile. Chișinău: ”Știința”. 152 p.
26. Lumea animală a Moldovei /Munteanu A., Cozari T., Zubcov N. Vol. 3. Păsări. Chișinău: ”Știința”. 220 p.
27. Munteanu A., Zubcov N. et al. Atlasul păsărilor din Republica Moldova. Chişinau: S.n., 2011. 100 p.
28. Neculiseanu Z., Stratan V., Vereşciaghin B., Ostaficiuc V. Insectele rare şi pe cale de dispariţie din Moldova. Chişinău: ”Ştiinţa”, 1992. 120 p.
29. Nordmann A. Notice sur les reptiles de la faune pontique //Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837, sous la direction de M. Anatole de Demidoff, par MM. de Sainson, le Play, Huot, Léveillé, Raffet, Rousseau, de Nordmann et du Ponceau; dédié à S.M. Nicolas 1er, Empereur de toutes les Russies. Paris: Ernest Bourdin et Ce, 1840. Vol. 3. P. 335-351.
30. Pânzaru P., Negru A., Izverschii T. Taxoni rari din flora Republicii Moldova. Chişinău, 2002. 148 p.
31. Planul de management pentru zona Ramsar ”Nistrul de Jos” /A. Andreev, E. Anikeev, P. Arnaut, I. Barcari, O. Bezman-Moseiko, A. Bondarenco, P. Gorbunenco, N. Grosu, V. Derjanschi, T. Izverscaia și a. Chișinău, 2017. 365 p. http://bioticamoldova.org/library/Plan%20managerial%20Nistrul%20de%20Jos.pdf
32. Registrul zonelor nucleu ale Reţelei Ecologice Naţionale a Republicii Moldova = Директория ключевых территорий Национальной экологической сети Республики Молдовы / aut.: A. Andreev, G. Şabanova, T. Izverskaia [et al.]. Ch.: „Elena-V.I.” SRL, 2012. 700 p.
33. Sawyer R.T. Leech biology and behavior // Oxford: Clarendon Press, 1986. Vol. 1-3. 1065 p.

34. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-1. https://www.iucnredlist.org/resources/walter1998
35. The Red Book of the Pepublic of Moldova. Chişinău: Î. E. P. ”Ştiinţa”, 2001. II edition. 287 p.
36. The Red Book of the Pepublic of Moldova. Chişinău: Î. E. P. ”Ştiinţa”, 2015. III edition. 492 p.
37. Tsurcanu V. Spreading and protection of the *Coronella austriaca* in Moldova //The biology and conservation of *Coronella austriaca*. Southgempton (UK), 1990.
38. Ţurcanu V. Parametrii care determină capacitatea componenţilor herpetofaunistici ai ecosistemului //Mat. conf. naţionale ecol. Cluj-Napoca, 1992. P. 120-121.
39. Ţurcanu V. Starea actuală a herpetofaunei din Moldova //Mat. conf. “Ecol. şi protec. mediului înc. în Moldova”. Chişinău, 1992. P. 80-81.
40. Utevsky, S., Zagmajster, M. & Trontelj, P. 2014. *Hirudo medicinalis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e. T10190A21415816.
41. www.plantarium.ru
42. www.wikipedia.org
43. Аверин Ю.В., Ганя И.М. Птицы Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1970. Т. 1. 240 с.
44. Аверин Ю.В., Ганя И.М., Зубков Н.И., Мунтяну А.И., Успенский Г.А. Птицы. Животный мир Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1981. 336 с.
45. Аверин Ю.В., Ганя И.М., Успенский Г.А. Птицы Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1971. Т. 2. 236 с.
46. Андреев А., Держанский В. Операционный список насекомых /Андреев А. Руководство по оценке территорий-ядер экологической сети. Кишинэу, 2014. С. 31-34. http://bioticamoldova.org/library/CoreAreasAssessment_Guide_rus.pdf
47. Андреев А. Руководство по оценке территорий-ядер экологической сети. Кишинэу, 2014. 50 с. http://bioticamoldova.org/ru/lib_bio.htm
48. Андреев А., Держанский В. К фауне чешуекрылых (*Lepidoptera*) Нижнего Днестра //Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра. Кишинев, 1999. С. 58-59.
49. Андреев А.В. О фауне *Odonata* Молдовы и стрекозах Талмазского участка Днестра //Проблемы сохранения биоразнообразия Среднего и Нижнего Днестра. Кишинев, 1998. С. 14-16.
50. Андреев А.В., Держанский В.В. Материалы по оценке видового разнообразия и редким видам дневных бабочек (Lepidoptera*:* Rhopalocera) //Managementul integral al resurselor naturale din bazinul transfrontalier al fluviului Nistru. Chisinau: ”Eco-Tiras”, 2004. P. 31-33.
51. Андреев А.В., Держанский В.В. Фауна стрекоз (Odonata) Молдовы: первые итоги //Anal. Şt. Univer. de Stat din Moldova. Seria ”Şt. Chem.-biol.” Chisinău, 2004. P. 170-173.
52. Андреев А.В., Шабанова Г.А., Цуркану В.Ф., Держанский В.В., Изверская Т.Д., Горбуненко П.Н. Степные экосистемы Нижнего Днестра //Bull. Şt. Revistă de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie. Chişinău, 2007. Vol. 6(19). P. 160-174.

53. Андреев В.Н. Деревья и кустарники Молдавии. Вып. 1, Изд. АН СССР, М.: Наука. 1957. 207 с.
54. Андреев В.Н. Растительность Молдавии и ее районирование // Научная конф. проф.-препод. состава, посвященная 10-летию Кишиневского гос. ун-та: Тез. докл. Кигшинев, 1953. С. 33-36.
55. Анисимов Е.П. О гнездовании и численности черного коршуна в Молдавии //Вопросы экологии и практического значения птиц и млекопитающих Молдавии. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1969. Вып. 4. С. 15-20.
56. Архипов А.М. Встречи редких и малочисленных видов птиц на Кучурганском водохранилище и в его окрестностях в 1997-2002 гг. // Авифауна України. Чернівці, 2002. С. 42-45.
57. Архипов А.М. О гибели птиц от столкновений с линиями электропередачи возле Кучурганского лимана в Одесской области //Современные проблемы зоологии и экологии. Материалы Международной конференции. Одесса: Феникс, 2005. С.8-9.
58. Архипов А.М. Численность и характер зимовки птиц на Кучурганском лимане и сопредельных территориях в 2001 г. //Мониторинг зимующих птиц в Азово-Черноморском регионе Украины. Одесса-Киев, 2002. С. 3-8.
59. Архипов А.М., Фесенко Г.В. Сведения о наблюдениях за редкими птицами в районе Кучурганского лимана //Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Мелитополь: Бранта, 2005. Вып. 8. С. 7-15.
60. Банников А.Г., Даревский И.С. и др. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. Москва: Просвещение. 1977. 414 с
61. Безман-Мосейко О.С. О видовом составе герпетофауны Приднестровья (предварительные данные) //Праці Українського герпетологічного товариства. К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2008. №1. С. 43-46.
62. Боркин Л.Я., Безман-Мосейко О.С., Мазепа Г.А., Зиненко А.И., Коршунов А.В., Лада Г.А., Шабанов Д.А., Литвинчук С.Н., Розанов Ю.М. О южной границе распространения гибридной *Rana esculenta (*Ranidae, Anura, Amphibia) на территории Украины и Молдовы: данные проточной ДНК-цитометрии //Праці Українського герпетологічного товариства. К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2008. №1. С. 5-10.
63. Браунер А.А. Гады Бессарабии. //Труды Бессарабского общества естествоиспытателей. Кишинев, 1907. Т. 1, вып. 2. С. 149-173.
64. Браунер А.А. Заметки о птицах Херсонской губернии, Одесса, 1894.
65. Браунер А.А. Материалы по энтомологической фауне Бессарабии. Заметки о стрекозах Бессарабии //Труды Бессарабского общества естествоиспытателей. Кишинев, 1912. Т. 2, вып. 1. С. 34-36.
66. Браунер А.А. Предварительное сообщение о пресмыкающихся и гадах Бессарабии, Херсонской губернии, Крыма и северо-западного Кавказа между Новороссийском и Адлером //Зап. Новоросс. об-ва естест. (Одесса). 1903. С. 43-51.
67. Браунер А.А. Третье предварительное сообщение о пресмыкающихся и земноводных губерний Сувалковской, Минской, Подольской, Черниговской, Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской и Днепровского уезда Таврической //Зап. Новоросс. об-ва естест. (Одесса). 1906. Т. 28. С. 1-12.

68. Витко К.Р. Экология гырнецовой дубравы в южной Молдавии. Кишинев, 1966. 95 с.
69. Ганя И.М. Зимний состав орнитофауны садов Молдавии //Труды института биологии МФ АН СССР. Кишинев, 1960. Т. 1. С. 125-130.
70. Ганя И.М. Некоторые данные о голубях и совах Бендерского лесхоза //Ученые записки Тираспольского педагогического института, 1957. Вып. 5. С. 225-235.
71. Ганя И.М. Орнитофауна сухопутных биотопов Молдавии, ее генезис и практическое значение: Автореф. дис. … докт. биол. наук. Кишинев, 1971.
72. Ганя И.М. Птицы сухопутных биотопов. Кишинев: Штиинца, 1978. 70 с.
73. Ганя И.М., Зубков Н.И. Птицы. Фауна биоценотических оазисов и ее практическое значение. Кишинев: Штиинца, 1990. С.125-173.
74. Ганя И.М., Зубков Н.И. Редкие и исчезающие виды птиц Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1989. 152 с.
75. Ганя И.М., Зубков Н.М. Значение биологических оазисов в обогащении орнитофауны агроценозов //Экологические охраны и воспроизводство лесных ресурсов Молдавии. Республиканская научно-практическая конференция. Кишинев, 1989. С. 116-119.
76. Гейдеман Т.С. Дубравы из дуба пушистого в Молдавии //Гербовецкий лес. Кишинев, 1970. С. 49-59.
77. Гейдеман Т.С. О геоботаническом районировании Молдавской ССР //Проблемы современной ботаники. М.-Л.: Наука, 1965. Т. 1. С. 295-299.
78. Гейдеман Т.С., Николаева Л.П. Редкие и исчезающие виды флоры Молдавии, подлежащие охране //Охрана природы Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1975. Вып. 13. С. 75-81.
79. Гейдеман Т.С., Николаева Л.П. Современное состояние и охрана флоры Молдавии //Известия АН МССР. Сер. биол. хим. наук. 1986. №3. С. 17-20.
80. Гусан Г.З. Кормовые участки «синичьих стай» и их использование птицами //Экология и охрана птиц и млекопитающих в антропогенном ландшафте. Кишинев, 1992. С. 30-44.
81. Гусан Г.З. Пролет и питание береговой ласточки в Молдавии //Миграции и практическое значение птиц Молдавии. Кишинев, 1980. С.137-144.
82. Гусан Г.З., Котяцы М.И. Структура осенне-зимних агрегаций насекомоядных видов птиц в пойменных лесах реки Днестр //Млекопитающие и птицы антропогенного ландшафта Молдавии и их практическое значение. Кишинев, 1986. С. 31-41.
83. Дидусенко А.М. Змеи Молдавии //Мат. науч. конф. по рез. раб. за 1965 г. Отд. природы. Изд-во КГУ. Кишинев, 1965. С. 74-75.
84. Дидусенко А.М. О видовом составе амфибий и рептилий Молдавской ССР //Тр. обьед. науч. сессии АН СССР. Кишинев, 1959. Т. 2. С. 325-327.

85. Директория ключевых территорий Национальной экологической сети Республики Молдовы /aut.: A. Andreev, G. Şabanova, T. Izverskaia [et al.]. Chişinău: „Elena-V.I.” SRL, 2012. 700 p.
86. Журминский С.Д. Население и динамика птиц Кучурганского лимана и побережий //Экология и охрана птиц и млекопитающих в антропогенном ландшафте. Кишинев, 1992. С. 41-50.
87. Журминский С.Д. Население птиц меандров правобережья Нижнего Днестра в летний период //Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра. Кишинев, 1999. С. 71-73.
88. Журминский С. Операционный список птиц /Андреев А. Руководство по оценке территорий-ядер экологической сети. Кишинэу, 2014. С. 37-38. http://bioticamoldova.org/library/CoreAreasAssessment_Guide_rus.pdf
89. Журминский С.Д. Фауна птиц пойменного леса на участке Нижнего Днестра (у сел Копанка-Талмазы-Чобручи) //Проблемы сохранения биоразнообразя Среднего и Нижнего Днестра. Кишинев, 1998. С. 55-57.
90. Журминский С.Д., Куниченко А.А. Гнездование и структура колоний цапель в низовьях Днестра //Млекопитающие и птицы антропогенного ландшафта Молдавии и их практическое значение. Кишинев, 1986. С. 60-69.
91. Зубков Н.И. Хищные птицы и совы Молдавии (биология, охрана и практическое значение): Дис. … канд. биол. наук. Кишинев, 1983. 224 с.
92. Зубков Н.И. Пролет, распределение и численность хищных птиц и сов Молдавии //Миграции и практическое значение птиц Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1980. С. 51-77.
93. Зубков Н.И. Трофические связи сов в биоценозах Молдавии //Экология птиц и млекопитающих Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1981. С. 79-94.
94. Изверская Т.Д., Гендов В.С. Флора и растительность узловых территорий экологической сети Республики Молдова в Рамсарском сайте «Нижний Днестр» //East European Scientific Journal. Warsaw, 2017. Vol. 1, Nr. 3(19). P. 8-17. (IF: 0.572).
95. Изверская Т.Д., Гендов В.С. Редкие виды сосудистых растений ключевых территорий национальной экологической сети Республики Молдова в Рамсарском сайте «Нижний Днестр» /Сборник научных статей «Экология. Окружающая среда. Состояние и перспективы». Бендеры, Изд.: "Полиграфист", 2016. С. 153-159.
96. Изверская Т., Гендов В., Ионица О., Тофан-Дорофеев Е., Рущук А. Редкие видов сосудистых растений международного, регионального и национального значения в Рамсарском сайте «Нижний Днестр», Республика Молдова //Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы особо охраняемых природных территорий-4». «Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии». 2020. №3, (в печати)
97. Изверская Т.Д., Гендов В.С., Тофан-Дорофеев, Е.В., Ионица О.В. Редкие виды сосудистых растений Рамсарского сайта ”Нижний Днестр” /Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра: Мат. науч.-практ. конф. (с международным участием), Тирасполь, 16-17 ноября 2018 г. Тирасполь: ”Eco-Tiras”, 2018. С. 86-91.

98. Изверская Т.Д., Гендов В.С., Тофан-Дорофеев Е.В., Ионица О.В. Современный состав флоры природных комплексов Рамсарского сайта ”Нижний Днестр”. *Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра:* Мат. науч.-практ. конф. (с международным участием), Тирасполь, 16-17 ноября 2018 г. Тирасполь: ”Eco-Tiras”, 2018. С. 92-99.
99. Изверская Т.Д., Гендов В.С., Шабанова Г.А. Флора и растительность узловой территории экологической сети Республики Молдова ”Чиобурчиу-Рэскэец” //Mediul ambiant, 2013. Nr. 5 (71). P. 29-33.
100. Изверская Т.Д., Гендов В.С., Шабанова Г.А., Рущук В.С., Рущук А.Д. Флористическое разнообразие природных биотопов “НАТУРА 2000” Рамсарского сайта “Нижний Днестр” //Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья: Мат. V Междунар. науч.-практ. конф. Тирасполь, 14 ноября 2014г. Тирасполь: Изд-во Приднестр. Ун-та, 2014. С. 100-104.
101. Изверская Т.Д., Шабанова Г.А. Редкие виды растений региона Нижнего Днестра //Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра. Материалы Международной конференции, Кишинев 16-17 сентября 2004 г. Кишинев, 2004. С. 138-141.
102. Изверская Т.Д., Шабанова Г.А., Гендов В.С. Биотопическое и флористическое разнообразие узловых территорий рамсарского сайта «Нижний Днестр» /Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional Rezervaţia „Codrii”: Rezervaţia ”Codrii” 40 ani. Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2011. P. 200-203.
103. Изверская Т.Д., Шабанова Г.А., Гендов В.С. Природные ботопы правобережной части Рамсарского сайта ”Нижний Днестр” //Управление бассейном трансграничной реки Днестр в рамках бассейнового Договора. Международная конференция. Кишинев, 20-21 сентября 2013 года. С. 372-378.
104. Изверская Т.Д., Шабанова Г.А., Гендов В.С. Участок степной растительности «Попяска», перспективный для охраны государством в Республике Молдова /Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional Rezervaţia ”Codrii”: Rezervaţia ”Codrii” 40 ani. Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2011. P. 197-200.
105. Изверская Т.Д., Шабанова Г.А., Гендов В.С. Флора и растительность лесного урочища «Копанка-Леунтя» /Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional Rezervaţia ”Codrii”: Rezervaţia ”Codrii” 40 ani. Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2011. P. 193-196.
106. Корчмарь Н.Д. Лесная куница в Молдавии //Вопросы экологии и практического значения птиц и млекопитающих Молдавии. Кишинев, 1969. Вып. 3. 85 с.
107. Корчмарь Н.Д. Некоторые данные о распространении, биологии и хозяйственном значении барсука в Молдавии //Вопросы экологии и практического значения птиц и млекопитающих Молдавии. Кишинев. 1962. 1962. Вып. 1. 87 с. Вып. 2. 74 с.
108. Котомина Л.В., Александрова Н. К фауне прямокрылых (Orthoptera) в окрестностях г. Тирасполь //Чтения памяти А.А. Браунера. Одесса: АстроПринт, 2003. С. 65-66.
109. Котомина Л.В., Шешницан С.С. Некоторые сведения о колеоптерофауне Нижнего Днестра //Управление бассейном трансграничной реки Днестр и Водная рамочная директива ЕС. Кишинев, 2008. С.174-177.

110.Котомина Л.В., Шешницан С.С. Редкие виды жесткокрылых (*Insecta, Coleoptera*) фауны нижнего Приднестровья //Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. Тирасполь: Приднестр. гос. ун-т, 2009. С. 103-105.
111.Котомина Л.В., Шешницан С.С. Энтомофауна Кицканского леса как объект изучения в период полевых практик (1993-2010 гг.) для студентов-биологов //Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными природными ресурсами. Тирасполь, 2010. С.112-114.
112.Красная книга Приднестровья /М-во природных ресурсов и экол. Контроля Приднестр. Молд. Респ. Тирасполь: Б. и., 2009. 376 с.
113.Куниченко А.А. Территориальное поведение лысухи и его адаптивное значение //Млекопитающие и птицы антропогенного ландшафта Молдавии и их практическое значение. Кишинев, 1986. С. 70-72.
114.Куниченко А.А., Тищенков А.А. Видовой состав птиц, зимующих на водоемах Приднестровья //Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетий. Одесса: АстроПринт, 2000. С. 11.
115.Куниченко А.А., Тищенков А.А. Динамика численности голенастых и веслоногих птиц, гнездящихся на озере Путрино //Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. Материалы Международной научно-практической конференции. Тирасполь: РИО ПГУ-ЭКОДНЕСТР, 2001. С. 145-146.
116.Куниченко А.А., Тищенков А.А. Необычные и редкие случаи зимовок птиц на Кучурганском лимане и других водоемах Южного Приднестровья //Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра. Кишинев: ”Biotica”, 1999. С. 117-119.
117.Куниченко А.А., Тищенков А.А. Необычные и редкие случаи зимовок птиц на Кучурганском лимане и других водоемах Южного Приднестровья //Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра. Материалы Международной конференции. Кишинев, 7-9 октября 1999. Кишинев: Экологическое общество ”Biotica”, 1999. С. 117-119.
118.Ливанов Н.А. Пиявки – *Hirudinea* /В кн.: Животный мир СССР. Л., 1937. С. 558-561.
119.Лозан М.Н. Грызуны Молдавии. Т. I. Кишинев: РИО АН МССР, 1970. 168 с.
120.Лукин Е.И. Географическое распространение пресноводных пиявок на территории СССР /Проблемы зоогеографии суши. Львов, 1958. С. 144-149
121.Мацюк В.А., Верещагина Т.К. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) пойменных экосистем нижнего Днестра //Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття. 2005. С. 241-242.
122.Медведев С.И., Шапиро Д.С. К познанию фауны жуков (Coleoptera) Молдавской ССР и сопредельных районов Украины //Тр. НИИ биологии и биологического факультета Харьковского госуниверситета. 1957. Т. 30. С. 173-206.
123.Мунтяну А. Операционный список млекопитающих /Андреев А. Руководство по оценке территорий-ядер экологической сети. Кишинэу, 2014. С. 35. http://bioticamoldova.org/library/CoreAreasAssessment_Guide_rus.pdf
124.Мунтяну А.И. Орнитофауна г. Тирасполя и его окрестностей //Ученые записки ТГПИ. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1970. Том 17. С. 24-26.

125.Мунтяну И.А. Водно-болотные охотничьи птицы Молдавии. Автреф. дисс. … канд. биол. наук. Киев, 1972. 17 с.
126.Назаренко Л.Ф. Колониально гнездящиеся птицы низовьев Днестра, их распространение, особенности экологии и практическое значение //Труды Второй Прибалтийской орнитологической конференции, Таллин, 1954 г. М., 1957. С. 361-365.
127.Назаренко Л.Ф. Орнитологическая фауна Нижнего Приднестровья и ее хозяйственное значение. Автореф. дисс. ...канд. биол. наук, Одесса, 1959. 20 с.
128.Назаренко Л.Ф. Эколого-фаунистическая характеристика орнитофауны низовьев Днестра и перспективы ее хозяйственного значения //Труды биологического факультета ОГУ, 1953. Т. 6. С. 139-155.
129.Николаева Л.П. Дубравы из пушистого дуба МССР. Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1963. 166 с.
130.Никонов Г.И. Медицинская пиявка: основы гирудотерапии. СПб.: СДС, 1998. 294 с.
131.Першина В.И. Структура и динамика авифауны Кицканского лесного комплекса //Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы. Мат-лы междунар. конф. Тирасполь: ”Eco-Tiras”, 2017. С. 288-291.
132.План управления Рамсарским сайтом «Нижний Днестр» /А. Андреев, Е. Аникеев, Г. Шабанова, Т. Изверская [и др.]; под общей ред. А. Андреева. Chişinău: „Elena-V.I.”. 2011. 574 p.
133.Пойрас А., Верещагин Б., Калестру Л. Жесткокрылые (Coleoptera: Chrysomelidae, Curculionidae) и тли (Homoptera: Aphidoidea) как компоненты биоразнообразия древесных насаждений бассейна р. Днестр //Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра. Кишинев, 2004. С. 237-238.
134.Попа Л.Л., Тофан В.Е. Земноводные и пресмыкающиеся Молдавии. Справочник-определитель. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1982. 104 с.
135.Растительный мир Молдавии. Лесные растения /Гейдеман Т.С., Витко К.Р., Истратий А.И. и др. Кишинев: Штиинца, 1986. Т. 1. 295 с.
136.Растительный мир Молдавии. Растения лесных опушек и полян /Гейдеман Т.С., Витко К.Р., Истратий А.И. и др. Кишинев: Штиинца, 1986. Т. 2. 343 с.
137.Растительный мир Молдавии. Растения луговые, прибрежные, водные и солончаковые /Гейдеман Т.С., Витко К.Р. и др. Кишинев: Штиинца, 1988. Т. 3. 275 с.
138.Растительный мир Молдавии. Растения степей, известняковых склонов и сорные /Гейдеман Т.С., Витко К.Р., Изверская Т.Д. и др. Кишинев: Штиинца, 1989. Т. 5. 303 с.
139.Редкие виды флоры Молдавии (биология, экология, география). Кишинев: Штиинца, 1982. 103 с.
140.Романович Н.А., Мараскул В.А., Романович А.Л. Структура гнездовой орнитофауны острова Куца в 2018 г. //Hydropower impact on river ecosystem functioning: Proceedings of the International conference. Тирасполь: ”Eco-Tiras”. 2019. С. 279-282.

141.Романович Н.А., Тищенков А.А. Численность и распространение хищных птиц в Южном Приднестровье в начале XXI века //Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии: Мат-лы V Междунар. Конф. По хищным птицам Северной Евразии. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2008. С. 290-291.
142.Руководство по планам управления ключевыми элементами Национальной экологической сети Молдовы /aut.: A. Andreev, T. Izverskaia, I. Talmaci [et al.]; red. şt.: A. Andreev; Societatea Ecologică „Biotica". Chişinău: S.n., 2012 (Tipogr. „Elena-V.I."). 104 p.
143.Смирнова-Гараева Н.В. Водная растительность Днестра и ее хозяйственное значение. Кишинев: Штиинца, 1980. 136 с.
144.Смирнова-Гараева Н.В. Редкие растения Днестра и его водоемов //Охрана природы Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1975. Вып. 13. С. 88-98.
145.Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. М.: Наука, 1990. 727 с.
146.Степи Нижнего Днестра: богатство и нищета /Шабанова Г.А., Цуркану В.Ф, Изверская Т.Д., Держанский В.В., др. Кишинев, 2005. 48 с.
147.Тищенков А.А. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2002 г. //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2002. Т. 11, вып.2. С. 262-263.
148.Тищенков А.А. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2003 г //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2004. Т. 13, вып. 1. С. 131-132.
149.Тищенков А.А. Гнездовая орнитофауна «Кицканского леса» //Современные проблемы зоологии и экологии. Мат-лы Международн. конф. Одесса: Феникс, 2005. С. 289-292.
150.Тищенков А.А. Гнездовая орнитофауна «Кицканского леса» //Современные проблемы зоологии и экологии. Мат-лы Международн. конф. Одесса: Феникс, 2005. С. 289-292.
151.Тищенков А.А. Некоторые сведения о редких птицах Среднего Приднестровья //Проблемы сохранения биоразнообразия Среднего и Нижнего Днестра. Тезисы Международной конференции. Кишинев: "Biotica", 1998. С. 155-158.
152.Тищенков А.А. Распространение и численность хищных птиц, гнездящихся в Южном Приднестровье // Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2001. Т. 10, вып. 2. С. 207-209.
153.Тищенков А.А., Аптеков А.А. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2000-2001 гг. //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2001. Т. 10, вып. 2. С. 153-155.
154.Тищенков А.А., Гороховский П.В., Стороженко А.А., Аптеков А.А., Молчанов Е.В. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2004 г //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2005. Т. 14, вып. 1. С. 137-138.
155.Тищенков А.А., Гороховский П.В., Стороженко А.А., Аптеков А.А., Молчанов Е.В. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2004 г //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2005. Т. 14, вып. 1. -С. 137-138.
156.Тищенков А.А., Гороховский П.В., Стороженко А.А., Цуркан Л.Ф., Выродов А.Д. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2005 г. //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2005. Т. 14, вып. 2. С. 263-264.

157.Тищенков А.А., Зотик Ю.Е. Особенности репродуктивных орнитокомплексов урочища ”Дикуль” в 2013-2015 гг. //Чтения памяти доцента Л.Л. Попа. Тирасполь: Изд-во ПГУ, 2015. С. 125-137.
158.Тищенков А.А., Зотик Ю.Е. Птицы урочища ”Дикуль” (Приднестровье) //Стрепет. Ростов н/Д, 2017. Т.15, вып. 1. С.13-32.
159.Тищенков А.А., Медведенко Д.В. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2009-2011 гг. //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2011. Т. 20, вып.1-2. С. 173-174.
160.Тищенков А.А., Медведенко Д.В. Характер зимовки птиц на водоемах Южного Приднестровья в 1999/2000 гг. //Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Вып. 4. Мелитополь: Бранта – Симферополь: Сонат, 2001. С. 137-141.
161.Тищенков А.А., Медведенко Д.В. Характер зимовки птиц на водоемах Южного Приднестровья в 1999/2000 гг. //Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Мелитополь: Бранта-Симферополь: Сонат, 2001. Вып. 4. С. 137-141.
162.Тищенков А.А., Мустя М.В., Сербинова Л.П., Дану К.П. Орнитологический компонент полевых практик по зоологии среди водно-болотных угодий Южного Приднестровья //Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра: Мат-лы научно-практ. конф. (с междунар. участием). Тирасполь: ”Eco-Tiras”, 2018. С. 181-186.
163.Тищенков А.А., Першина В.И. Гнездящиеся птицы ”Кицканского лесного комплекса” (Приднестровье) //Русский орнитологический журнал. Экспресс-выпуск 1316. Т. 25. СПб, 2016. С. 2757-2777.
164.Тищенков А.А., Першина В.И. Зимняя орнитофауна ”Кицканского лесного комплекса” //Чтения памяти доцента Л.Л. Попа. Тирасполь: Изд-во ПГУ, 2015. С. 137-145.
165.Тищенков А.А., Першина В.И. Структура репродуктивного населения птиц ”Кицканского лесного комплекса” в 2014-2015 годах //Академику Л.С. Бергу – 140 лет. Бендеры: ”Eco-Tiras”, 2016. С. 255-259.
166.Тищенков А.А., Першина В.И., Стахурская Е.С. Птицы ленточных пойменных лесов Нижнего Днестра //Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы. Мат-лы междунар. конф. Тирасполь: ”Eco-Tiras”, 2017. С. 373-377.
167.Тищенков А.А., Романович Н.А., Зотик Ю.Е., Медведенко Д.В., Стахурская Е.С., Першина В.И., Аптеков А.А., Филипенко С.И. Встречи некоторых редких видов птиц в Приднестровье в 2012-2015 гг. //Стрепет. Ростов н/Д, 2016. Т.14, вып. 1-2. С. 65-76.
168.Тищенков А.А., Романович Н.А., Мараескул В.А., Аптеков А.А. Влияние гидрорежима на орнитофауну Рамсарских угодий Южного Приднестровья //Hydropower impact on river ecosystem functioning: Proceedings of the International conference. Тирасполь: ”Eco-Tiras”. 2019. С. 326-329.
169.Тищенков А.А., Романович Н.А., Стороженко А.А., Аптеков А.А. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2006-2008 гг. //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2008. Т. 17, вып.1-2. С. 183-185.
170.Тищенков А.А., Филипенко С.И., Вакарчук О.Б., Мирошникова Д.В. Заметки о летнем населении птиц пойменных биотопов и береговых обрывов Нижнего Днестра //Академику Л.С. Бергу – 130 лет. Бендеры: ”Eco-Tiras”, 2006. С. 171-174.

171.Тищенков А.А., Филипенко С.И., Вакарчук О.Б., Мирошникова Д.В. Заметки о летнем населении птиц пойменных биотопов и береговых обрывов Нижнего Днестра //Академику Л.С. Бергу – 130 лет. Бендеры: ”Eco-Tiras”, 2006. С. 171-174.
172.Тофан В.Е. Охрана отдельных видов земноводных и пресмыкающихся Молдавии //Наземн. основы охр. природы и их преподавание в школе. Томск, 1970. С. 329-331.
173.Тофан В.Е. Фауна земноводных и пресмыкающихся Молдавии. Дис. .... канд. биол. наук. Л.: ЛГУ, 1966. 350 с.
174.Тофан В.Е. Экология и внутривидовая изменчивость зеленых лягушек Молдавии //Материалы конференции по итогам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава института за 1970 год. Кишинев: Редакционно-издательский отдел Академии наук Молдавской ССР, 1967. №1. С. 32-40.
175.Тофан В.Е. Экология и распространение болотной черепахи в Молдавии //Материалы конференции по итогам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава института за 1970 год. Кишинев: ”Лумина”, 1972. С. 129-130.
176.Тофан В.Е. Экология и характер внутривидовой изменчивости жерлянок Молдавии //Ученые записки. Кишинев: ”Картя Молдовеняскэ”, 1970. Т. XVII. С. 27-36.
177.Утевский С.Ю. Новые данные о распространении медицинской пиявки, *Hirudo* (Hirudinea) в Украине, Центральной Азии и на Северном Кавказе /С.Ю. Утевский, А.А. Атемасов, Г.А. Мазепа, А.Ю. Утевский, О.М. Утевская, А.М. Зиненко //Вестник зоологии. 2008, Т.42, №1. С.56-58.
178.Флора Восточной Европы /Отв. ред. Н.Н. Цвелев. СПб.: «Мир и семья-95», 1996. Т. 9. 456 с.; СПб.: «Мир и семья; изд-во СПХФА», 2001. Т. 10. 670 с.; СПб.: «Товарищество научных изданий КМК», 2004. Т. 9. 536 с.
179.Флора европейской части СССР /Отв. ред. Ан.А.Федоров. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1974. Т. 1. 404 с.; 1976. Т. 2. 236 с.; 1978. Т. 3. 259 с.; 1979. Т. 4. 355 с.; 1981. Т. 5. 380 с.; 1987. Т. 6. 254 с.; /Отв. ред. Н.Н. Цвелев. 1994. Т. 7. 317 с.; 1989. Т. 8. 412 с.
180.Цуркан В.Ф. Змеи Молдовы. Проблемы охраны //Тез. докл. Всесоюз. совещ. по пробл. кадастра и уч. животного.мира. Уфа, 1989.
181.Цуркан В. Операционный список герпетофауны /Андреев А. Руководство по оценке территорий-ядер экологической сети. Кишинэу, 2014. С. 36. http://bioticamoldova.org/library/CoreAreasAssessment_Guide_rus.pdf
182.Цуркану В.Ф. Современное состояние герпетофауны долины Днестра и ее видового разнообразия //Мат. конф. Эколого-эконом. Проблемы Днестра. Одесса, 1997. С. 30-31.
183.Цуркану В.Ф. Состав и распределение герпетофауны в некоторых биотопах Молдовы //Известия АН РМ. 1993. № 2. С 39-43.
184.Цуркану В.Ф. Состояние герпетофауны басейна Днестра за последние сто лет. //Мат. Междунар. конф.: Сохр. биоразазнообр. Бассейна Днестра. Кишинев, 1999. С. 248-250.

185.Червона Книга України. Рослинний свит /Под ред. Я.П.Дідуха. Киев: Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.
186.Червона Книга України. Тваринний свит /Под ред. І.А.Акімова. Киев: Глобалконсалтинг, 2009. 632 с.
187.Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). Санкт-Петербург, 1995. 990 с.
188.Шабанова Г.А. Растительность долины Днестра //Проблемы сохранения биоразнообразия Среднего и Нижнего Днестра. Тез. Международной конф. Кишинев, 1998. С. 190-193.
189.Шабанова Г.А., Изверская Т.Д. Анализ флоры сосудистых растений Нижнего Приднестровья //Сборник научных статей «Академику Л.С.Бергу – 125 лет». Бендеры, 2001. С. 44-50.
190.Шабанова Г., Изверская Т, Гендов В. Операционный список высших растений /Андреев А. Руководство по оценке территорий-ядер экологической сети. Кишинэу, 2014. С. 24-29. http://bioticamoldova.org/library/CoreAreasAssessment_Guide_rus.pdf
191.Шабанова Г.А., Изверская Т.Д., Гендов В.С. Природные биотопы «NATURA 2000» в Республике Молдова //Ботанические чтения. Ишим. Изд. ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. С. 155-157.
192.Шабанова Г.А., Изверская Т.Д., Гендов В.С. Редкие виды сосудистых растений узловых территорий Национальной Экологической сети Республики Молдова //Int. Conf. „Ecological networks – introduction to experiences and approaches”, 13-14 october 2011, Chisinau, 2012. P. 157-163.
193.Шабанова Г.А., Изверская Т.Д., Негру А.Г. Проблемы сохранения флористического и фитоценотического разнообразия Нижнего Приднестровья //Biodiversitatea vegetala a Republicii Moldova. Chişinău, 2001. P. 177-181.
194.Шешницан С.С., Котомина Л.В. Жужелицы (*Coleoptera, Carabidae*) родов *Calosoma* и *Carabus* окрестностей г. Тирасполь //Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. Тирасполь: Приднестр. гос. ун-т, 2009. С. 245-247.
195.Шешницан С.С., Котомина Л.В. Материалы по фауне и экологии водных и околоводных жесткокрылых (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Carabidae) Нижнего Днестра //Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными природными ресурсами. Тирасполь, 2010. С. 296-298.
196.Штирбу В.И. О ходе весенних и осенних миграций водоплавающих птиц в районе Кучурганского лимана //Миграции и практическое значение птиц Молдавии. Кишинев, 1980. С.110-119.
197.Штирбу В.И. Современное состояние фауны водно-болотных птиц в Молдове и практические меры по ее увеличению //Экология и охрана птиц и млекопитающих в антропогенном ландшафте. Кишинев, 1992. С. 80-94.
198.Шубернецкий И.В., Лукина Н.П. Современное состояние и перспективы сохранения вида *Hirudo medicinalis* в водоемах Молдовы и сопредельных районов Украины //Diversitatea,valorificarea raţională şi protecţia lumii animale. Chişinău, 2006. P.311-312.
199.Экологическое законодательство Республики Молдовы (1996-1998). Кишинев, 1999. 259 с.

Описания редких видов сосудистых растений и животных выполнены следующими авторами:

Держанским В.В. выполнено описание редких видов насекомых: ***Acherontia atropos*** (Linnaeus, 1758), ***Aglais urticae*** (Linnaeus, 1758), ***Ameles decolor*** (Charpentier, 1825), ***Anax imperator*** (Leach, 1815), ***Apatura iris*** (Linnaeus, 1758), ***Apatura metis*** (Freyer, 1829), ***Argynnis aglaja*** Linnaeus, 1758, ***Bombus argillaceus*** (Scopoli, 1763), ***Bombus ruderatus*** (Fabricius, 1775), ***Callimorpha dominula*** (Linnaeus, 1758), ***Carabus clathratus*** Linnaeus, 1761, ***Carabus ullrichii*** (Germar, 1824), ***Carabus variolosus*** (Fabricius, 1787), ***Catocala sponsa*** (Linnaeus, 1767), ***Cerambyx cerdo*** (Linnaeus, 1758), ***Colias chrysotheme*** (Esper, 1781), ***Elater ferrugineus*** (Linnaeus, 1758), ***Erythromma lindenii*** (Sélys, 1840), ***Euplagia quadripunctaria*** (Poda, 1761)**,** ***Formica rufa*** Linnaeus, 1761, ***Hamearis lucina*** Linnaeus, 1758, ***Iphiclides podalirius*** Linnaeus, 1758, ***Leurorrhinia pectoralis*** Charpentier, 1825, ***Lucanus cervus*** (Linnaeus, 1758), ***Lycaena virgaureae*** (Linnaeus, 1758), ***Maculinea arion*** (Linnaeus, 1758), ***Megascolia maculata*** (Drury, 1773), ***Morimus asper funereus*** (Mulsant, 1862), ***Neozephyrus quercus*** (Linnaeus, 1758), ***Neptis sappho*** (Pallas, 1771), ***Onconotus servillei*** (Fischer von Waldheim, 1846), ***Oryctes nasicornis*** (Linnaeus, 1758), ***Papilio machaon*** (Linnaeus, 1758), ***Parnassius mnemoyne*** (Linnaeus, 1758), ***Plebejus argyrognomon*** (Bergsträsser, 1779), ***Proserpinus proserpina*** (Pallas, 1772), ***Protaetia aeruginosa*** (Linnaeus, 1767), ***Saga pedo*** (Pallas, 1771), ***Saturnia pyri*** (Denis et Schiffermüller, 1775), ***Scolia hirta*** (Schrank, 1781), ***Xylocopa valga*** Gerstäcker, 1872, ***Xylocopa violacea*** (Linnaeus, 1758), ***Zerynthia polyxena*** (Denis et Schiffermüller, 1775).

Журминским С.Д. и **Манторовым О.Г**. выполнено описание видов птиц: ***Acrocephalus palustris*** (Bechstein, 1798), ***Anser erythropus*** (Linnaeus, 1758), ***Anser fabalis*** (Lath, 1787), ***Anthus campestris*** (Linnaeus, 1758), ***Anthus pratensis*** (Linnaeus, 1758), ***Aquila chrysaetos*** (Linnaeus, 1758), ***Aquila clanga*** (Pallas, 1811), ***Aquila pomarina*** (Ch.L. Brehm, 1831), ***Ardea alba*** (Linnaeus, 1758), ***Ardea purpurea*** (Linnaeus, 1766), ***Ardeola ralloides*** (Scopoli, 1769), ***Botaurus stellaris*** (Linnaeus, 1758), ***Calidris alpina*** (Linnaeus, 1758), ***Calidris ferruginea*** (Pontoppidan, 1763), ***Calidris minuta*** (Leisler, 1812), ***Chlidonias hybridus*** (Pallas, 1811), ***Chlidonias niger*** (Linnaeus, 1758), ***Ciconia ciconia*** (Linnaeus, 1758), ***Ciconia nigra*** (Linnaeus, 1758), ***Circaetus gallicus*** (Gmelin, 1788), ***Circus pygargus*** (Linnaeus, 1758), ***Columba oenas*** (Linnaeus, 1758), ***Dendrocopos medius*** (Linnaeus, 1758), ***Falco cherrug*** (I.E. Gray, 1834), ***Falco peregrinus*** (Tunstal, 1771), ***Ficedula hypoleuca*** (Pallas, 1764), ***Hieraaetus pennatus*** (Gmelin, 1788), ***Locustella fluviatilis*** **(**Wolf, 1810), ***Locustella luscinioides*** (Savi, 1824), ***Locustella naevia*** (Boddaert, 1783), ***Pelecanus onocrotalus*** (Linnaeus, 1758), ***Phalacrocorax pygmaeus*** (Pallas, 1773), ***Platalea leucorodia*** (Linnaeus, 1758), ***Plegadis falcinellus*** (Linnaeus, 1766), ***Porzana parva*** (Scopoli, 1769), ***Porzana pusilla*** (Pallas, 1776), ***Saxicola rubetra*** (Linnaeus, 1758), ***Tadorna tadorna*** (Linnaeus, 1758), ***Tringa erythropus*** (Pallas, 1764), ***Tringa stagnatilis*** (Bechstein, 1803), ***Tringa totanus*** (Linnaeus, 1758), ***Turdus iliacus*** (Linnaeus, 1766).

Изверской Т.Д. и **Гендовым В.С.** выполнено описание видов сосудистых растений: ***Adonis vernalis*** L., ***Alisma gramineum*** Lej., ***Allium paniculatum*** L., ***Asparagus officinalis*** L., ***Asparagus tenuifolius*** Lam., ***Asparagus verticillatus*** L., ***Arum orientale*** M.Bieb., ***Astragalus albidus*** Waldst. et Kit., ***Astragalus dasyanthus*** Pall., ***Astragalus exscapus*** L., ***Astragalus ponticus*** Pall., ***Bellevalia sarmatica*** (Georgi) Woronow, ***Berberis vulgaris*** L., ***Campanula persicifolia*** L., ***Carex caryophyllea*** Latourr., ***Carex pseudocyperus*** L., ***Caulinia minor*** (All.) Coss. et Germ., ***Cerastium glutinosum*** Fries., ***Chamaecytisus lindemannii*** (V.Krecz.)

Klásková, ***Chamaecytisus rochelii*** (Wierzb.) Rothm., ***Chamaecytisus ruthenicus*** (Fisch. ex Woloszcz.) Klásková, ***Chrysopogon gryllus*** (L.) Trin., ***Colchicum triphyllum*** G.Kunze, ***Convolvulus lineatus*** L., ***Crambe tataria*** Sebeok, ***Crocus reticulatus*** Stev. ex Adams, ***Cyperus glomeratus*** L., ***Dianthus capitatus*** Balb. ex DC., ***Dichostylis micheliana*** (L.) Nees, ***Eleocharis acicularis*** (L.) Roem. et Schult., ***Eleocharis uniglumis*** (Link) Schult., ***Erodium ciconium*** (L.) L`Her., ***Erodium ruthenicum*** M.Bieb., ***Euonymus nanus*** M.Bieb., ***Geranium palustre*** L., ***Goniolimon besserianum*** (Schult.) Kusn., ***Gratiola officinalis*** L., ***Haplophyllum suaveolens*** (DC.) G. Don fil., ***Hyacinthella leucophaea*** (C.Koch) Schur, ***Hydrocharis morsus-ranae*** L., ***Iris hungarica*** Waldst. et Kit., ***Iris pumila*** L., ***Iris variegata*** L., ***Juncellus serotinus*** (Rottb.) C.B. Clarke, ***Lathyrus aphaca*** L., ***Leopoldia tenuiflora*** (Tausch) Heldr., ***Limonium hypanicum*** Klokov, ***Linum nervosum*** Waldst. et Kit., ***Listera ovata*** (L.) R. Br., ***Lunaria annua*** L., ***Maianthemum bifolium*** (L.) F.W.Schmidt, ***Medicago rigidula*** (L.) All., ***Nymphaea alba*** L., ***Nymphoides peltata*** (S.G.Gmel.) O.Kuntze, ***Ornithogalum divergens*** Boreau, ***Ornithogalum kochii*** Parl., ***Ornithogalum refractum*** Schlecht., ***Platanthera chlorantha*** (Cust.) Reichenb., ***Potamogeton berchtoldii*** Fieb., ***Potamogeton compressus*** L., ***Potamogeton gramineus*** L., ***Potamogeton lucens*** L., ***Potamogeton natans*** L., ***Pulsatilla montana*** (Hoppe) Reichenb., ***Pulsatilla ucrainica*** (Ugr.) Wissjul., ***Reseda inodora*** Reichenb., ***Salvinia natans*** (L.) All., ***Scirpus triqueter*** L., ***Seseli tortuosum*** L., ***Spirodela polyrrhiza*** (L.) Schleid., ***Sternbergia colchiciflora*** Waldst. et Kit., ***Stipa lessingiana*** Trin. et Rupr., ***Stipa pennata*** L., ***Stipa pulcherrima*** C.Koch, ***Stipa tirsa*** Stev., ***Stipa ucrainica*** P.Smirn., ***Symphytum tauricum*** Willd., ***Trapa natans*** L., ***Trifolium vesiculosum*** Savi, ***Typha laxmannii*** Lepech., ***Utricularia vulgaris*** L., ***Valerianella coronata*** (L.) DC., ***Vallisneria spiralis*** L., ***Veratrum nigrum*** L., ***Veronica euxina*** Turrill, ***Viburnum opulus*** L., ***Vitis sylvestris*** C.C.Gmel.:

Иоиица О.В. и **Тофан-Дорофеев Е.В.** выполнено описание видов сосудистых растений: ***Achillea coarctata*** Poir., ***Achillea ochroleuca*** Ehrh., ***Helichrysum arenarium*** (L.) Moench, ***Inula helenium*** L., ***Petasites hybridus*** (L.) Gaertn., Mey. et Scherb., ***Pilosella glaucescens*** (Bess.) Sojak, ***Scorzonera mollis*** M.Bieb., **Tanacetum odessanum** (Klokov) Tzvel.;

Рущук А.Д. – ***Carex rhizina*** Blytt ex Lindb., ***Elatine hydropiper*** L., ***Ornithogalum boucheanum*** (Kunth) Aschers., ***Tamarix ramosissima*** Ledeb.

Сыродоевым Г.Н. составлены картосхемы: Рамсарский сайт ”Нижний Днестр” в Республике Молдова, Природные комплексы Рамсарского сайта ”Нижний Днестр” и Экологическая сеть в Рамсарском сайте ”Нижний Днестр”.

Тищенковым А.А. и **Романовичем Н.А**. выполнено описание видов птиц: ***Acanthis cannabina*** (Linnaeus, 1758), ***Accipiter brevipes*** (Severtzov, 1850), ***Accipiter gentilis*** (Linnaeus, 1758), ***Accipiter nisus*** (Linnaeus, 1758), ***Alauda arvensis*** (Linnaeus, 1758), ***Anas acuta*** (Linnaeus, 1758), ***Anas strepera*** (Linnaeus, 1758), ***Anthus trivialis*** (Linnaeus, 1758), ***Athene noctua*** (Scopoli, 1769), ***Asio flammeus*** (Pontoppidan, 1763), ***Asio otus*** (Linnaeus, 1758), ***Aythya fuligula*** (Linnaeus, 1758), ***Aythya marila*** (Linnaeus, 1761), ***Bucephala clangula*** (Linnaeus, 1758), ***Buteo buteo*** (Linnaeus, 1758), ***Buteo lagopus*** (Pontoppidan, 1763), ***Buteo rufinus*** (Cretzschmar, 1827), ***Carduelis carduelis*** (Linnaeus, 1758), ***Certhia familiaris*** (Linnaeus, 1758), ***Chloris chloris*** (Linnaeus, 1758), ***Circus cyaneus*** (Linnaeus, 1766), ***Coccothraustes coccothraustes*** (Linnaeus, 1758), ***Columba palumbus*** (Linnaeus, 1758), ***Coracias garrulus*** (Linnaeus, 1758), ***Corvus corax*** (Linnaeus, 1758), ***Corvus cornix*** (Linnaeus, 1758), ***Corvus frugilegus*** (Linnaeus, 1758), ***Corvus monedula*** (Linnaeus, 1758), ***Coturnix coturnix*** (Linnaeus, 1758), ***Crex crex*** (Linnaeus, 1758), ***Delichon urbica***

(Linnaeus, 1758), ***Falco subbuteo*** (Linnaeus, 1758), ***Falco vespertinus*** (Linnaeus, 1766), ***Gallinago gallinago*** (Linnaeus, 1758), ***Garrulus glandarius*** (Linnaeus, 1758), ***Hippolais icterina*** (Vieillot, 1817), ***Hirundo rustica*** (Linnaeus, 1758), ***Lanius collurio*** (Linnaeus, 1758), ***Lanius excubitor*** (Linnaeus, 1758), ***Lanius minor*** (Gmelin, 1788), ***Limosa limosa*** (Linnaeus, 1758), ***Lullula arborea*** (Linnaeus, 1758), ***Lymnocryptes minimus*** (Brunnich, 1764), ***Milvus migrans*** (Boddaert, 1783), ***Motacilla alba*** (Linnaeus, 1758), ***Motacilla flava*** (Linnaeus, 1758), ***Numenius arquata*** (Linnaeus, 1758), ***Oenanthe oenanthe*** (Linnaeus, 1758), ***Oriolus oriolus*** (Linnaeus, 1758), ***Otus scops*** (Linnaeus, 1758), ***Parus caeruleus*** (Linnaeus, 1758), ***Parus major*** (Linnaeus, 1758), ***Perdix perdix*** (Linnaeus, 1758), ***Pernis apivorus*** (Linnaeus, 1758), ***Phasianus colchicus*** (Linnaeus, 1758), ***Phoenicurus ochruros*** (Gmelin, 1774), ***Phoenicurus phoenicurus*** (Linnaeus, 1758), ***Pica pica*** (Linnaeus, 1758), ***Rufibrenta ruficollis*** (Pallas, 1769), ***Saxicola torquata*** (Linnaeus, 1766), ***Scolopax rusticola*** (Linnaeus, 1758), ***Sitta europaea*** (Linnaeus, 1758), ***Spinus spinus*** (Linnaeus, 1758), ***Streptopelia decaocto*** (Frivaldszky, 1838), ***Streptopelia turtur*** (Linnaeus, 1758), ***Strix aluco*** (Linnaeus, 1758), ***Sylvia atricapilla*** (Linnaeus, 1758), ***Sylvia borin*** (Boddaert, 1783), ***Sylvia communis (***Latham, 1787), ***Sylvia curruca*** (Linnaeus, 1758), ***Sylvia nisoria*** (Bechstein, 1795), ***Turdus merula*** (Linnaeus, 1758), ***Turdus philomelos*** (Brehm, 1831), ***Turdus pilaris*** (Linnaeus, 1758);

Тофан-Дорофеев Е.В. и **Ионица О.В.** выполнено описание видов сосудистых растений: ***Amygdalus nana*** L., ***Potentilla astracanica*** Jacq., ***Pyrus elaeagnifolia*** Pall., ***Rosa micrantha*** Borrer ex Smith, ***Rosa tschatyrdagi*** Chrshan., ***Sorbus torminalis*** (L.) Crantz.

Цуркану В.Ф. выполнено описание видов земноводных: ***Bombina bombina*** Linnaeus, 1761, ***Bufo bufo*** Linnaeus, 1758, ***Bufo viridis*** Laurenti, 1786, ***Hyla arborea*** Linnaeus, 1758, ***Pelobates fuscus*** Laurenti, 1768, ***Rana dalmatina*** Bonaparte, 1840, ***Triturus cristatus*** Laurenti, 1786, ***Triturus vulgaris*** Laurenti, 1786; редких видов пресмыкающихся: ***Coluber caspius*** Linnaeus, 1758, ***Coronella austriaca*** Laurenti, 1768, ***Elaphe guatuorlineata*** **(*sauromares*)** Lacepede, 1768, ***Emys orbicularis*** Linnaeus, 1758, ***Lacerta agilis*** Linnaeus, 1758, ***Lacerta viridis*** Linnaeus, 1758, ***Natrix tessellate*** Laurenti, 1768, ***Zamenis longissimus*** Laurenti, 1768 и видов млекопитающих: ***Cricetus cricetus*** Pallas, 1773, ***Crocedura leucodon*** Hermann, 1780, ***Lutra lutra*** Linnaeus, 1758, ***Martes foina*** Erxleben, 1777, ***Martes martes*** Linnaeus, 1758, ***Meles meles*** Linnaeus, 1758, ***Micromys minutus*** Pallas, 1771, ***Mustela erminea*** Linnaeus, 1758, ***Mustela lutreola*** Linnaeus,1761, ***Mustela putorius*** Linnaeus, 1758, ***Myoxus glis*** Linnaeus, 1766, ***Neomys anomalus*** Cabrera, 1907, ***Sorex araneus*** Linnaeus, 1758, ***Sorex minutus*** Linnaeus, 1758, в том числе рукокрылых ***Myotis bechsteinii*** Kuhl, 1817, ***Myotis dasycneme*** Boie, 1825, ***Myotis mystacinus*** Kuhl, 1817, ***Nyctalus lasiopterus*** Schreber, 1780, ***Pipistrellus kuhlii*** Kuhl, 1817, ***Rhinolophus hipposideros*** Bechstein, 1800, ***Vespertilio murinus*** Linnaeus, 1758.

Цуркану В.Ф. и Бондаренко А.М. выполнено описание видов млекопитающих: ***Erinaceus europeus*** Barret-Hamilton, 1900, ***Felis silvestris*** Schreber, 1777, ***Mustela nivalis*** Linnaeus,1766, в том числе рукокрылых ***Eptesicus serotinus*** Schreber, 1774, ***Myotis daubentonii*** Kuhl, 1817, ***Nyctalus leisleri*** Kuhl, 1817, ***Nyctalus noctua*** Schreber, 1774, ***Pipistrellus nathusii*** Keyserling, 1839, ***Pipistrellus pipistrellus*** Schreber, 1774, ***Pipistrellus pygmaeus*** Leach, 1825, ***Plecotus austriacus*** Fischer, 1829.

Шубернецким И.В. выполнено описание редкого вида водных беспозвоночных ***Hirudo medicinalis*** L.